

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO

Nurofen Immedia 200 mg mehke kapsule ibuprofen

za uporabo pri odraslih, mladostnikih in otrocih, težjih od 20 kg (starih približno 6 let)

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolje koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 dneh v primeru povišane telesne temperature oziroma po 4 dneh v primeru lajšanja bolečin, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Nurofen Immedia in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Nurofen Immedia
3. Kako jemati zdravilo Nurofen Immedia
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Nurofen Immedia
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO NUROFEN IMMEDIA IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Ibuprofen sodi v skupino zdravil, ki jim pravimo nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID). Ta zdravila lajšajo težave tako, da spremenijo odziv telesa na bolečino in povišano telesno temperaturo. Zdravilo Nurofen Immedia se zlahka razgradi v telesu in zdravilna učinkovina, ki se sprošča iz kapsule, se zlahka absorbira v telo ter hitro doseže mesto bolečine.

Zdravilo Nurofen Immedia uporabljamo za kratkotrajno simptomatsko zdravljenje:

- blagih do zmernih bolečin, kot so glavobol, zobobol in bolečine ob menstruaciji, ter za
- zniževanje povišane telesne temperature in lajšanje bolečin pri prehladu.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO NUROFEN IMMEDIA

Ne jemljite zdravila Nurofen Immedia

- če ste alergični (preobčutljivi) na ibuprofen, barvilo rdeče 4R (E124) ali katerikoli drugo sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- če se je po uporabi acetilsalicilne kisline ali drugih podobnih analgetikov (nesteroidnih protivnetnih zdravil) pri vas kdaj pojavila zasoplost, astma, izcedek iz nosu, otekanje ali koprivnica.
- če imate (ali ste imeli v preteklosti dvakrat ali večkrat) želodčno razjedo ali krvavitev iz želodca.
- če ste imeli kdaj krvavitev iz prebavil ali predrtje stene prebavil, povezano s predhodnim zdravljenjem z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili (NSAID).
- če imate hudo jetrno ali ledvično okvaro ali srčno popuščanje.
- oziroma ga ne smete dati otroku z manj kot 20 kg telesne mase.
- če imate možgansko ali kakšno drugo aktivno krvavitev.
- če imate nepojasnjene motnje tvorbe krvnih celic.
- če ste zelo dehidrirani (dehidracijo lahko povzročijo bruhanje, driska ali nezadosten vnos tekočin).
- v zadnjih treh mesecih nosečnosti (glejte opozorila v nadaljevanju).

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Nurofen Immedia

- če imate določene kožne bolezni (sistemski eritematozni lupus (SLE) ali mešano bolezen vezivnega tkiva),
- če imate resne kožne reakcije, kot so ekfoliativni dermatitis, Stevens-Johnsonov sindrom in toksična epidermalna nekroliza; z uporabo zdravila Nurofen Immedia morate nemudoma prenehati že ob prvem pojavu kožnega izpuščaja, sprememb na sluznici ali kakršnihkoli drugih znakov alergijske reakcije,
- če imate nekatere dedne motnje tvorbe krvnih celic (npr. akutno intermitentno porfirijo),
- če imate ali ste kadarkoli imeli črevesno bolezen (ulcerozni kolitis ali Crohnovo bolezen),
- če ste kadarkoli imeli zvišan krvni tlak in/ali srčno popuščanje,
- če imate zmanjšano delovanje ledvic,
- če imate motnje delovanja jeter,
- neposredno po velikih kirurških posegih,
- če imate ali ste kadarkoli imeli astmo ali alergijsko bolezen, ker se lahko pojavi zasoplost,
- če imate seneni nahod, nosne polipe ali kronično obstruktivno bolezen dihal, ker pri teh boleznih obstaja večje tveganje za alergijske reakcije; le-te lahko nastopijo v obliki napada astme (z analgetiki povzročena astma), Quinckejevega edema ali urtikarije,
- če imate norice (vodene koze) je priporočljivo, da se v času bolezni izogibate jemanju zdravila Nurofen Immedia,
- zdravila, kot je Nurofen Immedia, so lahko povezana z majhnim povečanjem tveganja srčne kapi (miokardnega infarkta) ali možganske kapi. Morebitno tveganje je verjetnejše pri visokih odmerkih in podaljšanem zdravljenju. Ne prekoračite priporočenega odmerka ali trajanja zdravljenja (3 dni pri povišani telesni temperaturi in 4 dni pri lajšanju bolečin),
- če imate težave s srcem ali ste kdaj imeli možgansko kap ali menite, da za vas obstaja morebitno tveganje za nastanek teh bolezni (na primer, če imate visok krvni tlak, sladkorno bolezen ali visoko vrednost holesterola ali ste kadilec), se o zdravljenju posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom,
- če imate motnje strjevanja krvi,
- pri daljši uporabi zdravila Nurofen Immedia so potrebne redne preiskave delovanja jeter, delovanja ledvic in krvne slike,
- sočasna uporaba tega zdravila z drugimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, kamor sodijo tudi specifični zaviralci ciklooksigenaze-2, poveča tveganje za neželene učinke (glejte poglavje "Jemanje drugih zdravil") in se ji je potrebno izogibati.

Neželene učinke lahko zmanjšate z uporabo najmanjšega še učinkovitega odmerka najkrajši čas. Tveganje za neželene učinke je povečano pri starostnikih.

Na splošno lahko ponavljajoča se uporaba (več različnih) analgetikov vodi do trajnih in hudih težav z ledvicami. Tveganje zanje je lahko povečano pri telesnem naporu, ki je povezan z izgubljanjem soli in dehidracijo, zato se mu je potrebno izogibati.

Pri dolgotrajni uporabi katerikoli zdravila proti bolečinam za zdravljenje glavobolov, se le-ti lahko poslabšajo. V takšnih primerih se morate posvetovati z zdravnikom, zdravljenje s tem zdravilom pa morate prekiniti. Pri bolnikih, ki imajo pogoste ali vsakodnevne glavobole kljub redni uporabi zdravil proti glavobolu (ali zaradi njih), mora zdravnik raziskati možnost glavobolov zaradi prekomerne uporabe zdravil.

Če se katerikoli od omenjenih motenj nanaša na vas, se pred uporabo zdravila Nurofen Immedia posvetujte z zdravnikom.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katerikoli drugo zdravilo.

Čemu se morate izogibati med jemanjem tega zdravila?

Nekatera zdravila, kot so antikoagulanti (zdravila za preprečevanje nastanka krvnih strdkov) (npr. acetilsalicilna kislina, varfarin, tiklopidin), nekatera zdravila za zdravljenje visokega krvnega tlaka (zaviralci angiotenzinske konvertaze, npr. kaptopril, zaviralci adrenergičnih receptorjev beta, antagonisti angiotenzina II) in celo nekatera druga zdravila lahko vplivajo na učinek ibuprofena oziroma ibuprofen lahko vpliva na učinek teh zdravil. Preden začnete jemati ibuprofen skupaj z drugimi zdravili, se vedno najprej posvetujte s svojim zdravnikom.

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta. Še posebej pa mu morate povedati, če jemljete:

acetilsalicilno kislino ali druge NSAID (nesteroidna protivnetna zdravila in analgetike)	ker lahko povečajo tveganje za pojav razjed ali krvavitev iz prebavil
digoksin (za srčno popuščanje)	ker se učinek digoksina lahko okrepi
glukokortikoide (zdravila, ki vsebujejo kortizon ali kortizonu podobne učinkovine)	ker lahko povečajo tveganje za pojav razjed ali krvavitev iz prebavil
antitrombocitna zdravila	ker lahko povečajo tveganje za krvavitve
acetilsalicilno kislino (v majhnih odmerkih)	ker lahko zmanjša učinek zdravila na redčenje krvi
zdravila proti strjevanju krvi (na primer varfarin)	ker lahko ibuprofen okrepi njihove učinke
fenitoin (pri epilepsiji)	ker se učinek fenitoina lahko okrepi
selektivne zaviralce ponovnega privzema serotonina (zdravila za zdravljenje depresije)	ker lahko povečajo tveganje za krvavitve iz prebavil
litij (zdravilo za zdravljenje manične depresije in depresije)	ker se učinek litija lahko okrepi
probenecid in sulfinpirazon (zdravila za zdravljenje protina)	ker se izločanje ibuprofena lahko upočasni
zdravila za zvišan krvni tlak in odvajanje vode	ker lahko ibuprofen zmanjša učinke teh zdravil in se lahko poveča tveganje za ledvice
diuretike, ki varčujejo s kalijem	ker lahko povzročijo hiperkaliemijo
metotreksat (zdravilo za zdravljenje raka ali revmatičnih obolenj)	ker se učinek metotreksata lahko okrepi
takrolimus in ciklosporin (imunosupresivna zdravila)	ker lahko pride do okvare ledvic

zidovudin (zdravilo za zdravljenje okužbe z virusom HIV/AIDS-a)	ker lahko povzroči povečano tveganje za krvavitve v sklepe ali krvavitve, ki vodijo do otekanja pri HIV (+) bolnikih s hemofilijo
sulfonilsečnine (zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni)	ker lahko pride do medsebojnih delovanj z njimi
kinolonske antibiotike	ker se lahko poveča tveganje za krče
zaviralce CYP2C9	Pri sočasni uporabi ibuprofena in zaviralcev CYP2C9 se lahko poveča izpostavljenost ibuprofenu (substrat za CYP2C9). V študiji z vorikonazolom in flukonazolom (zaviralca CYP2C9) se je izpostavljenost S(+)-ibuprofenu povečala za približno 80 do 100 %. Pri sočasni uporabi močnih zaviralcev CYP2C9 je treba razmisliti o zmanjšanju odmerka ibuprofena, še posebej, če se ibuprofen v visokih odmerkih uporablja skupaj z vorikonazolom ali s flukonazolom.

Jemanje zdravila Nurofen Immedia skupaj s hrano in pijačo

Kapsule pogoltnite z vodo. Priporočljivo je, da bolniki z občutljivim želodcem zaužijejo zdravilo Nurofen Immedia skupaj s hrano. Če pa zdravilo Nurofen Immedia zaužijete kmalu po obroku, je lahko začetek njegovega delovanja zapoznel. Če se to zgodi, ne smete zaužiti več zdravila Nurofen Immedia, kot je priporočeno v poglavju "Kako jemati zdravilo Nurofen Immedia" oziroma zdravila ne smete ponovno vzeti, dokler ne mine predpisan čas do naslednjega odmerka.

Nekateri neželeni učinki, na primer učinki na prebavila, se lahko pogosteje pojavljajo pri sočasnem uživanju alkohola in zdravila Nurofen Immedia.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Tega zdravila ne smete jemati v zadnjih 3 mesecih nosečnosti. Izogibajte se tudi njegovi uporabi v prvih 6 mesecih nosečnosti, razen če vam je zdravnik svetoval drugače.

To zdravilo sicer prehaja v materino mleko, vendar je njegova uporaba dovoljena tudi med dojenjem, če ga bolnica jemlje v priporočenem odmerku in najkrajši možni čas.

Zdravilo sodi v skupino nesteroidnih protivnetnih zdravil (NSAID), ki lahko vplivajo na plodnost pri ženskah, vendar ta učinek po prenehanju uporabe zdravila mine.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Pri kratkotrajni uporabi in pri običajnem odmerku to zdravilo nima ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Nurofen Immedia

To zdravilo vsebuje sorbitol. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

Zdravilo vsebuje barvilo rdeče 4R (E124) in lahko povzroči alergijske reakcije.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO NUROFEN IMMEDIA

Pri jemanju zdravila Nurofen Immedia natančno upoštevajte napotke v tem navodilu. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Če vam zdravnik ni predpisal drugače, je priporočen odmerek naslednji:

Odrasli in mladostniki s telesno maso približno 40 kg

Začetni odmerek: Vzemite 1 ali 2 kapsuli (200 mg ali 400 mg ibuprofena) z vodo. Če je potrebno, zaužijte še dodatne odmerke po 1 ali 2 kapsuli (200 mg ali 400 mg ibuprofena), vendar lahko v 24 urah vzamete največ 6 kapsul. Tudi razmik med odmerki ne sme biti krajši od 4 ur pri 200 mg odmerku oziroma 6 ur pri 400 mg odmerku.

Otroci s telesno maso od 20 kg (stari približno 6 let) do 39 kg

Zdravilo Nurofen Immedia se sme uporabljati le pri otrocih s telesno maso najmanj 20 kg. Največji skupni dnevni odmerek ibuprofena je od 20 do 30 mg na kg telesne mase, razdeljen na 3 do 4 enkratne odmerke. Razmik med odmerki ne sme biti krajši od 6 ur. Ne zaužijte večjega odmerka kot je največji priporočeni dnevni odmerek. V 24 urah lahko vzamete največ 30 mg ibuprofena na kg telesne mase. Za uporabo zdravila Nurofen Immedia pri otrocih lahko uporabljate naslednja navodila za odmerjanje:

Telesna masa	Odmerek	Pogostnost jemanja
otroci, težki od 20 kg do 29 kg	1 kapsula (200 mg ibuprofena)	Če je potrebno, naj otrok vzame še eno kapsulo po najmanj 8 urah. V 24 urah lahko otrok vzame največ 3 kapsule (do 600 mg ibuprofena).
otroci, težki od 30 kg do 39 kg	1 kapsula (200 mg ibuprofena)	Če je potrebno, naj otrok vzame še eno kapsulo po najmanj 6 do 8 urah. V 24 urah lahko otrok vzame največ 4 kapsule (do 800 mg ibuprofena).

Način uporabe

peroralna uporaba

Le za kratkotrajno uporabo. Ne žvečite.

Če menite, da je učinek tega zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če jemljete zdravilo Nurofen Immedia dlje kot 3 dni pri povišani telesni temperaturi ali dlje kot 4 dni pri lažšanju bolečin oziroma če se vam simptomi poslabšajo, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Nurofen Immedia, kot bi smeli

Nemudoma se posvetujte z zdravnikom. Pojavijo se lahko naslednji znaki: slabost, bruhanje, bolečine v želodcu, glavobol, omotica in zaspanost. Redko se lahko pojavijo: nizek krvni tlak in izguba zavesti (mioklonične konvulzije pri otrocih), oteženo dihanje (depresija dihanja) in modro obarvanje kože in sluznic (cianoza).

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Nurofen Immedia neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Pojavnost neželenih učinkov se lahko zmanjša z jemanjem najmanjšega odmerka za najkrajši čas, ki je potreben za lajšanje simptomov. Pri uporabi tega zdravila se lahko pojavi kateri od znanih neželenih učinkov NSAID (nesteroidnih protivnetnih zdravil) (glejte nadaljevanje). Če se pojavi ali če vas skrbi, prenehajte jemati to zdravilo in se čim prej posvetujte s svojim zdravnikom. Pri starostnikih, ki jemljejo to zdravilo, obstaja povečano tveganje za težave, povezane z neželenimi učinki.

Pogostnost neželenih učinkov je navedena na naslednji način:

zelo pogosti	pojavi se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov
pogosti	pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov
občasni	pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov
redki	pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov
zelo redki	pojavi se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov
neznana pogostnost	pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

Med možne neželene učinke sodijo:

Infekcijske in parazitske bolezni

Zelo redki: V izjemnih primerih ko ima bolnik norice (vodene kože), lahko pride do hudih zapletov v obliki okužbe kože in mehkih tkiv. Opisali so tudi poslabšanje z okužbo povezanega vnetja (npr. nekrotizirajočega fasciitisa), ki je povezano z uporabo nekaterih analgetikov (NSAID).

Če se med uporabo zdravila Nurofen Immedia pojavijo ali poslabšajo znaki okužbe, morate nemudoma k zdravniku. Ugotoviti je treba, ali obstaja indikacija za protimikrobno oz. antibiotično zdravljenje. Med uporabo ibuprofena so opazili simptome aseptičnega meningitisa z okorelostjo vratu, glavobolom, slabostjo, bruhanjem, povišano telesno temperaturo ali motnjami zavesti. Kaže, da so k temu bolj nagnjeni bolniki z avtoimunskimi boleznimi (SLE, mešana bolezen vezivnega tkiva).

Bolezni krvi in limfatičnega sistema

Zelo redki: Motnje v tvorbi krvnih celic, katerih prvi znaki so: povišana telesna temperatura, vnetje žrela, površinske razjede v ustih, gripi podobni simptomi, močna izčrpanost, krvavitve iz nosu in kože. V teh primerih morate zdravljenje nemudoma prekiniti ter se posvetovati z zdravnikom. Sami ne smete nadaljevati zdravljenja z analgetiki ali drugimi zdravili, ki zmanjšujejo povišano telesno temperaturo (antipiretiki).

Bolezni imunskega sistema

Občasni: Preobčutljivostne reakcije s koprivnico in srbenjem, pa tudi napadi astme. V tem primeru morate prenehati z jemanjem zdravila Nurofen Immedia in nemudoma obvestiti svojega zdravnika.

Zelo redki: Hude preobčutljivostne reakcije, katerih znaki so lahko: otekanje obraza, jezika in žrela, zasoplost, pospešen srčni utrip, nizek krvni tlak, hud šok. Če se pojavi kateri od teh simptomov, kar se lahko zgodi že ob prvi uporabi zdravila, je potrebna takojšnja zdravniška pomoč.

Psihiatrične motnje

Zelo redki: psihotične reakcije, depresija

Bolezni živčevja

Občasni: glavobol, omotica, nespečnost, vznemirjenost, razdražljivost in utrujenost

Očesne bolezni

Občasni: motnje vida

Ušesne bolezni, vključno z motnjami labirinta

Redki: zvenenje v ušesih

Srčne bolezni

Zelo redki: pri jemanju NSAID (nesteroidnih protivnetnih zdravil) v velikih odmerkih so poročali o pojavu palpitacij, srčnem popuščanju, miokardnem infarktu, edemih, hipertenziji

Žilne bolezni

Zelo redki: arterijska hipertenzija, vnetje krvnih žil

Bolezni prebavil

Pogosti: težave z želodcem, na primer zgaga, bolečine v želodcu in slabost, driska, bruhanje, napenjanje (vetrovi) in zaprtje ter rahla izguba krvi iz želodca in/ali črevesja, ki lahko v izjemnih primerih povzroči anemijo

Občasni: perforacija prebavil ali krvavitve iz prebavil, črno blato in bruhanje krvi, poslabšanje obstoječe črevesne bolezni (ulceroznega kolitisa ali Crohnove bolezni), vnetje želodca

Zelo redki: vnetje požiralnika, vnetje trebušne slinavke, nastanek membranskih zožitev v črevesju
V primeru močnih bolečin v zgornjem delu trebuha, bruhanja krvi ali črnega blata morate prekiniti zdravljenje in se posvetovati z zdravnikom.

Bolezni jeter, žolčnika in žolčevodov

Zelo redki: jetrna okvara (eden od prvih znakov je lahko obarvanje kože), poškodba jeter, še posebej pri dolgotrajnem zdravljenju, odpoved jeter, akutni hepatitis

Bolezni kože in podkožja

Občasni: različni kožni izpuščaji

Zelo redki: hude oblike kožnih reakcij, vključno z izpuščajem s pordelostjo in mehurji, Stevens-Johnsonov sindrom in odmrtnje tkiva, izpadanje las (alopecija)

Bolezni sečil

Redki: Zdravila, kakršno je Nurofen Immedia, lahko povzročijo bolezen ledvic. Znaki ledvične okvare (papilarne nekroze) so lahko bolečine v ledvenem delu in/ali trebuhu, pojav krvi v urinu in povišana telesna temperatura. V redkih primerih lahko nastopi tudi zvišana koncentracija sečnine v krvi.

Zelo redki: Odvajanje manjše količine urina kot normalno in otekanje (še posebej pri bolnikih z zvišanim krvnim tlakom ali zmanjšanim delovanjem ledvic), otekanje (edem) in motnost urina (nefrotski sindrom); vnetna bolezen ledvic (intersticijski nefritis), ki lahko vodi do akutne ledvične odpovedi. Če se pojavi kateri od omenjenih simptomov ali če se na splošno slabo počutite, prenehajte z jemanjem zdravila Nurofen Immedia in se nemudoma posvetujte s svojim zdravnikom, ker so lahko to prvi znaki ledvične okvare ali ledvične odpovedi.

Zdravila, kot je Nurofen Immedia, so lahko povezana z majhnim povečanjem tveganja za srčno kap (miokardni infarkt) ali možgansko kap.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, takoj prenehajte z jemanjem tega zdravila in obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA NUROFEN IMMEDIA

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Nurofen Immedia ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in na pretisnem omotu. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte v originalni ovojnini.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Nurofen Immedia

Zdravilna učinkovina je ibuprofen.

Ena kapsula vsebuje 200 mg ibuprofena.

Pomožne snovi so:

Vsebina:

- makrogol 600
- kalijev hidroksid (čistota najmanj 85 %)
- prečiščena voda

Ovojnica kapsule:

- delno dehidratirani tekoči sorbitol (E420)
- želatina
- rdeče 4R (E124)

Črnilo:

- Opacode WB beli NS-78-18011 (iz titanovega dioksida (E171), propilenglikola in hipromeloze (E464)).

Izgled zdravila Nurofen Immedia in vsebina pakiranja

Rdeča, ovalna in prosojna mehka kapsula z natisnjeno identifikacijo. Kapsule so na voljo v pakiranjih po 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 40 ali 50 mehkih kapsul.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način izdajanja zdravila

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Imetnik dovoljenja za promet

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.,
103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3UH,
Velika Britanija

Odgovoren za trženje v Sloveniji:

PharmaSwiss d.o.o., Ljubljana, Slovenija

Izdelovalec:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB, Velika Britanija

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Avstrija	Nurofen Rapid 200 mg Weichkapseln
Belgija	Nurofen Immedia 200 mg capsules, soft
Bolgarija	Nurofen Express 200 mg Soft Capsules
Ciper	Nurofen 200 mg Liquid Capsule
Češka	Nurofen Rapid 200 mg capsules
Estonija	Nurofen Ultra Express 200 mg, pehmekapslid
Finska	Nuroflash
Francija	NUROFLASH 200 mg capsule molle
Nemčija	Nurofen Immedia 200 mg Weichkapseln
Grčija	Nurofen 200 mg Μ α λ α κ ε ς κ á ψ ο υ λ ε ς

Madžarska	Nurofen Rapid 200 mg lágy kapszula
Islandija	Nurofen Express
Latvija	Nurofen Ultra Express 200 mg mikstas kapsulas
Litva	Nurofen Ultra Express 200 mg minkstos kapsules
Luksemburg	Nurofen Immedia 200 mg capsules, soft
Malta	Nurofen Express 200 mg capsules
Nizozemska	Nurofen Zavance Lea 200 mg Liquid capsules
Poljska	Nurofen Express Femina
Romunija	NUROFEN EXPRESS 200 mg capsule, moi
Slovaška	Nurofen Rapid 200mg capsules, mäkké kapsuly
Slovenija	Nurofen Immedia 200 mg mehke kapsule
Švedska	Nurofen Express 200 mg capsules, soft

Navodilo je bilo odobreno:

26.06.2014