

NAVODILO ZA UPORABO

Atorvastatin Teva 10 mg filmsko obložene tablete
Atorvastatin Teva 20 mg filmsko obložene tablete
Atorvastatin Teva 40 mg filmsko obložene tablete
Atorvastatin Teva 80 mg filmsko obložene tablete
atorvastatin

Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Atorvastatin Teva in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Atorvastatin Teva
3. Kako jemati zdravilo Atorvastatin Teva
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Atorvastatin Teva
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO ATORVASTATIN TEVA IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Atorvastatin Teva spada v skupino zdravil, imenovano statini, ki so zdravila za uravnavanje ravni lipidov (maščob) v krvi.

Zdravilo Atorvastatin Teva se uporablja za znižanje ravni holesterola in trigliceridov, kadar prehrana z malo maščob in spremembe načina življenja niso dovolj učinkovite. Če imate povečano tveganje za bolezni srca, se lahko zdravilo Atorvastatin Teva uporablja tudi za zmanjševanje tveganja, čeprav je raven holesterola v vaši krvi normalna. Med zdravljenjem je treba nadaljevati standardno prehrano za zniževanje ravni holesterola.

Holesterol je snov, ki je normalno prisotna v telesu in je potrebna za normalno rast. Če pa je holesterola v krvi preveč, se lahko začne odlagati na stene žil, ki se zato sčasoma lahko zamašijo. To je eden najpogostejših razlogov za bolezni srca. Znano je, da zvišana raven holesterola povečuje tveganje za bolezni srca. Drugi dejavniki, ki povečujejo tveganje za bolezni srca, so visok krvni pritisk, sladkorna bolezen, povečana telesna masa, pomanjkanje gibanja, kajenje ali prisotnost bolezni srca v družini.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO ATORVASTATIN TEVA**Ne jemljite zdravila Atorvastatin Teva**

- če ste alergični (preobčutljivi) na atorvastatin ali podobna zdravila, ki se uporabljajo za zniževanje ravni maščob v krvi, ali na katerikoli sestavino tega zdravila; za podrobnosti glejte poglavje 6;
- če imate ali ste kdaj imeli kakšno bolezen jeter;
- če ste kdaj dobili nenormalne in nepojasnjene izvide krvnih preiskav delovanja jeter;
- če ste ženska v rodni dobi in ne uporabljate zanesljive kontracepcijske zaščite;
- če ste noseči, skušate zanositi ali dojite;
- če imate bolezen mišic, imenovano miopatija (ponavljajoče se bolečine in krči v mišicah)

nepojasnjene izvora).

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Atorvastatin Teva

Zdravilo Atorvastatin Teva za vas morda ni primerno zaradi naslednjih razlogov:

- če imate težave z ledvicami;
- če imate premalo aktivno žlezo ščitnico (hipotiroidizem);
- če ste imeli ponavljajoče se in nepojasnjene bolečine v mišicah ter osebno ali družinsko zgodovino težav z mišicami;
- če ste v preteklosti imeli težave z mišicami med zdravljenjem z drugimi zdravili za zniževanje ravni maščob v krvi (npr. zdravili iz skupine statinov ali fibratov);
- če redno uživate večje količine alkohola;
- če ste kdaj imeli kakšno bolezen jeter;
- če ste starejši od 70 let.

Če karkoli od zgoraj naštetega velja za vas, bo vaš zdravnik izvedel preiskave krvi pred zdravljenjem z zdravilom Atorvastatin Teva in verjetno tudi med njim, da bi ocenil tveganje za pojav neželenih učinkov, povezanih z mišicami. Znano je, da se tveganje za pojav nekaterih neželenih učinkov, povezanih z mišicami, poveča, če se sočasno z atorvastatinom jemljejo nekatera druga zdravila (glejte »Jemanje drugih zdravil« spodaj).

Če imate hudo okvaro dihal, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden začnete jemati zdravilo Atorvastatin Teva.

Pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let, uporabe zdravila Atorvastatin Teva niso preučevali dalj kot eno leto. Učinkov zdravila niso preučili pri otrocih, mlajših od 10 let, ali deklicah, ki še niso dobile prve menstruacije.

Jemanje drugih zdravil

Nekatera zdravila lahko spremenijo učinek zdravila Atorvastatin Teva ali pa zdravilo Atorvastatin Teva vpliva na njihov učinek. Ta vrsta medsebojnega delovanja lahko zmanjša učinkovitost enega ali obeh zdravil. Druga možnost je, da se povečata tveganje za pojav neželenih učinkov ali njihova izrazitost, vključno s pomembno, vendar redko boleznijo s propadanjem mišic, ki se imenuje rabdomioliza (glejte poglavje 4 spodaj). Preden vzamete zdravilo Atorvastatin Teva, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli od naslednjih zdravil:

- zdravila, ki spremenijo delovanje imunskega sistema, npr. ciklosporin;
- nekateri antibiotiki ali zdravila proti glivicam, npr. telitromicin, eritromicin, klaritromicin, ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, rifampicin;
- druga zdravila za uravnavanje ravni maščob v krvi, npr. gemfibrozil, drugi fibrati, derivati nikotinske kisline, holestipol, ezetimib;
- nekatera zdravila iz skupine zaviralcev kalcijevih kanalčkov, ki se uporabljajo za zdravljenje angine pektoris ali visokega krvnega tlaka, npr. nifedipin in diltiazem; zdravila, ki uravnavajo srčni ritem, npr. digoksin;
- nekateri benzodiazepini, ki se uporabljajo za zdravljenje anksioznosti in drugih stanj, npr. nefazodon;
- zaviralci proteaze, ki se uporabljajo proti virusu HIV, npr. nelfinavir;
- druga zdravila, ki imajo lahko z atorvastatinom medsebojne učinke, so varfarin (zdravilo za zmanjševanje strjevanja krvi), peroralni kontraceptivi, fenitoin (antikonvulziv za zdravljenje epilepsije) in antacidi (zdravila proti prebavnim motnjam, ki vsebujejo aluminij ali magnezij).

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Jemanje zdravila Atorvastatin Teva skupaj s hrano in pijačo

Navodila za jemanje zdravila Atorvastatin Teva preberite v poglavju 3. Upoštevajte tudi naslednje

informacije:

Grenivkin sok

Na dan ne spijte več kot enega ali dveh majhnih kozarcev grenivkinega soka, saj lahko ta v velikih količinah spremeni učinek atorvastatina.

Alkohol

V obdobju jemanja tega zdravila ne pijte večjih količin alkohola. Za podrobnosti glejte poglavje 2 »Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Atorvastatin Teva«.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali če skušate zanositi, ne smete jemati zdravila Atorvastatin Teva. Ženske v rodni dobi morajo uporabljati učinkovito kontracepcijsko zaščito.

Če dojite, ne smete jemati zdravila Atorvastatin Teva.

Varnost uporabe atorvastatina med nosečnostjo in dojenjem še ni ugotovljena.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ne vozite, če to zdravilo vpliva na vašo sposobnost za vožnjo. Če zdravilo vpliva na vašo sposobnost za uporabo orodij ali strojev, jih ne uporabljajte.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Atorvastatin Teva

To zdravilo vsebuje laktozo. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z njim.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO ATORVASTATIN TEVA

Običajen začetni odmerek zdravila Atorvastatin Teva je 10 mg enkrat dnevno. Zdravnik vam lahko povečuje odmerek, dokler ne boste dobivali odmerka, ki ga potrebujete. Zdravnik bo odmerek prilagajal v presledku štirih tednov ali več. Največji odmerek je 80 mg zdravila Atorvastatin Teva enkrat dnevno.

Tablete Atorvastatin Teva morate vzeti cele in z nekaj tekočine. Vzamete jih lahko ob kateremkoli času, s hrano ali brez nje. Vendar skušajte tableto vzeti vsak dan ob istem času.

Pri jemanju zdravila Atorvastatin Teva vedno natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Pred začetkom zdravljenja vam bo zdravnik predpisal prehrano z nizko vsebnostjo holesterola, ki se je morate držati tudi med zdravljenjem z zdravilom Atorvastatin Teva.

Trajanje zdravljenja z zdravilom Atorvastatin Teva bo določil zdravnik.

Če menite, da je učinek zdravila Atorvastatin Teva premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Atorvastatin Teva, kot bi smeli

Če pomotoma vzamete preveč tablet Atorvastatin Teva (več kot vaš običajni dnevni odmerek), se za nasvet obrnite na svojega zdravnika ali najbližjo bolnišnico.

Če ste pozabili vzeti zdravilo <Atorvastatin Teva>

Če pozabite vzeti odmerek, vzemite naslednji odmerek ob predpisanem času. Ne vzemite dvojnega odmerka, da bi nadomestili pozabljenega.

Če ste prenehali jemati zdravilo Atorvastatin Teva

Če želite prenehati jemati zdravilo Atorvastatin Teva, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Atorvastatin Teva neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Naslednji neželeni učinki so pomembni in v primeru, da jih izkusite, bo potrebno takojšnje ukrepanje:

- nenadna alergijska reakcija z zasoplostjo, težavami pri dihanju, izpuščajem in znižanjem krvnega tlaka ali oteklostjo obraza, jezika in sapnika, ki lahko povzroči hude težave pri dihanju (angionevrotski edem). To so zelo redki neželeni učinki, ki pa so lahko nevarni. Če se pojavijo, prenehajte jemati zdravilo Atorvastatin Teva in takoj obvestite svojega zdravnika;
- nastanek hudih mehurjev na koži, ustih, očeh in genitalijah (Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza). To je zelo redek neželen učinek, ki pa je lahko nevaren. Če se pojavi, prenehajte jemati zdravilo Atorvastatin Teva in takoj obvestite svojega zdravnika;
- občasno je pri bolnikih prišlo do propadanja mišic ali vnetja, in zelo redko je to vodilo v hudo, potencialno smrtno nevarno stanje (imenovano »rabdomioliza«). Če čutite šibkost v mišicah, občutljivost na dotik ali bolečino, in še posebej, če to spremljata slabo počutje in vročina, prenehajte jemati zdravilo Atorvastatin Teva in takoj obvestite svojega zdravnika.

Zelo redki neželeni učinki se pojavijo pri manj kot 1 od 10.000 bolnikov, redki neželeni učinki pa pri 1 do 10 od 10.000 bolnikov, ki jemljejo Atorvastatin Teva.

- Če se pojavijo težave z nepričakovanimi ali nenavadnimi krvavitvami ali podplutbami, lahko to kaže na težave z jetri. Posvetujte se z zdravnikom takoj, ko bo mogoče.

Drugi možni neželeni učinki pri jemanju zdravila Atorvastatin Teva

Med pogostimi neželenimi učinki (ki se pojavijo pri 1 do 10 od 100 bolnikov) so:

- navzeja (slabost s siljenjem na bruhanje), bolečine v trebuhu, zaprtost, vetrovi, prebavne težave, glavobol, bolečine v mišicah, šibkost, driska, nespečnost, vrtoglavica, bolečine v prsih, alergijske reakcije, odrevenelost ali mravljinčenje v prstih na rokah in nogah, zmanjšana občutljivost kože za rahel dotik ali bolečino, bolečine v sklepih, bolečine v hrbtu, oteklost, zlasti gležnjev (edem), utrujenost, kožni izpuščaj, srbenje.

Pri nekaterih bolnikih, ki so jemali zdravilo Atorvastatin Teva ali druga zdravila te vrste, so opažali druge manj pogoste neželene učinke. Ni nujno, da so bili vsi ti neželeni učinki povezani z uporabo tega zdravila.

Med občasnimi neželenimi učinki (ki se pojavijo pri 1 do 10 od 1.000 bolnikov) so:

- izguba apetita (anoreksija), bruhanje, kožni izpuščaj, bolezen mišic, nepričakovane krvavitve ali podplutbe, zvonjenje v ušesih in/ali v glavi, pridobivanje telesne mase, izguba spomina, koprivnica, slabo počutje, impotenca, izpadanje las, pankreatitis (vnetje trebušne slinavke, ki povzroči bolečine v želodcu), upadanje in naraščanje ravni sladkorja v krvi (če imate sladkorno bolezen, morate še naprej skrbno spremljati raven sladkorja v krvi).

Med redkimi neželenimi učinki (ki se pojavijo pri več kot 1 od 10.000, vendar manj kot 1 od 1.000 bolnikov) so:

- vnetje jeter (hepatitis), zlatenica (porumenela koža ali očesna beločnica).

Med zelo redkimi neželenimi učinki (ki se pojavijo pri manj kot 1 od 10.000 bolnikov) so:

- neenakomerni rdeči izpuščaji (multiformni eritem), spremenjen okus, motnje vida, spremembe v delovanju jeter, poslabšanje sluha, povečanje prsi pri moških in ženskah (ginekomastija), poškodba kite.

Pri uporabi nekaterih statinov so opisali naslednje neželene učinke: motnje spanja, vključno z nočnimi morami, izguba spomina, spolne motnje, depresija in težave z dihanjem, vključno z dolgotrajnim kašljem in/ali zasoplostjo ali povišano telesno temperaturo.

Če izkusite neželene učinke, o tem obvestite svojega zdravnika. Ta bo odločil o nadaljnjem ravnanju.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA ATORVASTATIN TEVA

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Atorvastatin Teva ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na vsebniku in zunanji ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte v originalni ovojnini, za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

Rok uporabnosti po prvem odprtju plastenke: 30 dni.

Ne uporabljajte zdravila Atorvastatin Teva, če ste opazili vidne znake kvarjenja.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Atorvastatin Teva

- Zdravilna učinkovina v zdravilu Atorvastatin Teva je atorvastatin.
Ena 10 mg tableta vsebuje 10 mg atorvastatina (v obliki kalcijevega atorvastatinata).
Ena 20 mg tableta vsebuje 20 mg atorvastatina (v obliki kalcijevega atorvastatinata).
Ena 40 mg tableta vsebuje 40 mg atorvastatina (v obliki kalcijevega atorvastatinata).
Ena 80 mg tableta vsebuje 80 mg atorvastatina (v obliki kalcijevega atorvastatinata).
- Pomožne snovi so laktoza monohidrat, krosповidon, lahki magnezijev karbonat, koloidni brezvodni silicijev dioksid in magnezijev stearat. Obloga tablet Atorvastatin Teva vsebuje polidekstrozo (E1200), titanov dioksid (E171), hipromelozo 15cP (E464) in makrogol 4000.

Kako je zdravilo Atorvastatin Teva videti in vsebina pakiranja

- Filmsko obložena tableta.
- 10 mg: bela do skoraj bela, filmsko obložena tableta v obliki kapsule, z vtisnjenim napisom »93« na eni in »7310« na drugi strani.
20 mg: bela do skoraj bela, filmsko obložena tableta v obliki kapsule, z vtisnjenim napisom »93« na eni in »7311« na drugi strani.
40 mg: bela do skoraj bela, filmsko obložena tableta v obliki kapsule, z vtisnjenim napisom »93« na eni in »7312« na drugi strani.
80 mg: bela do skoraj bela, filmsko obložena tableta v obliki kapsule, z vtisnjenim napisom

- »93« na eni in »7313« na drugi strani.
- Zdravilo Atorvastatin Teva je na voljo v naslednjih pakiranjih:
 - bela plastenka iz polietilena velike gostote (HDPE) s polipropilensko zaporko, sušilom iz silikagela in sredstvom za absorpcijo kisika, ki vsebuje: 1, 4, 7, 10, 14, 15, 20, 28 ali 30 filmsko obloženih tablet.
 - Sušilo in sredstva za absorpcijo kisika morajo v obdobju uporabe ostati v plastenki.
 - Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila Atorvastatin Teva

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Teva Pharma B.V.
Computerweg 10, 3542 DR Utrecht
Nizozemska

Izdelovalec

TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Velika Britanija

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemska

TEVA SANTE
Rue Bellocier, 89107 Sens, Francija

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Madžarska

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllő, Madžarska

TEVA Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava –Komárov, Češka

Za zdravilo je izdano dovoljenje za promet v državah članicah EGP pod naslednjimi imeni:

Avstrija	Atorvastatin TEVA 10 mg Filmtabletten Atorvastatin TEVA 20 mg Filmtabletten Atorvastatin TEVA 40 mg Filmtabletten Atorvastatin TEVA 80 mg Filmtabletten
Belgija	Atorvastatine TEVA 10 mg filmomhulde tabletten Atorvastatine TEVA 20 mg filmomhulde tabletten Atorvastatine TEVA 40 mg filmomhulde tabletten Atorvastatine TEVA 80 mg filmomhulde tabletten
Bolgarija	Avanor 10 mg Film-coated tablets Avanor 20 mg Film-coated tablets Avanor 40 mg Film-coated tablets Avanor 80 mg Film-coated tablets
Češka	Atorvastatin Teva 10 Atorvastatin Teva 20 mg Atorvastatin Teva 40 mg Atorvastatin Teva 80 mg
Danska	Atorvastatin Teva (10, 20, 40 & 80 mg)
Estonija	Atorvastatin Teva (10, 20, 40 & 80 mg)
Francija	Atorvastatine Teva 10 mg comprimé pelliculé

	Atorvastatine Teva 20 mg comprimé pelliculé
	Atorvastatine Teva 40 mg comprimé pelliculé
	Atorvastatine Teva 80 mg comprimé pelliculé
Grčija	Atorvastatin Teva 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Irska	Atorvastatin Teva 10 mg Film-coated Tablets
	Atorvastatin Teva 20 mg Film-coated Tablets
	Atorvastatin Teva 40 mg Film-coated Tablets
	Atorvastatin Teva 80 mg Film-coated Tablets
Italija	Atorvastatina Teva 10 mg compresse rivestite con film
	Atorvastatina Teva 20 mg compresse rivestite con film
	Atorvastatina Teva 40 mg compresse rivestite con film
	Atorvastatina Teva 80 mg compresse rivestite con film
Latvija	Atorvastatin Teva 10, 20, 40 & 80 mg apvalkotās tabletes
Litva	Atorvastatin Teva 10 mg plėvele dengtos tabletės
	Atorvastatin Teva 20 mg plėvele dengtos tabletės
	Atorvastatin Teva 40 mg plėvele dengtos tabletės
	Atorvastatin Teva 80 mg plėvele dengtos tabletės
Luksemburg	Atorvastatine TEVA 10 mg comprimés pelliculés
	Atorvastatine TEVA 20 mg comprimés pelliculés
	Atorvastatine TEVA 40 mg comprimés pelliculés
	Atorvastatine TEVA 80 mg comprimés pelliculés
Madžarska	Atorvastatin- Teva 10 mg filtabletta
	Atorvastatin- Teva 20 mg filtabletta
	Atorvastatin- Teva 40 mg filtabletta
	Atorvastatin- Teva 80 mg filtabletta
Nemčija	Atorvastatin Teva 10 mg Filmlipetten
	Atorvastatin Teva 20 mg Filmlipetten
	Atorvastatin Teva 40 mg Filmlipetten
	Atorvastatin Teva 80 mg Filmlipetten
Nizozemska	Atorvastatine 10 mg PCH, filmomhulde lipetten
	Atorvastatine 20 mg PCH, filmomhulde lipetten
	Atorvastatine 40 mg PCH, filmomhulde lipetten
	Atorvastatine 80 mg PCH, filmomhulde lipetten
Norveška	Atorvastatin Teva 10 mg filmdrasjerte lipetter
	Atorvastatin Teva 20 mg filmdrasjerte lipetter
	Atorvastatin Teva 40 mg filmdrasjerte lipetter
	Atorvastatin Teva 80 mg filmdrasjerte lipetter
Poljska	Atorvastatin Teva (10, 20, 40 & 80 mg)
Portugalska	Atorvastatina Teva (10, 20, 40 & 80 mg)
Romunija	Atorvastatină TEVA 10 mg comprimate filmate
	Atorvastatină TEVA 20 mg comprimate filmate
	Atorvastatină TEVA 40 mg comprimate filmate
	Atorvastatină TEVA 80 mg comprimate filmate
Slovaška	Atorvastatin Teva 10 mg
	Atorvastatin Teva 20 mg
	Atorvastatin Teva 40 mg
	Atorvastatin Teva 80 mg
Slovenija	Atorvastatin Teva 10 mg filmsko obložene tablete
	Atorvastatin Teva 20 mg filmsko obložene tablete
	Atorvastatin Teva 40 mg filmsko obložene tablete
	Atorvastatin Teva 80 mg filmsko obložene tablete
Španija	Atorvastatina Teva 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG
	Atorvastatina Teva 20 mg comprimidos recubiertos con película EFG
	Atorvastatina Teva 40 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Velika Britanija Atorvastatina Teva 80 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Atorvastatin 10 mg Film-coated Table
Atorvastatin 20 mg Film-coated Tablets
Atorvastatin 40 mg Film-coated Tablets
Atorvastatin 80 mg Film-coated Tablets

Navodilo je bilo odobreno

7.12.2009