

NAVODILO ZA UPORABO

Lansoprazol Teva 15 mg orodisperzibilne tablete Lansoprazol Teva 30 mg orodisperzibilne tablete lansoprazol

Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujete s svojim zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujete se tudi, če opazite katerekoli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

NAVODILO VSEBUJE:

1. **Kaj je zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete in za kaj ga uporabljamo**
2. **Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete**
3. **Kako jemati zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete**
4. **Možni neželeni učinki**
5. **Shranjevanje zdravila Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete**
6. **Vsebina pakiranja in dodatne informacije**

1. **KAJ JE ZDRAVILO LANSOPRAZOL TEVA ORODISPERZIBILNE TABLETE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO**

Zdravilna učinkovina v zdravilu Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete je lansoprazol, ki je zaviralec protonske črpalke. Zaviralci protonske črpalke zmanjšujejo količino kisline, ki jo proizvaja želodec.

Zdravnik vam lahko predpiše zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete za naslednje indikacije:

- zdravljenje razjede na želodcu ali dvanajstniku;
- zdravljenje vnetja požiralnika (refluksnega ezofagitisa);
- preprečevanje refluksnega ezofagitisa;
- zdravljenje zgage in vračanje kisline;
- zdravljenje okužb z bakterijo *Helicobacter pylori* v kombinaciji z antibiotično terapijo;
- zdravljenje ali preprečevanje razjede na želodcu ali dvanajstniku pri bolnikih, ki potrebujejo trajno zdravljenje z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili (ta zdravila se uporabljajo proti bolečinam ali vnetju);
- zdravljenje Zollinger-Ellisonovega sindroma.

Zdravnik vam lahko predpiše zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete tudi za kakšno drugo indikacijo ali v drugačnem odmerku, kot je navedeno v tem navodilu. Pri jemanju zdravila natančno upoštevajte zdravnikova navodila.

2. **KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO LANSOPRAZOL TEVA ORODISPERZIBILNE TABLETE**

Ne jemljite zdravila Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete, če:

- ste alergični (preobčutljivi) na lansoprazol ali katerokoli sestavino zdravila Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete;

- jemljete zdravilo, ki vsebuje zdravilno učinkovino atazanavir (uporablja se za zdravljenje okužbe z virusom HIV).

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete

Zdravniku morate povedati, če imate hudo bolezen jeter. Morda vam bo moral prilagoditi odmere. Zdravnik bo morda opravil ali je že opravil dodatno preiskavo, ki se imenuje endoskopija, da bi diagnosticiral vašo bolezen oziroma izključil maligno obolenje.

- Če se med zdravljenjem pojavi driska, se takoj posvetujte z zdravnikom, kajti zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete je povezano z nekoliko večjo pogostostjo infekcijske driske.
- Če vam je zdravnik predpisal zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete poleg drugih zdravil (antibiotikov), namenjenih zdravljenju okužbe z bakterijo *Helicobacter pylori*, ali poleg protivnetnih zdravil za zdravljenje bolečin ali revmatske bolezni, natančno preberite tudi navodila za uporabo teh zdravil.
- Če jemljete Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete dolgotrajno (več kot eno leto), vas bo zdravnik verjetno redno kontroliral. Kadar obiščete zdravnika, mu morate povedati za vse nove ali nenavadne simptome in okoliščine.

Jemanje zdravil iz skupine zaviralcev protonске črpalke, kot na primer zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete, zlasti v obdobju, ki je daljše od 1 leta, lahko poveča tveganje za zlom kolka, zapetja in hrbtebice. Zdravniku povejte, če imate osteoporozo ali če jemljete kortikosteroide (ki lahko povečajo tveganje za osteoporozo).

Otroci

Uporaba zdravila Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete se ne priporoča pri otrocih, ker so klinični podatki omejeni. Zdravljenje otrok z gastroezofagialnim refluksom, mlajših od enega leta se ne priporoča, ker razploščljivi podatki niso pokazali učinkovitosti.

Druga zdravila in zdravilo Lansoprazol Teva

Obvestite svojega zdravnika, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Še zlasti morate zdravniku povedati, če jemljete zdravila, ki vsebujejo katero od naslednjih zdravilnih učinkovin, kajti zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete lahko vpliva na njihovo delovanje:

- ketokonazol, itrakonazol, rifampicin (uporabljajo se za zdravljenje okužb),
- digoksin (uporablja se za zdravljenje težav s srcem),
- teofilin (uporablja se za zdravljenje astme),
- takrolimus (uporablja se za preprečevanje zavrnitve presadkov),
- fluvoksamin (uporablja se za zdravljenje depresije in drugih psihiatričnih bolezni),
- antacidi (uporabljajo se za zdravljenje zgage in vračanja kisline),
- sukralfat (uporablja se za zdravljenje razjed),
- šentjanževka (*Hypericum perforatum*) (uporablja se za zdravljenje blage depresije).

Jemanje zdravila Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete s hrano in pijačo

Zdravljenje bo najbolj uspešno, če boste Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete jemali vsaj 30 minut pred jedjo.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči, če dojite ali če obstaja možnost, da ste noseči, se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete to zdravilo.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Včasih se pri bolnikih, ki jemljejo zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete, pojavijo neželeni učinki, na primer omotica, vrtoglavica, utrujenost in motnje vida. Če ima zdravilo pri vas takšne neželene učinke, morate biti previdni, ker se lahko vaša reakcijska sposobnost poslabša.

Vi sami ste odgovorni za odločitev, ali ste sposobni voziti in opravljati druge dejavnosti, pri katerih je potrebna večja zbranost. Učinki in neželeni učinki zdravil, ki jih jemljete, so eden od dejavnikov, ki lahko zmanjšajo vašo sposobnost za varno opravljanje teh dejavnosti.

Opis teh učinkov boste našli v drugih poglavjih tega navodila.

Preberite vse informacije v navodilu, da boste vedeli, kako ravnati.

Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom, medicinsko sestro ali farmacevtom.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete

Zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete vsebuje laktozo in saharozo. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih vrst sladkorja, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

Zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete vsebuje aspartam. Aspartam je vir fenilalanina; ta lahko škoduje ljudem, ki imajo fenilketonurijo.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO LANSOPRAZOL TEVA ORODISPERZIBILNE TABLETE

Položite tableto na jezik in jo počasi sesajte. Tableta se v ustih hitro raztopi in sprostijo se mikrogranule, ki jih morate pogoltniti, ne da bi jih žvečili. Lahko tudi pogoltnete celo tableto in popijete kozarec vode.

Morda vam bo zdravnik dal napotke, kako vzeti tableto z uporabo brizge, za primer, če boste imeli hujše težave pri požiranju.

Če boste zdravilo uporabljali z brizgo, se ravnajte po naslednjih navodilih.

Pomembno je, da pozorno preskusite, ali je izbrana brizga primerna za uporabo.

- Odstranite bat brizge (za 15 mg tableto uporabite vsaj 5 ml brizgo, za 30 mg tableto pa 10 ml brizgo).
- Vstavite tableto v brizgo.
- Potisnite bat nazaj v brizgo.
- Za 15 mg tableto: v brizgo povlecite 4 ml navadne vode.
- Za 30 mg tableto: v brizgo povlecite 10 ml navadne vode.
- Obrnite brizgo in vanjo povlecite še 1 ml zraka.
- Brizgo previdno tresite 10-20 sekund, dokler se tableta ne raztopi.
- Vsebinsko lahko izpraznite neposredno v usta.
- Brizgo znova napolnite z 2-5 ml navadne vode in sperite v usta še ostanke zdravila.

Če morate jemati zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete enkrat dnevno, jih skušajte jemati vsak dan ob istem času. Učinek zdravila Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete bo verjetno najboljši, če ga boste vzeli takoj, ko vstanete.

Če jemljete zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete dvakrat dnevno, morate vzeti prvi
PIL; UK/H/1144/001-002/IB/004, UK/H/1144/001-002/II/011, UK/H/1144/001-002/IB/012/G, UK/H/1144/001-002/IIIB/015, UK/H/1144/001-002/IIIB/017, UK/H/1144/001-002/IB/018/G

odmerek zjutraj in drugega zvečer.

Odmerek zdravila Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete je odvisen od vaše bolezni. Običajni odmerki zdravila Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete za odrasle so navedeni spodaj. Zdravnik vam lahko predpiše drugačen odmerek. Povedal vam bo tudi, koliko časa bo trajalo zdravljenje.

Zdravljenje zgage in vračanje kisline: ena 15 mg ali 30 mg orodisperzibilna tableta; zdravljenje traja 4 tedne. Če simptomi še trajajo, morate to povedati zdravniku. Če se simptomi ne izboljšajo v 4 tednih, se posvetujte z zdravnikom.

Zdravljenje razjede na dvanajstniku: ena 30 mg orodisperzibilna tableta vsak dan; zdravljenje traja 2 tedna.

Zdravljenje razjede na želodcu: ena 30 mg orodisperzibilna tableta vsak dan; zdravljenje traja 4 tedne.

Zdravljenje vnetja požiralnika (refluksnega ezofagitisa): ena 30 mg orodisperzibilna tableta vsak dan; zdravljenje traja 4 tedne.

Dolgoročno preprečevanje refluksnega ezofagitisa: ena 15 mg orodisperzibilna tableta vsak dan. Zdravnik vam bo morda prilagodil odmerek na eno 30 mg orodisperzibilno tableto vsak dan.

Zdravljenje okužbe z bakterijo *Helicobacter pylori*: običajni odmerek je ena 30 mg orodisperzibilna tableta v kombinaciji z dvema različnima antibiotikoma zjutraj in ena 30 mg orodisperzibilna tableta v kombinaciji z dvema različnima antibiotikoma zvečer. Zdravljenje je ponavadi vsakodnevno in traja 7 dni.

Priporočeni kombinaciji antibiotikov sta:

- 30 mg zdravila Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete z 250-500 mg klaritromicina in 1000 mg amoksicilina,
- 30 mg zdravila Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete z 250 mg klaritromicina in 400-500 mg metronidazola.

Če se zdravite zaradi okužbe, ker imate razjedo, ni verjetno, da bi se razjeda ponovila, če se okužba uspešno pozdravi. Da bo zdravilo čim učinkovitejše, ga jemljite pravočasno in **ne izpustite nobenega odmerka**.

Zdravljenje razjed na želodcu ali dvanajstniku pri bolnikih, ki potrebujejo stalno zdravljenje z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili: ena 30 mg orodisperzibilna tableta vsak dan; zdravljenje traja 4 tedne.

Preprečevanje razjed na želodcu ali dvanajstniku pri bolnikih, ki potrebujejo stalno zdravljenje z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili: ena 15 mg orodisperzibilna tableta vsak dan. Zdravnik vam bo morda prilagodil odmerek na eno 30 mg orodisperzibilno tableto vsak dan.

Zollinger-Ellisonov sindrom: običajni odmerek na začetku zdravljenja sta dve 30 mg orodisperzibilni tableti vsak dan. Potem bo zdravnik določil odmerek, ki vam najbolj ustreza, glede na to, kako se odzivate na Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete.

Otroci: otroci ne smejo dobivati zdravila Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete.

Pri jemanju zdravila vedno natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, kako morate jemati zdravilo, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Če ste vzeli več zdravila Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete, kot bi smeli

Če vzamete več zdravila Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete, kot bi smeli, čim prej poiščite zdravniško pomoč.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete

Če pozabite vzeti odmerek, ga vzemite takoj, ko se spomnite, razen, če je že skoraj čas za naslednjega. V tem primeru izpustite pozabljeni odmerek in nadaljujte jemanje orodisperzibilnih tablet kot ponavadi.

Ne vzemite dvojnega odmerka, da bi nadomestili pozabljeno orodisperzibilno tableto.

Če ste prenehali jemati zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete

Zdravljenja ne smete predčasno končati, tudi če so se vam bolezenski znaki izboljšali. Bolezen takrat najverjetneje še ni popolnoma ozdravljena in se lahko znova pojavi, če zdravljenja ne dokončate v celoti.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila imajo lahko tudi Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete neželene učinke, vendar se ti ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Naslednji neželeni učinki so pogosti (pojavijo se pri 1 do 10 od 100 bolnikov):

- glavobol, omotica,
- driska, zaprtost, bolečine v želodcu, slabost ali bruhanje, vetrovi, suha ali pekoča usta ali žrelo,
- izpuščaji, srbenje,
- spremembe izvidov preiskav delovanja jeter,
- utrujenost.

Naslednji neželeni učinki so občasni (pojavijo se pri 1 do 10 od 1.000 bolnikov):

- depresija,
- bolečine v sklepih ali mišicah,
- zastajanje tekočine ali oteklost,
- spremembe krvne slike,
- rahlo povečanje tveganja za zlom kolka, zapestja in hrbtebice, če jemljete zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete več kot eno leto.

Naslednji neželeni učinki so redki (pojavijo se pri 1 do 10 od 10.000 bolnikov):

- vročina,
- nemirnost, zaspanost, zmedenost, halucinacije, nespečnost, motnje vida, vrtoglavica,
- spremenjeno okušanje, izguba apetita, vnetje jezika (glositis),
- kožne reakcije, na primer pekoč ali zbadajoč občutek pod kožo, podplutbe, pordelost in čezmerno znojenje,
- občutljivost za svetlobo,
- izpadanje las,
- mravljinčenje (parestezije), tresenje,
- anemija (bledica),
- težave z ledvicami,
- vnetje trebušne slinavke (pankreatitis),
- vnetje jeter (pokaže se lahko s porumenelostjo kože ali oči),
- otekanje prsi pri moških, impotenca,

- kandidoza (glivična okužba, lahko se pojavi na koži ali sluznicah),
- angioedem. Če se pri vas pojavijo znaki angioedema (na primer oteklost obraza, jezika ali žrela, težave s požiranjem, koprivnica in težave z dihanjem), morate nemudoma k zdravniku.

Naslednji neželeni učinki so zelo redki (pojavijo se pri manj kot 1 od 10.000 bolnikov):

- hude preobčutljivostne reakcije, vključno z anafilaktičnim šokom. Med simptomi preobčutljivostne reakcije so lahko vročina, izpuščaji, oteklost in včasih padec krvnega tlaka,
- vnetje ust (stomatitis),
- kolitis (vnetje črevesa),
- spremembe izvidov preiskav, na primer koncentracije natrija, holesterola in trigliceridov,
- zelo hude kožne reakcije s pordelostjo, mehurji, hudim vnetjem in odstopanjem kože,
- zelo redko lahko zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete povzroči zmanjšanje števila belih krvnih celic in tako poslabša odpornost proti okužbam. Če imate okužbo s simptomi, kot so vročina in hudo poslabšanje splošnega zdravstvenega stanja ali vročina s simptomi lokalne okužbe, na primer vnetim žrelom/grlom/usti ali težavami s sečili, morate nemudoma obiskati zdravnika. Zdravnik bo s preiskavo krvi preveril, ali imate zmanjšano število belih krvnih celic (agranulocitoza).

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- ne srbeč, izsušen, okrogle oblike, luskav izpuščaj (kutani lupus eritematosus),
- če jemljete zdravilo Lansoprazol Teva več kot tri mesece se lahko raven magnezija v krvi zniža. Nizka raven magnezija v krvi lahko povzroči utrujenost, nenadzorovano krčenje mišic, zmedenost, krče, omotico, povečanje srčnega utripa. Če opazite katerikoli od naštetih neželenih učinkov, to takoj povejte zdravniku. Nizka raven magnezija lahko vodi tudi do zmanjšanja kalija ali kalcija v krvi. Zdravnik se lahko odloči za redne preiskave krvi za spremljanje vrednosti magnezija v krvi.

Če se pri vas pojavi resen neželeni učinek ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite zdravnika.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA LANSOPRAZOL TEVA ORODISPERZIBILNE TABLETE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte v originalni ovojnini, za zagotovitev zaščite pred vlago.

Zdravila Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete ne smete jemati po izteku roka uporabnosti, ki je naveden na pretisnem omotu in škatli. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete

Zdravilna učinkovina v zdravilu Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete je lansoprazol.

Ena 15 mg orodisperzibilna tableta vsebuje 15 mg lansoprazola.

Ena 30 mg orodisperzibilna tableta vsebuje 30 mg lansoprazola.

Druge sestavine so sladkorne kroglice (saharoza in koruzni škrob), hipromeloza, smukec, magnezijev karbonat, kopolimer metakrilne kisline in etilakrilata (1:1), trietilcitrát, titanov dioksid (E 171), koloidni brezvodni silicijev dioksid, laktoza monohidrat, koruzni škrob, aspartam, aroma jagode in magnezijev stearat.

PIL; UK/H/1144/001-002/IB/004, UK/H/1144/001-002/II/011, UK/H/1144/001-002/IB/012/G, UK/H/1144/001-002/IB/015, UK/H/1144/001-002/IB/017, UK/H/1144/001-002/IB/018/G

Izgled zdravila Lansoprazol Teva in vsebina pakiranja

Lansoprazol Teva 15 mg orodisperzibilne tablete: bela do skoraj bela, ploščata, okrogla tableta s prireznim robom, z vtisnjnim napisom »15« na eni strani in gladka na drugi strani. Vsaka orodisperzibilna tableta vsebuje bele do sivkaste gastrorezistentne granule.

Lansoprazol Teva 30 mg orodisperzibilne tablete: bela do skoraj bela, ploščata, okrogla tableta s prireznim robom, z vtisnjnim napisom »30« na eni strani in gladka na drugi strani. Vsaka orodisperzibilna tableta vsebuje bele do sivkaste gastrorezistentne granule.

Lansoprazol Teva orodisperzibilne tablete so na voljo v pakiranjih s pretisnimi omoti iz aluminija – aluminija:

15 mg: 1, 7, 14, 28, 30, 30 (3 x 10), 50, 56, 98 in 100 orodisperzibilnih tablet

30 mg: 1, 2, 7, 14, 28, 30, 30 (3 x 10), 50, 56, 98 in 100 orodisperzibilnih tablet.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila Lansoprazol Teva

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, Nizozemska

Izdelovalci

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Velika Britanija

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem

Nizozemska

TEVA SANTE

Rue Bellocier, 89107 Sens

Francija

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Madžarska

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncics Mihály út 82, H-2100 Gödöllő

Madžarska

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava –Komárov

Česka

Za zdravilo je izdano dovoljenje za promet v državah članicah EGP pod naslednjimi imeni:

Avstrija	Lansoprazol Teva 15 mg Schmelztabletten Lansoprazol Teva 30 mg Schmelztabletten
Česka	Lansoprazol - Teva 15 mg OD Tablety Lansoprazol - Teva 30 mg OD Tablety
Francija	Lansoprazole TEVA [®] 15 mg comprimé orodispersible Lansoprazole TEVA [®] 30 mg comprimé orodispersible

PIL; UK/H/1144/001-002/IB/004, UK/H/1144/001-002/II/011, UK/H/1144/001-002/IB/012/G, UK/H/1144/001-002/II/015, UK/H/1144/001-002/II/017, UK/H/1144/001-002/IB/018/G

Grčija	Lansoprazole Teva 15 mg δισκία διασπειρόμενα στο στόμα Lansoprazole Teva 30 mg δισκία διασπειρόμενα στο στόμα
Irska	Lansoprazole Teva 15 mg Orodispersible tablet Lansoprazole Teva 30 mg Orodispersible tablet
Madžarska	Refluxon 15 mg szájban diszpergálódó tabletta Refluxon 30 mg szájban diszpergálódó tabletta
Nemčija	Lansoprazol-TEVA® 15 mg Schmelztabletten Lansoprazol-TEVA® 30 mg Schmelztabletten
Norveška	Lansoprazol Teva 15 mg, Smeltetabletter Lansoprazol Teva 30 mg, Smeltetabletter
Poljska	Lantrea ODT (15 & 30 mg)
Portugalska	Lansoprazol Prapic (15 & 30 mg)
Romunija	Lansoprazol TEVA 15 mg comprimate orodispersabile Lansoprazol TEVA 30 mg comprimate orodispersabile
Slovenija	Lansoprazol TEVA 15 mg orodisperzibilne tablete Lansoprazol TEVA 30 mg orodisperzibilne tablete
Španija	Lanzol Teva 15 mg comprimidos bucodispersables Lanzol Teva 30 mg comprimidos bucodispersables
Švedska	Lansoprazol Teva 15 mg munsönderfallande tablett Lansoprazol Teva 30 mg munsönderfallande tablet
Velika Britanija	Lansoprazole 15 mg Orodispersible tablet Lansoprazole 30 mg Orodispersible tablet

Navodilo je bilo odobreno 31.10.2012