

NAVODILO ZA UPORABO

Navodilo za uporabo
Valcyte 50 mg/ml prašek za peroralno raztopino
valganciklovir

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Valcyte in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Valcyte
3. Kako jemati zdravilo Valcyte
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Valcyte
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Valcyte in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Valcyte spada v skupino zdravil, ki neposredno preprečujejo rast virusov. Učinkovina valganciklovir, ki je v tem prašku, se v telesu spremeni v ganciklovir. Ganciklovir prepreči virusu, imenovanem citomegalovirus (CMV), razmnoževanje in vdiranje v zdrave celice. Bolnikom z oslabeлим imunskim sistemom lahko ta virus povzroči okužbo organov. To je lahko smrtno nevarno.

Zdravilo Valcyte se uporablja:

- za zdravljenje okužb mrežnice s CMV (citomegalovirusnega retinitisa) pri odraslih bolnikih s sindromom pridobljene imunske pomanjkljivosti (aidsom). Okužba očesne mrežnice s CMV lahko povzroči težave z vidom in celo slepoto,
- za preprečevanje okužbe s CMV pri odraslih in otrocih, ki niso okuženi s CMV, prejeli pa so presajen organ od osebe, ki je bila okužena z njim.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Valcyte

Ne jemljite zdravila Valcyte

- če ste alergični na valganciklovir, ganciklovir ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če dojite.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden boste vzeli zdravilo Valcyte:

- če ste alergični na aciklovir, penciklovir, valaciclovir ali famciklovir; to so druga zdravila, ki se uporabljajo pri virusnih okužbah,

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Valcyte:

- če imate majhno število belih krvnih celic, rdečih krvnih celic ali krvnih ploščic (majhnih celic, ki sodelujejo pri strjevanju krvi) v krvi. Zdravnik bo opravil preiskave krvi, preden boste začeli jemati zdravilo Valcyte, in dodatne preiskave med obdobjem vašega zdravljenja s tem zdravilom,
- če imate obsevanje (radioterapijo),

- če imate težave z ledvicami. Zdravnik vam bo morda moral predpisati manjši odmerek in med zdravljenjem pogosteje opraviti preiskavo krvi.

Druga zdravila in zdravilo Valcyte

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo; to velja tudi za zdravila, ki ste jih dobili brez recepta.

Če hkrati z zdravilom Valcyte jemljete še druga zdravila, lahko takšna kombinacija vpliva na količino zdravila, ki pride v krvni obtok, in ima lahko škodljive učinke. Obvestite zdravnika, če že jemljete zdravila, ki vsebujejo kaj od naštetega:

- imipenem-cilastatin (antibiotik). Jemanje tega skupaj z zdravilom Valcyte lahko povzroči konvulzije (napade krčev),
- zidovudin, didanozin, lamivudin, stavudin, tenofovir, abakavir, emtricitabin ali podobna zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje aidsa,
- adefovir ali katero koli drugo zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje hepatitisa B,
- probenecid (zdravilo proti protinu). Jemanje probenecida hkrati z zdravilom Valcyte lahko poveča količino ganciklovirja v krvi,
- mofetilmikofenolat, ciklosporin ali takrolimus (uporabljajo se po presaditvah),
- vinkristin, vinblastin, doksorubicin, hidroksisečnino ali podobna zdravila za zdravljenje raka,
- trimetoprim, kombinacije trimetoprim/sulfa ali dapson (antibiotiki),
- pentamidin (zdravilo za zdravljenje zajedavcev ali okužb pljuč),
- flucitozin ali amfotericin B (zdravili proti glivicam).

Zdravilo Valcyte skupaj s hrano in pijačo

Zdravilo Valcyte je treba vzeti s hrano. A če iz kakršnega koli razloga ne morete jesti, morate kljub temu vzeti odmerek zdravila Valcyte kot po navadi.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Zdravila Valcyte ne smete jemati, če ste noseči, razen če vam tako svetuje zdravnik. Če ste noseči ali načrtujete zanositev, morate to povedati zdravniku. Jemanje zdravila Valcyte med nosečnostjo lahko škoduje nerojenemu otroku.

Zdravila Valcyte ne smete jemati, če dojite. Če zdravnik želi, da se začnete zdraviti z zdravilom Valcyte, morate prenehati dojit, preden boste začeli jemati to zdravilo.

Ženske v rodni dobi morajo med jemanjem zdravila Valcyte in vsaj 30 dni po končanem zdravljenju uporabljati učinkovito kontracepcijo.

Moški, katerih partnerke bi lahko zanosile, morajo uporabljati kondome med jemanjem zdravila Valcyte in še 90 dni po koncu zdravljenja.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Če ste med jemanjem tega zdravila omotični, utrujeni, se tresete ali ste zmedeni, ne upravljajte vozil in strojev.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden boste vzeli katero koli zdravilo.

Zdravilo Valcyte vsebuje natrijev benzoat (E 211) in natrij (sol)

To zdravilo vsebuje 100 mg natrijevega benzoata v 12 g steklenički, kar ustreza 1 mg/ml po pripravi. Benzoat lahko povzroči zlatenico (rumeno obarvanje kože in oči) pri novorojenčkih (do 4. tedna starosti).

Podatek za bolnike, ki uživajo prehrano z nadzorovano količino natrija: to zdravilo vsebuje skupno 0,188 mg natrija na mililiter, kar v bistvu pomeni "brez natrija".

3. Kako jemati zdravilo Valcyte

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Z raztopino zdravila Valcyte morate ravnati previdno. Pazite, da ne pride na kožo ali v oko. Če raztopina po nesreči pride na kožo, predel temeljito umijte z milom in vodo. Če raztopina po nesreči pride v oko, oko temeljito izperite z vodo.

Pri jemanju zdravila se morate držati dnevnega odmerka peroralne raztopine, ki ga je predpisal zdravnik, da boste preprečili preveliko odmerjanje.

Peroralno raztopino zdravila Valcyte je treba vzeti s hrano, če je le mogoče – glejte poglavje 2.

Pomembno je, da za merjenje odmerka raztopine zdravila Valcyte uporabljate odmernik, priložen v pakiranju. Teh odmernikov ne uporabljajte za druga zdravila. Priložena sta dva odmernika, vsakega zavržete po 20 uporabah. Odmernik je izdelan tako, da odmeri do 10 ml (500 mg) raztopine v korakih po 0,5 ml (25 mg). 1 ml peroralne raztopine zdravila Valcyte ustreza 50 mg valganciklovirja.

Potem ko vzamete odmerek zdravila, odmernik vedno temeljito umijte z destilirano ali prekuhano vodo in ga pustite, da se posuši.

Če oba odmernika zavržete, ju izgubite ali se poškodujeta, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom; svetoval vam bo, kako nadaljevati z jemanjem zdravila.

Odrasli

Preprečevanje citomegalovirusne bolezni pri bolnikih s presadki

To zdravilo morate začeti jemati v 10 dneh po presaditvi. Običajni odmerek je 900 mg raztopine zdravila Valcyte ENKRAT na dan. Uporabite priloženi odmernik, da boste vzeli dva 9-ml odmerka po 450 mg raztopine (tj. 2 odmernika, napolnjena do oznake 9 ml (450 mg)). Jemanje tega odmerka morate nadaljevati do 100 dni. Če so vam presadili ledvico, vam bo zdravnik morda svetoval, da jemljete ta odmerek 200 dni.

Zdravljenje aktivnega citomegalovirusnega retinitisa pri bolnikih z aidsom (t. i. indukcijsko zdravljenje)

Običajni odmerek je 900 mg raztopine zdravila Valcyte DVAKRAT na dan 21 dni (tri tedne). Uporabite priloženi odmernik in vzemite dva odmerka po 9 ml (450 mg) raztopine (tj. 2 odmernika, napolnjena do oznake 9 ml (450 mg)) zjutraj in dva odmerka po 9 ml (450 mg) raztopine (tj. 2 odmernika, napolnjena do oznake 9 ml (450 mg)) zvečer. Tega odmerka ne jemljite več kot 21 dni (razen če vam tako naroči zdravnik), ker se sicer lahko poveča tveganje za mogoče neželene učinke.

Dolgotrajnejše zdravljenje za preprečitev ponovitve aktivnega vnetja pri bolnikih z aidsom, ki imajo citomegalovirusni retinitis (t. i. vzdrževalno zdravljenje)

Običajni odmerek je 900 mg raztopine zdravila Valcyte ENKRAT na dan. Uporabite priloženi odmernik in vzemite dva odmerka po 9 ml (450 mg) raztopine (tj. 2 odmernika, napolnjena do oznake 9 ml (450 mg)). Prizadevajte si, da bi raztopino vzeli vsak dan ob istem času. Zdravnik vam bo povedal, koliko časa morate jemati zdravilo Valcyte. Če se vam retinitis med uporabo tega odmerka poslabša, vam bo zdravnik morda naročil, da ponovite indukcijsko zdravljenje (kot je opisano zgoraj), ali pa se bo odločil, da vam za zdravljenje okužbe s citomegalovirusom predpiše drugo zdravilo.

Starejši

Zdravilo Valcyte pri starejših ni raziskano.

Bolniki, ki imajo težave z ledvicami

Če vam ledvice ne delujejo pravilno, vam zdravnik lahko naroči, da jemljite manjši odmerek raztopine zdravila Valcyte vsak dan. **Zelo pomembno** je, da upoštevate odmerek, ki vam ga je predpisal zdravnik.

Bolniki, ki imajo težave z jetri

Zdravilo Valcyte ni raziskano pri bolnikih, ki imajo težave z jetri.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Preprečevanje citomegalovirusne bolezni pri bolnikih s presajenimi organi

Otroci morajo začeti jemati to zdravilo v 10 dneh po presaditvi. Odmerek je odvisen od velikosti otroka in ga je treba jemati ENKRAT na dan. Zdravnik bo določil najbolj ustrezen odmerek glede na otrokovo višino, maso in ledvično funkcijo. Zdravljenje boste nadaljevali s tem odmerkom do 100 dni po presaditvi. Če je vaš otrok prejel presajeno ledvico, vam bo vaš zdravnik morda svetoval jemanje odmerka 200 dni.


Uporabite odmernika, ki sta priložena v pakiranju, da boste odmerili odmerek raztopine zdravila Valcyte.

Če oba odmernika zavržete, ju izgubite ali se poškodujeta, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom; svetoval vam bo, kako nadaljevati z jemanjem zdravila.

Postopek in pot uporabe

Priporočljivo je, da farmacevt pripravi raztopino zdravila Valcyte, preden vam ga izroči.

Ko je raztopina pripravljena, upoštevajte spodaj napisana navodila, da boste raztopino potegnili iz stekleničke in jo vzeli.



1. Zaprto stekleničko pred vsako uporabo dobro pretresajte približno 5 sekund.
2. Odstranite za otroke varno zaporko.
3. Preden konico odmernika vstavite v nastavek za stekleničko, potisnite bat do konca dol, proti konici odmernika. Konico trdno vstavite v odprtino nastavka za stekleničko.
4. Obrnite celotno enoto (stekleničko in odmernik) na glavo.
5. Počasi izvlecite bat, dokler ni v odmerniku zelena količina raztopine (glejte sliko).
6. Obrnite celotno enoto tako, da bo spet pokonci, in počasi odstranite odmernik s stekleničke.

7. Dajte neposredno v usta in pogoltnite. Pred uporabo ne mešajte z nobeno tekočino.
8. Steklениčko po vsaki uporabi zaprite z zaporko, varno za otroke.
9. Takoj po uporabi:
razstavite odmernik, splaknite ga pod tekočo destilirano ali prekuhano vodo in ga posušite pred naslednjo uporabo.

Paziti morate, da koža ne pride v stik z raztopino. Če se to zgodi, kožo temeljito umijte z milom in vodo.

Zdravila ne uporabite po izteku roka uporabnosti, ki je 49 dni po pripravi.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Valcyte, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek raztopine zdravila Valcyte, kot bi smeli, ali če menite, da se je to zgodilo, se takoj posvetujte z zdravnikom ali bolnišnico. Uporaba večjega odmerka od priporočenega lahko povzroči resne neželene učinke, zlasti na kri in ledvice. Morda boste potrebovali zdravljenje v bolnišnici.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Valcyte

Če ste pozabili vzeti odmerek zdravila Valcyte, pozabljeni odmerek vzemite takoj, ko se spomnite, naslednji odmerek pa vzemite ob običajnem času. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če ste prenehali jemati zdravilo Valcyte

Tega zdravila ne smete prenehati jemati, če vam tega ne naroči zdravnik.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Alergijske reakcije

Pri do 1 od 1000 bolnikov se lahko pojavi nenadna in huda alergijska reakcija na valganciklovir (anafilaktični šok). **PRENEHAJTE** jemati zdravilo Valcyte in pojdite v ambulanto za nujno pomoč najbližje bolnišnice, če se vam pojavi kaj od naslednjega:

- dvignjen, srbeč kožni izpuščaj (koprivnica),
- nenadna oteklost žrela/grla, obraza, ustnic in ust, ki lahko povzroči težave s požiranjem ali dihanjem,
- nenadna oteklost dlani, stopal ali gležnjev.

Resni neželeni učinki

Zdravnika morate nemudoma obvestiti, če opazite katerega od naslednjih resnih neželenih učinkov – zdravnik vam lahko naroči, da prenehate jemati zdravilo Valcyte; morda boste potrebovali nujno zdravljenje:

Zelo pogosti: pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov

- majhno število belih krvnih celic – z znaki okužbe, npr. vnetjem žrela, razjedami v ustih ali zvišano telesno temperaturo
- majhno število rdečih krvnih celic – med znaki so občutek kratke sape ali utrujenost, razbijanje srca (palpitacije) ali bledica kože

Pogosti: pojavijo se lahko pri do 1 od 10 bolnikov

- okužba krvi (sepsa) – med znaki so zvišana telesna temperatura, mrzlica, razbijanje srca (palpitacije), zmedenost in nerazločen govor

- majhno število trombocitov (krvnih ploščic) – med znaki so večja nagnjenost h krvavitvam ali podplutbam kot ponavadi, kri v urinu ali blatu ali krvavitev iz dlesni; krvavitev je lahko huda
- zelo majhno število krvnih celic
- pankreatitis – med znaki so hude bolečine v trebuhu, ki se širijo v hrbet
- napadi krčev

Občasni: pojavijo se lahko pri do 1 od 100 bolnikov

- nesposobnost kostnega mozga za tvorbo krvnih celic
- halucinacije – slišanje ali videnje stvari, ki niso resnične
- nenormalne misli in občutja, izguba stika z resničnostjo
- odpoved delovanja ledvic.

Neželeni učinki, ki so se pojavili med zdravljenjem z valganciklovirjem ali ganciklovirjem, so navedeni spodaj.

Drugi neželeni učinki

Zdravniku, farmacevtu ali medicinski sestri morate povedati, če opazite katerega od naslednjih neželenih učinkov:

Zelo pogosti: pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov

- gobice (kandidoza) in glivice v ustih
- okužba zgornjih dihalnih poti (npr. vnetje sinusov, vnetje mandljev)
- izguba apetita
- glavobol
- kašelj
- občutek kratke sape
- driska
- slabost v želodcu ali bruhanje
- bolečine v trebuhu
- ekcem
- občutek utrujenosti
- zvišana telesna temperatura

Pogosti: pojavijo se lahko pri do 1 od 10 bolnikov

- gripa
- okužba sečil – med znaki so zvišana telesna temperatura, pogostejše odvajanje urina, bolečine pri odvajanju urina
- okužba kože in podkožnih tkiv
- blaga alergijska reakcija – med znaki je lahko rdeča, srbeča koža
- izguba telesne mase
- občutek potrtosti, tesnobe ali zmedenosti
- težave s spanjem
- občutek šibkosti ali omrtvičenosti dlani in stopal; to vam lahko poslabša ravnotežje
- spremembe v zaznavanju dotika, mravljinčenje, žgečkanje, zbadanje ali pekoč občutek
- spremenjeno zaznavanje okusov
- mrzlica
- vnetje oči (konjunktivitis), bolečine v očeh ali težave z vidom
- bolečine v ušesih
- nizek krvni tlak, ki lahko povzroči omotico ali omedlevico
- težave s požiranjem
- zaprtost, vetrovi, prebavne motnje, bolečine v želodcu, oteklost trebuha
- razjede v ustih
- nenormalni izvidi laboratorijskih preiskav jeter in ledvic
- nočno znojenje

- srbenje, izpuščaj
- izpadanje las
- bolečine v hrbtu, bolečine v mišicah ali sklepah, mišični spazmi
- občutek omotičnosti, šibkosti ali splošno slabo počutje

Občasni: pojavijo se lahko pri do 1 od 100 bolnikov

- občutek vznemirjenosti
- tremor, tresenje
- gluhost
- neenakomerno bitje srca
- koprivnica, suha koža
- kri v urinu
- neplodnost pri moških – glejte poglavje Nosečnost, dojenje in plodnost
- bolečine v prsnem košu

O odstopu notranje obloge očesa (odstopu mrežnice) so poročali samo pri bolnikih z aidsom, zdravljenih z zdravilom Valcyte za zdravljenje okužbe s CMV.

Dodatni neželeni učinki pri otrocih in mladostnikih

Neželeni učinki pri otrocih in mladostnikih, o katerih so poročali, so podobni neželenim učinkom pri odraslih.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Valcyte

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Praška ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in na nalepki stekleničke (poleg oznake Uporabno do). Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Prašek: ne zahteva posebnih pogojev za shranjevanje.

Pripravljena raztopina: Shranjujte jo v hladilniku (2 °C–8 °C).

Rok uporabnosti peroralne raztopine je 49 dni. Raztopine ne uporabite več kot 49 dni po pripravi oz. po datumu izteka roka uporabnosti, ki vam ga bo farmacevt napisal na stekleničko.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Valcyte

Učinkovina je valganciklovirjev klorid. Ko je prašek raztopljen, vsebuje 1 ml raztopine 55 mg valganciklovirjevega klorida; to ustreza 50 mg valganciklovirja v obliki klorida.

Druge sestavine zdravila (pomožne snovi) so: povidon K30 (E 1201), fumarna kislina (E 297), natrijev benzoat (E 211), natrijev saharinat (E 954) in manitol (E 421), okus mešanega sadja [maltodekstrini (koruzni), propilenglikol (E 1520), arabski gumi (E 414) in arome identične naravnim, v glavnem sestavljene iz arom banane, ananasa in breskve].

Izgled zdravila Valcyte in vsebina pakiranja

Prašek zdravila Valcyte je granulat bele do rahlo rumene barve. Količina 12 g praška je na voljo v steklenički. Po pripravi je količina raztopine 100 ml, kar zagotavlja uporabno količino 88 ml. Raztopina je bistra in brezbarvna do rjava. Pakiranje vsebuje tudi nastavek za stekleničko in 2 odmernika, ki sta označena do 10 ml (500 mg) v korakih po 0,5 ml (25 mg).

Pakiranje: 1 steklenička z 12 g praška.

Način in režim izdaje zdravila Valcyte

H/Rp – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Nemčija

Proizvajalec
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 23 - 24
17489 Greifswald
Nemčija

Prestige Promotion – Verkaufsfoerderung & Werbeservice GmbH, Borsigstrasse 2, 63755 Alzenau, Nemčija

To zdravilo je odobreno v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora in Združenem kraljestvu (Severnem Irskem) pod naslednjimi imeni:

Valcyte: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo (Severna Irska)

RoValcyte: Francija, Portugalska

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 23. 1. 2026.

Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju:

Priporočljivo je, da farmacevt pripravi raztopino zdravila Valcyte takole:

1. Odmerite 91 ml vode v merilni valj.
2. Odstranite za otroke varno zaporko, dodajte vodo v stekleničko, stekleničko zaprite z zaporko, varno za otroke, in zaprto stekleničko pretresajte, dokler se prašek ne raztopi.
3. Odstranite za otroke varno zaporko in potisnite nastavek za stekleničko v vrat stekleničke.
4. Stekleničko tesno zaprite z zaporko, varno za otroke, da boste zagotovili ustrezno nameščenost nastavka za stekleničko v steklenički in varno stanje zaporke.
5. Na nalepko stekleničke napišite datum izteka roka uporabnosti raztopine.

Priporočljivo je, da med pripravo raztopine in pri brisanju zunanjskega dela stekleničke/zaporke ter delovne površine po pripravi raztopine uporabljate rokavice za enkratno uporabo.

Pazite, da praška ne boste vdihnili; prav tako pazite, da koža ali sluznice ne pridejo v neposreden stik s praškom ali raztopino. Če se to zgodi, kožo temeljito umijte z milom in vodo; oči izperite s čisto vodo.