

NAVODILO ZA UPORABO

Navodilo za uporabo

Coxeta 30 mg filmsko obložene tablete
 Coxeta 60 mg filmsko obložene tablete
 Coxeta 90 mg filmsko obložene tablete
 Coxeta 120 mg filmsko obložene tablete

etorikoksib

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Coxeta in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Coxeta
3. Kako uporabljati zdravilo Coxeta
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Coxeta
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Coxeta in za kaj ga uporabljamo

Kaj je zdravilo Coxeta?

- Zdravilo Coxeta vsebuje učinkovino etorikoksib. Zdravilo Coxeta spada v skupino zdravil, imenovanih selektivni zaviralci COX-2. Ti spadajo v družino zdravil, ki jih imenujemo nesteroidni antirevmatiki (NSAR-i).

Za kaj uporabljamo zdravilo Coxeta?

- Zdravilo Coxeta pomaga ublažiti bolečino in otekanje (vnetje) sklepov in mišic pri bolnikih, starih 16 let in več z osteoartrozo, revmatoidnim artritisom, ankilozirajočim spondilitisom ali s protinom.
- Zdravilo Coxeta se uporablja tudi za kratkotrajno zdravljenje zmerne bolečine po kirurških posegih na zobeh, pri odraslih in mladostnikih starih 16 let ali več.

Kaj je osteoartraza?

Osteoartraza je bolezen sklepov. Je posledica postopne obrabe hrustanca, ki prekriva končne dele kosti. To povzroči otekanje (vnetje), bolečino, občutljivost, okornost in neuporabnost sklepov.

Kaj je revmatoidni artritis?

Revmatoidni artritis je dolgotrajna vnetna bolezen sklepov. Povzroča bolečino, okornost, otekanje in vedno slabšo gibljivost sklepov. Povzroča lahko tudi vnetje v drugih delih telesa.

Kaj je protin?

Protin je bolezen, za katero so značilni nenadni, ponavljajoči se napadi zelo bolečega vnetja sklepov in rdečina sklepov. Povzročajo jo kristali, ki se kopičijo v sklepih.

Kaj je ankilozirajoči spondilitis?

Ankilozirajoči spondilitis je vnetna bolezen hrbtenice in večjih sklepov.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Coxeta**NE uporabljajte zdravila Coxeta:**

- če ste alergični na etorikoksib ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6)
- če ste alergični na nesteroidna protivnetna zdravila (NSAR), vključno z acetilsalicilno kislino in zaviralci COX-2 (glejte Možni neželeni učinki, poglavje 4)
- če imate želodčno razjedo ali krvavitev v želodcu ali črevesu
- če imate hudo bolezen jeter
- če imate hudo bolezen ledvic
- če ste ali bi lahko bili noseči ali če dojite (glejte 'Nosečnost, dojenje in plodnost')
- če ste mlajši od 16 let
- če imate vnetno bolezen črevesa, kot so Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis ali kolitis.
- če imate visok krvni tlak, ki kljub zdravljenju ni ustrezno nadzorovan (če niste prepričani, če je vaš tlak ustrezno nadzorovan, se posvetujte s svojim zdravnikom ali z medicinsko sestro)
- če je zdravnik pri vas ugotovil bolezen srca, vključno s srčnim popuščanjem (zmerno ali hudo obliko), angino pektoris (bolečina v prsnem košu)
- če ste kdaj imeli srčni infarkt, obvodno operacijo koronarnih arterij ("bypass"), bolezen perifernih arterij (slaba prekrvavitev v nogah ali stopalih zaradi zoženih ali zamašenih arterij)
- če ste doživeli možgansko kap (vključno z malo možgansko kapjo ali tranzitorno ishemično atako (TIA))

Etorikoksib lahko rahlo poveča tveganje za pojav srčnega infarkta in možganske kapi, zato ga bolniki, ki so že imeli težave s srcem ali doživeli možgansko kap, ne smejo uporabljati.

Če menite, da kar koli od navedenega velja za vas, tablet ne jemljite, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Coxeta se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, če:

- ste kdaj imeli krvavitve ali razjede v želodcu,
- ste dehidrirani, na primer zaradi dolgotrajnega bruhanja ali driske,
- imate težave z oteklinaami zaradi zadrževanja tekočine v telesu,
- ste kdaj imeli srčno popuščanje ali katerokoli drugo bolezen srca,
- ste kdaj imeli visok krvni tlak. Zdravilo Coxeta lahko pri nekaterih ljudeh poviša krvni tlak, še posebej pri zdravljenju z velikimi odmerki. Zato vam bo zdravnik občasno želel preveriti krvni tlak,

- ste kdaj imeli katerokoli bolezen jeter ali ledvic,
- se zdravite zaradi okužbe. Zdravilo Coxeta lahko prikrije zvišano telesno temperaturo, ki je znak okužbe,
- imate sladkorno bolezen, povišan holesterol ali kadite. Ti dejavniki lahko povečajo tveganje za bolezni srca,
- nameravate zanositi,
- ste starejši od 65 let.

Če niste prepričani, ali kaj od naštetega velja za vas, se, preden začnete jemati zdravilo Coxeta, posvetujte z zdravnikom, da se prepričate, če je zdravilo primerno za vas.

Pri starejših odraslih bolnikih je zdravilo Coxeta enako učinkovito kot pri mlajših odraslih bolnikih. Če ste starejši od 65 let, vas bo zdravnik temu primerno nadzoroval. Pri starejših bolnikih, starih več kot 65 let, odmerkov ni treba prilagoditi.

Otroci in mladostniki

Tega zdravila ne dajajte otrokom in mladostnikom, mlajšim od 16 let.

Druga zdravila in zdravilo Coxeta

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Še posebej če jemljete katero od spodaj navedenih zdravil, bo zdravnik po začetku zdravljenja z zdravilom Coxeta morda želel vaše zdravstveno stanje spremljati, da bi ugotovil, če zdravila pravilno delujejo:

- zdravila za redčenje krvi (antikoagulanti), kot je varfarin,
- rifampicin (antibiotik),
- metotreksat (zdravilo za zaviranje imunskega sistema, ki se pogosto uporablja pri zdravljenju revmatoidnega artritisa),
- ciklosporin ali takrolimus (zdravila za zaviranje imunskega sistema),
- litij (zdravilo za zdravljenje nekaterih oblik depresije),
- zdravila za zdravljenje visokega krvnega tlaka in srčnega popuščanja, imenovana zaviralci ACE in antagonisti receptorjev angiotenzina, na primer enalapril in ramipril ter losartan in valsartan,
- diuretike (zdravila za odvajanje vode iz telesa),
- digoksin (zdravilo za zdravljenje srčnega popuščanja in motenj srčnega ritma),
- minoksidil (zdravilo za zdravljenje visokega krvnega tlaka),
- salbutamol v obliki tablet ali peroralne raztopine (zdravilo za zdravljenje astme),
- kontracepcijske tablete (kombinacija lahko poveča tveganje za pojav neželenih učinkov),
- hormonsko nadomestno zdravljenje (kombinacija lahko poveča tveganje za pojav neželenih učinkov),
- acetilsalicilno kislino; tveganje za želodčne razjede je večje, če jemljete zdravilo Coxeta skupaj z acetilsalicilno kislino.
 - acetilsalicilna kislina za preprečevanje srčne ali možganske kapi:
Zdravilo Coxeta lahko jemljete z **majhnimi odmerki** acetilsalicilne kisline. Če trenutno jemljete majhne odmerke acetilsalicilne kisline za preprečevanje srčne ali možganske kapi, s tem ne prekinite, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom.
 - acetilsalicilna kislina in druga nesteroidna protivnetna zdravila (NSAR):
Skupaj z zdravilom Coxeta ne smete jemati **večjih odmerkov** acetilsalicilne kisline ali drugih protivnetnih zdravil.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Nosečnost

Zdravila Coxeta med nosečnostjo ne smete jemati. Če ste noseči, menite, da bi lahko bili noseči ali če načrtujete zanositev, tablet ne jemljite. Če zanosite, tablete prenehajte jemati in se posvetujte z zdravnikom. Če ste negotovi ali potrebujete dodaten nasvet, se posvetujte z zdravnikom.

Dojenje

Ni znano, ali se etorikoksib izloča v materino mleko. Če dojite ali nameravate dojiti, se pred začetkom jemanja zdravila Coxeta posvetujte z zdravnikom. Med jemanjem zdravila Coxeta ne smete dojiti.

Plodnost

Uporaba zdravila Coxeta pri ženskah, ki želijo zanositi ni priporočljiva.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Pri nekaterih bolnikih, ki so jemali zdravilo Coxeta, so poročali o omotici in dremavosti.

Če se pri vas pojavita omotica ali dremavost, ne smete voziti.

Če se pri vas pojavita omotica ali dremavost, ne delajte z orodji ali stroji.

3. Kako uporabljati zdravilo Coxeta

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Na voljo so različne jakosti zdravila, zato vam bo zdravnik, glede na vašo bolezen predpisal ustrezno jakost zdravila, ki je primerna za vas.

Priporočeni odmerek je:

Osteoartraza

Priporočeni odmerek je 30 mg enkrat na dan, če je potrebno, se poveča na največ 60 mg enkrat na dan.

Revmatoidni artritis

Priporočeni odmerek je 60 mg enkrat na dan, če je potrebno, se poveča na največ 90 mg enkrat na dan.

Ankilozirajoči spondilitis

Priporočeni odmerek je 60 mg enkrat na dan, če je potrebno, se poveča na največ 90 mg enkrat na dan.

Stanja z akutno bolečino

Etorikoksib se lahko uporablja samo v obdobju akutne bolečine.

Protin

Priporočeni odmerek je 120 mg enkrat na dan, ki se lahko uporablja le pri akutni bolečini in največ 8 dni.

Bolečine po operaciji zob

Priporočeni odmerek je 90 mg enkrat na dan in se lahko uporablja največ 3 dni.

Bolniki z boleznimi jeter

- Če imate blago bolezen jeter, ne smete jemati odmerka, večjega od 60 mg na dan.
- Če imate zmerno bolezen jeter, ne smete jemati odmerka, večjega od 30 mg na dan.

Ne vzemite večjega odmerka od priporočenega za vašo bolezen. Zdravnik se bo občasno želel pogovoriti z vami o vašem zdravljenju. Pomembno je, da jemljete najmanjši odmerek, ki vam ublaži bolečino in da zdravila Coxeta ne jemljete dalj časa, kot je potrebno. To je zaradi tveganja za srčni infarkt in možgansko kap, ki se pri daljšem zdravljenju lahko poveča, še posebej pri velikih odmerkih.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Zdravila Coxeta ne smejo jemati otroci in mladostniki, mlajši od 16 let.

Starejši

Pri starejših bolnikih ni treba prilagajati odmerka, a je pri njih potrebna previdnost pri uporabi zdravila.

Način jemanja

Zdravilo Coxeta je samo za peroralno uporabo.

Tableto zdravila Coxeta vzemite enkrat na dan. Zdravilo Coxeta lahko jemljete skupaj s hrano ali brez nje.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Coxeta, kot bi smeli

Nikoli ne vzemite več tablet, kot vam jih je predpisal zdravnik. Če ste pomotoma vzeli prevelik odmerek zdravila Coxeta, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Coxeta

Pomembno je, da zdravilo Coxeta jemljete natančno po zdravnikovih navodilih. Če ste izpustili odmerek, nadaljujte z jemanjem zdravila naslednji dan ob običajnem času.

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če se pri vas pojavi kateri od spodnjih znakov, prenehajte jemati zdravilo Coxeta in se takoj posvetujte z zdravnikom (glejte poglavje 2, Kaj morate vedeti preden boste uporabili zdravilo Coxeta):

- kratka sapa, bolečine v prsnem košu ali otekanje gležnjev (če se pojavijo na novo ali se poslabšajo),
- porumenelost kože in oči (zlatenica), kar kaže na težave z jetri,
- močne ali vztrajne bolečine v trebuhu ali črno blato,
- alergijska reakcija – ki lahko vključuje težave s kožo, kot so razjede ali mehurji, ali otekanje obraza, ustnic, jezika ali žrela, kar lahko povzroči težave pri dihanju.

Med zdravljenjem z zdravilom Coxeta se lahko pojavijo naslednji neželeni učinki:

Zelo pogosti (pojavi se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov):

- bolečina v trebuhu

Pogosti (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):

- vnetje in bolečina po izdrtju zoba
- otekanje nog in/ali stopal zaradi zadrževanja tekočine v telesu (edemi)
- omotica, glavobol
- palpitacije (hiter ali nepravilen srčni utrip), nepravilen srčni ritem (aritmija)
- zvišan krvni tlak
- piskajoče dihanje ali kratka sapa (bronhospazem)
- zaprtje, vetrovi (povečano nastajanje plinov), gastritis (vnetje želodčne sluznice), zgaga, driska, slaba prebava (dispepsija)/nelagodje v trebuhu, slabost (siljenje na bruhanje), bruhanje, vnetje požiralnika, razjede v ustih
- spremembe v izvidih krvnih testov za delovanje jeter
- modrice
- šibkost in utrujenost, gripi podobna bolezen

Občasni (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- gastroenteritis (vnetje prebavnega trakta, ki zajema tako želodec kot tanko črevo/trebušna gripa), okužba zgornjih dihal, okužba sečil
- spremenjene laboratorijske vrednosti (zmanjšano število rdečih krvnih celic, zmanjšano število belih krvnih celic, zmanjšano število krvnih ploščic)
- preobčutljivost (alergijska reakcija, vključno s koprivnico, ki je lahko tako resna, da zahteva takojšnjo zdravniško pomoč)
- zmanjšan ali povečan apetit, povečanje telesne mase
- tesnoba, depresija, zmanjšana sposobnost jasnega mišljenja, videnje, čutenje ali slihanje stvari, ki jih ni (halucinacije)
- spremembe okušanja, nespečnost, odrevenelost ali mravljinčenje, zaspanost
- zamegljen vid, draženje in rdečina oči
- zvonjenje v ušesih, vrtoglavica (občutek vrtenja, čeprav ste pri miru)
- nenormalni srčni ritem (atrijska fibrilacija), hiter srčni utrip, srčno popuščanje, občutek tiščanja, stiskanja ali teže v prsnem košu (angina pectoris), srčni infarkt
- zardevanje, možganska kap, mala možganska kap (tranzitorna ishemična ataka), hudo povišanje krvnega tlaka, vnetje krvnih žil
- kašelj, zasoplost, krvavitev iz nosu
- napihnenost v predelu želodca ali črevesja, spremembe v prebavi, suha usta, želodčna razjeda, vnetje želodčne sluznice, ki je lahko resno in lahko vodi do krvavitev, sindrom razdraženega črevesja, vnetje trebušne slinavke
- otekanje obraza, kožni izpuščaji ali srbenje kože, rdečina kože
- mišični krč/spazem, mišična bolečina/okorelost
- visoke vrednosti kalija v krvi, spremembe v izvidih krvnih ali urinskih testov za delovanje ledvic, hude težave z ledvicami
- bolečina v prsnem košu

Redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- angioedem (alergijska reakcija z otekanjem obraza, ustnic, jezika in/ali žrela, kar lahko povzroči težave pri dihanju ali požiranju in je lahko tako resna, da zahteva takojšnjo zdravniško pomoč)/anafilaktične/anafilaktoidne reakcije, vključno s šokom (huda alergijska reakcija, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč)
- zmedenost, nemir
- težave z jetri (hepatitis)
- nizke vrednosti natrija v krvi
- odpoved jeter, porumenelost kože in/ali oči (zlatenica)
- hude kožne reakcije

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Coxeta

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in pretisnem omotu poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Ne uporabljajte tega zdravila, če opazite vidne znake kvarjenja.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Coxeta

- Učinkovina je etorikoksib.

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 30 mg etorikoksiba.

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 60 mg etorikoksiba.

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 90 mg etorikoksiba.
Ena filmsko obložena tableta vsebuje 120 mg etorikoksiba.

- Druge sestavine zdravila so:

Jedro tablete: brezvodni kalcijev hidrogenfosfat, krospovidon (tip A), mikrokristalna celuloza, povidon K25, magnezijev stearat

Obloga tablete: hipromeloza, hidroksipropilceluloza, smukec, nasičeni, srednjeveržni trigliceridi, titanov dioksid (E171), mikrokristalna celuloza (30 mg), rdeči železov oksid (E172) (30 mg), indigotin (E132) (30 mg, 60 mg in 120 mg), briljantno modro FCF (E133) (60 mg in 120 mg), rumeni železov oksid (E172) (60 mg in 120 mg), črni železov oksid (E172) (60 mg in 120 mg)

Izgled zdravila Coxeta in vsebina pakiranja

30 mg modra, okrogla na obeh straneh izbočena filmsko obložena tableta, z vtisnjeno oznako „30” na eni strani in brez oznake na drugi strani.

60 mg temno zelena, okrogla na obeh straneh filmsko obložena tableta, z vtisnjeno oznako „60” na eni strani in brez oznake na drugi strani.

90 mg bela, okrogla na obeh straneh izbočena filmsko obložena tableta, z vtisnjeno oznako „90” na eni strani in brez oznake na drugi strani.

120 mg svetlo zelena, okrogla na obeh straneh izbočena filmsko obložena tableta, z vtisnjeno oznako „120” na eni strani in brez oznake na drugi strani.

Velikosti pakiranj:

30 mg

OPA/aluminij/PVC /aluminijev pretisni omot ali enoodmerni pretisni omot vsebuje: 7, 14, 28, 28x1, 30, 98 filmsko obloženih tablet

60 mg

OPA/aluminij/PVC /aluminijev pretisni omot vsebuje: 7, 14, 20, 28, 28x1, 30, 50, 98, 100 filmsko obloženih tablet

90 mg

OPA/aluminij/PVC /aluminijev pretisni omot vsebuje: 5, 7, 7x1, 14, 20, 28, 28x1, 30, 50, 98, 100 filmsko obloženih tablet

120 mg

OPA/aluminij/PVC /aluminijev pretisni omot vsebuje: 5, 7, 7x1, 14, 16, 20, 28, 28x1 in 30 filmsko obloženih tablet

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila

Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nizozemska

Proizvajalci

TEVA Gyógyszergyár Zrt.
Debrecen, Pallagi út 13,
H-4042
Madžarska

Teva Nederland BV
Swensweg 5, Haarlem
2031 GA
Nizozemska

Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravska 29, c.p. 305, Opava-Komarov
74770
Češka

Teva Operations Poland Sp. z.o.o.
ul. Mogilska 80. , Krakow
31-546
Poljska

TEVA PHARMA S.L.U.
C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, Zaragoza
50016
Španija

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Straße 3, Blaubeuren
89143
Nemčija

Teva Pharma B.V.
Swensweg 5, Haarlem
2031 GA
Nizozemska

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)
Prilaz baruna Filipovica 25, Zagreb
10000
Hrvaška

Pharmadox Healthcare Ltd.
 KW20A Kordin Industrial Park, Paola
 PLA 3000
 Malta

Zdravilo je v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora in Združenem kraljestvu (Severnem Irskem) pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Bolgarija:	Еторикокиб Тева 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg филмирани таблетки
Hrvaška:	Coxeta 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmom obložene tablete
Estonija:	Etoricoxib Teva
Nemčija:	Etoricox AbZ 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg Filmtabletten
Irska:	Etoricoxib Teva 30 mg, 60 mg, 90 mg & 120 mg Film-coated Tablets
Italija:	ETORICOXIB TEVA
Latvija:	Etoricoxib Teva 60 mg, 90 mg, 120 mg apvalkotās tabletes
Litva:	Etoricoxib Teva 30 mg, 60mg, 90 mg, 120 mg plėvele dengtos tabletės
Malta:	Etoricoxib Teva 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg Film-coated Tablets
Poljska:	Etoricoxib Teva
Portugalska:	Etoricoxib Teva
Romunija:	ETORICOXIB TEVA 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimate fimate
Slovenija:	Coxeta 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmsko obložene tablete
Španija:	Etoricoxib Teva 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Švedska:	Etoricoxib Teva 30 / 60 / 90 / 120 mg filmdragerade tabletter
Nizozemska:	Etoricoxib Teva 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmomhulde tabletten
Združeno kraljestvo (Severna Irska):	Etoricoxib 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg Film-coated Tablets

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 28. 06. 2021.