

NAVODILO ZA UPORABO

Ramipril Aurobindo 5 mg tablete **Ramipril Aurobindo 10 mg tablete** ramipril

Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Ramipril Aurobindo in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Ramipril Aurobindo
3. Kako jemati zdravilo Ramipril Aurobindo
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Ramipril Aurobindo
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO RAMIPRIL AUROBINDO IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Ramipril Aurobindo vsebuje zdravilno učinkovino ramipril. Ta učinkovina spada v skupino zdravil, ki jih imenujemo zaviralci ACE (zaviralci angiotenzinske konvertaze).

Zdravilo Ramipril Aurobindo deluje tako, da:

- v telesu zmanjša nastajanje snovi, ki lahko zvišajo krvni tlak
- sprosti in razširi žile
- srcu olajša črpanje krvi po telesu.

Zdravilo Ramipril Aurobindo se lahko uporablja:

- za zdravljenje visokega krvnega tlaka (hipertenzije)
- za zmanjšanje tveganja za srčni infarkt ali možgansko kap
- za zmanjšanje tveganja ali upočasnitev poslabšanja težav z ledvicami (ne glede na to, ali imate sladkorno bolezen ali ne)
- za zdravljenje stanja, pri katerem srce ne more prečrpati dovolj krvi po telesu (srčno popuščanje)
- kot zdravljenje po srčnem infarktu (miokardnem infarktu), pri katerem se kot zaplet pojavi srčno popuščanje.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO RAMIPRIL AUROBINDO

Ne jemljite zdravila Ramipril Aurobindo:

- če ste alergični (preobčutljivi) na ramipril, katerikoli drug zaviralec ACE ali katerikoli sestavino zdravila Ramipril Aurobindo, navedeno v poglavju 6.
Med znaki alergijske reakcije so lahko izpuščaji, težave s požiranjem ali dihanjem, oteklost ustnic, obraza, žrela ali jezika.
- če ste kadarkoli imeli resno alergijsko reakcijo, imenovano "angioedem". Med njenimi znaki so srbenje, koprivnica (urtikarija), rdeče spremembe na rokah, stopalih in žrelu, oteklost žrela in jezika, oteklost okrog oči in ustnic, težko dihanje in težko požiranje.
- če se zdravite z dializo ali kakšno drugo vrsto filtracije krvi. Odvisno od naprave, ki se za to uporablja, je mogoče, da zdravilo Ramipril Aurobindo ni primerno za vas.

- če imate težave z ledvicami, pri katerih je prekrvitev ledvic zmanjšana (zožitev ledvične arterije).
- če ste noseči več kot tri mesece (Prav tako je bolje, da bi se izognili zdravljenju z Ramipril Aurobindo v zgodnji nosečnosti - glejte poglavje o nosečnosti).
- če imate nenormalno nizek ali nestabilen krvni tlak To mora oceniti zdravnik.

Ne vzemite zdravila Ramipril Aurobindo, če kaj od naštetega velja za vas. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete zdravilo Ramipril Aurobindo.

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Ramipril Aurobindo:

Preden vzamete to zdravilo, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom:

- če imate težave s srcem, jetri ali ledvicami.
- če ste izgubili veliko telesnih soli ali tekočin (zaradi bruhanja, driske, močnejšega znojenja kot po navadi, uživanja diete z malo soli, dolgotrajnega jemanja diuretikov (tablet za odvajanje vode) ali dialize).
- če imate predvideno zdravljenje za odpravljanje alergije na pike čebel ali os (desenzibilizacijo).
- če boste dobili anestetik. Dobite ga lahko za operacijo ali kakšen zobozdravstven poseg. Morda boste morali en dan pred tem nehati jemati zdravilo Ramipril Aurobindo; posvetujte se o tem s svojim zdravnikom.
- če imate v krvi veliko kalija (to pokaže preiskava krvi).
- če imate kolagensko žilno bolezen, npr. sklerodermo ali sistemski eritematozni lupus.
- Povedati morate svojemu zdravniku, če mislite da ste (ali nameravate zanositi). Zdravljenje z zdravilom Ramipril Aurobindo ni priporočljivo v zgodnjem obdobju nosečnosti, in se ga ne sme jemati, če ste noseči več kot 3 mesece, saj lahko uporaba v tem obdobju povzroči resno škodo vašemu otroku (glejte poglavje o nosečnosti).

Otroci

Zdravila Ramipril Aurobindo ni priporočljivo uporabljati pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let, ker za to populacijo ni informacij.

Če kaj od naštetega velja za vas (ali če niste prepričani), se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete zdravilo Ramipril Aurobindo.

Jemanje zdravila Ramipril Aurobindo z drugimi zdravili

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta (vključno z zeliščnimi pripravki). Zdravilo Ramipril Aurobindo namreč lahko vpliva na delovanje nekaterih drugih zdravil. Tudi nekatera zdravila lahko vplivajo na delovanje zdravila Ramipril Aurobindo.

Zdravnika morate obvestiti, če jemljete katero od naslednjih zdravil. Naslednja zdravila lahko poslabšajo delovanje zdravila Ramipril Aurobindo:

- zdravila za lajšanje bolečin in vnetja (npr. nesteroidna protivnetna zdravila, kakršna so ibuprofen, indometacin ali acetilsalicilna kislina).
- zdravila za zdravljenje nizkega krvnega tlaka, šoka, srčnega popuščanja, astme ali alergij, npr. efedrin, noradrenalin ali adrenalin. Zdravnik vam bo moral kontrolirati krvni tlak.

Zdravnika morate obvestiti, če jemljete katero od naslednjih zdravil. Povečajo lahko možnost neželenih učinkov, če jih jemljete skupaj z zdravilom Ramipril Aurobindo:

- zdravila za lajšanje bolečin in vnetja (npr. nesteroidna protivnetna zdravila, kakršna so ibuprofen, indometacin ali acetilsalicilna kislina).
- zdravila proti raku (kemoterapija).
- zdravila za preprečitev zavrnitve organov po presaditvi (npr. ciklosporin).
- diuretiki (tablete za odvajanje vode, npr. furosemid).
- zdravila, ki lahko povečajo količino kalija v krvi (npr. spironolakton, triamteren, amilorid, kalijeve soli in heparin [uporablja se za redčenje krvi]).

- steroidna zdravila proti vnetju (npr. prednizolon).
- alopurinol (uporablja se za zniževanje sečne kisline v krvi).
- prokainamid (proti motnjam srčnega ritma).

Zdravnika morate obvestiti, če jemljete katero od naslednjih zdravil. Jemanje zdravila Ramipril Aurobindo lahko vpliva na delovanje naslednjih zdravil:

- zdravila proti sladkorni bolezni (npr. peroralna zdravila za zniževanje glukoze in insulin). Zdravilo Ramipril Aurobindo lahko zniža krvni sladkor. Med jemanjem zdravila Ramipril Aurobindo morate natančno kontrolirati krvni sladkor.
- litij (za duševne motnje). Zdravilo Ramipril Aurobindo lahko poveča količino litija v krvi. Zdravnik vam bo moral natančno kontrolirati količino litija.
- Če kaj od naštetega velja za vas (ali če niste prepričani), se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete zdravilo Ramipril Aurobindo.

Jemanje zdravila Ramipril Aurobindo skupaj s hrano in alkoholom

- Pitje alkoholnih pijač hkrati z jemanjem zdravila Ramipril Aurobindo lahko povzroči omotico ali vrtoglavico. Če vas skrbi glede tega, koliko lahko popijete med jemanjem zdravila Ramipril Aurobindo, se posvetujte z zdravnikom. Učinki zdravil za zniževanje krvnega tlaka in alkohola se lahko seštevajo.
- Zdravilo Ramipril Aurobindo lahko vzamete s hrano ali brez nje.

Nosečnost in dojenje

Nosečnost

Povejte svojemu zdravniku, če mislite da ste noseči (ali nameravate zanositi). Zdravnik vam bo svetoval, da prenehate jemati Ramipril Aurobindo preden zanosite ali takoj, ko izveste, da ste noseči in vam bo svetoval jemanje drugega zdravila namesto zdravila Ramipril Aurobindo. Zdravljenje z zdravilom Ramipril Aurobindo ni priporočljivo v zgodnjem obdobju nosečnosti, in ga ne smete jemati, če ste noseči več kot 3 mesece, saj lahko takšna uporaba povzroči resno škodo vašemu otroku.

Dojenje

Povejte zdravniku, če dojite ali boste začeli dojiti. Zdravilo Ramipril Aurobindo ni priporočljivo za matere, ki dojijo, in vaš zdravnik lahko izbere drugo zdravljenje za vas, če želite dojiti, še posebej, če imate novorojenčka, ali prezgodaj rojenega otroka.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Med jemanjem zdravila Ramipril Aurobindo se lahko pojavi omotica. Verjetnost za to je večja, ko začnete jemati zdravilo Ramipril Aurobindo ali začnete jemati večji odmerek. Če se vam to zgodi, ne vozite in ne uporabljajte orodij oziroma strojev.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Ramipril Aurobindo

To zdravilo vsebuje laktozo monohidrat. Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO RAMIPRIL AUROBINDO

Pri jemanju zdravila Ramipril Aurobindo natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Za odmerke, manjše od 2,5 mg na dan zdravilo Ramipril Aurobindo ni primerno. Na voljo so druga zdravila, ki vsebujejo ramipril v ustreznih jakostih. Zdravnik vam bo ustrezno svetoval.

Jemanje tega zdravila

- Zdravilo zaužijte vsak dan ob istem času.

- Tablete pogoltnite cele in s tekočino.
- Tablet ne smete zdrobiti ali zgristi.

Koliko zdravila morate vzeti

Zdravljenje visokega krvnega tlaka

- Običajen začetni odmerek je 1,25 mg ali 2,5 mg enkrat na dan.
- Zdravnik vam bo prilagajal količino zdravila, dokler vaš krvni tlak ne bo urejen.
- Največji odmerek je 10 mg enkrat na dan.
- Če že jemljete diuretike (tablete za odvajanje vode), vam bo zdravnik pred začetkom zdravljenja z zdravilom Ramipril Aurobindo morda naročil, da diuretike nehate jemati, ali vam bo odmerek diuretika zmanjšal.

Za zmanjšanje tveganja za srčni infarkt ali možgansko kap

- Običajen začetni odmerek je 2,5 mg enkrat na dan.
- Zdravnik se nato lahko odloči in poveča odmerek, ki ga jemljete.
- Običajen odmerek je 10 mg enkrat na dan.

Zdravljenje za zmanjšanje ali upočasnitev slabšanja težav z ledvicami

- Zdravljenje se lahko začne z odmerkom 1,25 mg ali 2,5 mg enkrat na dan.
- Zdravnik vam bo prilagodil odmerek, ki ga jemljete.
- Običajen odmerek je 5 mg ali 10 mg enkrat na dan.

Zdravljenje srčnega popuščanja.

- Običajen začetni odmerek je 1,25 mg enkrat na dan.
- Zdravnik vam bo prilagodil odmerek, ki ga jemljete.
- Največji odmerek je 10 mg na dan. Po možnosti je treba zdravilo vzeti dvakrat na dan.

Zdravljenje po srčnem infarktu

- Običajen začetni odmerek je od 1,25 mg enkrat na dan do 2,5 mg dvakrat na dan.
- Zdravnik vam bo prilagodil odmerek, ki ga jemljete.
- Običajen odmerek je 10 mg na dan. Po možnosti je treba zdravilo vzeti dvakrat na dan.

Starejši

Zdravnik bo zmanjšal začetni odmerek in bo bolj počasi prilagajal vaše zdravljenje.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Ramipril Aurobindo, kot bi smeli

Takoj se posvetujte z zdravnikom ali pojdite v ambulanto za nujno pomoč najbližje bolnišnice. Ne vozite v bolnišnico sami! Pelje naj vas nekdo drug ali pokličite reševalce. S seboj vzemite ovojnico zdravila. Tako bo zdravnik lahko vedel, kaj ste vzeli.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Ramipril Aurobindo

- Če ste pozabili vzeti odmerek, vzemite običajen odmerek, ko je čas za naslednjega.
- Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjo tableto.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Ramipril Aurobindo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če opazite katerega od naslednjih resnih neželenih učinkov, nehajte jemati zdravilo Ramipril Aurobindo in nemudoma pojdite k zdravniku. Morda boste potrebovali nujno zdravniško pomoč.

- Oteklost obraza, ustnic ali žrela, ki otežijo požiranje ali dihanje, ali srbenje in izpuščaj. To je lahko znak hude alergijske reakcije na zdravilo Ramipril Aurobindo.
- Med hudimi kožnimi reakcijami so izpuščaj, razjede v ustih, poslabšanje že obstoječe bolezni kože, pordelost, mehurji ali odstopanje kože (npr. Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza ali multififormni eritem).

Zdravnika morate nemudoma obvestiti, če se vam pojavijo:

- Hitrejše bitje srca, neenakomerno ali močno bitje srca (palpitacije), bolečine v prsih, tiščanje v prsih ali resnejše težave, vključno srčnim infarktom in možgansko kapjo.
- Težko dihanje ali kašelj. To so lahko znaki težav s pljuči.
- Večja nagnjenost k podplutbam, dolgotrajnejše krvavitve kot po navadi, kakršnekoli krvavitve (npr. krvavitev iz dlesni), vijoličaste pege na koži ali večja nagnjenost k okužbam kot po navadi, vnetje žrela in povišana telesna temperatura, utrujenost, omedlevica, omotica ali bledica. To so lahko znaki težav s kostnim mozgom.
- Huda bolečina v želodcu, ki lahko sega v hrbet. To je lahko znak pankreatitisa (vnetja trebušne slinavke).
- Povišana telesna temperatura, mrzlica, utrujenost, izguba teka, bolečine v želodcu, siljenje na bruhanje, porumenelost kože ali očesnih beločnic (zlatenica). To so lahko znaki težav z jetri, npr. hepatitisa (vnetja jeter) ali okvare jeter.

Med drugimi neželenimi učinki so:

Zdravniku ali farmacevtu morate povedati, če kateri od teh neželenih učinkov postane resen ali traja dlje kot le nekaj dni.

Pogosti (pojavi se pri manj kot 1 od 10 bolnikov)

- glavobol ali utrujenost
- omotica. Verjetnost omotice je večja, ko začnete jemati zdravilo Ramipril Aurobindo ali začnete jemati večji odmerek.
- omedlevica, nenormalno nizek krvni tlak (hipotenzija), zlasti če hitro vstanete ali sedete
- suh dražeč kašelj, vnetje obnosnih votlin (sinuzitis) ali bronhitis, kratka sapa
- bolečine v želodcu ali črevesu, driska, prebavne težave, siljenje na bruhanje ali bruhanje
- izpuščaj na koži, z dvignjenim predelom ali brez njega
- bolečine v prsih
- krči ali bolečine v mišicah
- preiskave krvi, ki kažejo več kalija v krvi, kot po navadi.

Občasni (pojavi se pri manj kot 1 od 100 bolnikov)

- težave z ravnotežjem (vrtoglavica)
- srbenje in neobičajne zaznave na koži, npr. odrevenelost, mravljinčenje, zbadanje, pekoč ali gomazeč občutek na koži (parestezije)
- poslabšanje okušanja ali spremenjeno zaznavanju okusov
- težave s spanjem
- potrtost, tesnoba, izrazitejša živčnost kot po navadi ali nemir
- zamašen nos, težko dihanje ali poslabšanje astme
- oteklost črevesa, ki jo imenujemo "intestinalni angioedem" in se kaže s simptomi, kot so bolečine v trebuhu, bruhanje in driska
- zgaga, zaprtje ali suha usta
- odvajanje več vode (urina) čez dan kot po navadi
- močnejše znojenje kot po navadi
- izguba ali zmanjšanje teka (neješčnost)
- hitrejše ali neredno bitje srca, oteklost rok ali nog. To je lahko znak, da se v telesu zadržuje več vode kot po navadi.
- zardevanje
- zamegljen vid
- bolečine v sklepih

- povišana telesna temperatura
- impotenca pri moških, zmanjšano spolno poželenje pri moških ali ženskah
- večje število določenih belih krvnih celic (eozinofilija) pri preiskavah krvi
- spremembe izvidov preiskav krvi, ki kažejo delovanje jeter, trebušne slinavke ali ledvic.

Redki (pojavi se pri manj kot 1 od 1.000 bolnikov)

- občutek tresenja ali zmedenosti
- rdeč in otekel jezik
- hudo luščenje ali lupljenje kože, srbeč in bulast izpuščaj
- težave z nohti (npr. zrahljanje ali odstopanje nohtov z nohtne posteljice)
- izpuščaj na koži ali podplutbe
- pege na koži in hladni udi
- rdeče, srbeče, otekle ali solzeče se oči
- motnje sluha ali zvonjenje v ušesih
- občutek šibkosti
- spremembe izvidov preiskav krvi, ki kažejo zmanjšanje števila eritrocitov, levkocitov ali trombocitov ali zmanjšanje količine hemoglobina.

Zelo redki (pojavi se pri manj kot 1 od 10.000 bolnikov)

- večja občutljivost za sončno svetlobo, kot po navadi.

Drugi opisani neželeni učinki so:

Zdravniku ali farmacevtu morate povedati, če kateri od teh neželenih učinkov postane resen ali traja dlje kot le nekaj dni.

- težave s koncentracijo
- oteklost ust
- preiskave krvi, ki kažejo premalo krvnih celic v krvi
- preiskave krvi, ki kažejo manj natrija v krvi, kot po navadi.
- prsti na rokah in nogah spremenijo barvo, kadar ste na hladu, potem pa mravljinčijo ali bolijo, ko se ogrejejo (Raynaudov fenomen)
- povečanje prsi pri moških
- počasno ali prizadeto reagiranje
- pekoč občutek
- spremembe vonja stvari
- izpadanje las.

Če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA RAMIPRIL AUROBINDO

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Zdravila Ramipril Aurboindo ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na obojnini poleg oznake Uporabno do. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete vreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Ramipril Aurobindo

- Zdravilna učinkovina je ramipril. Ena tableta vsebuje 5 mg ali 10 mg ramiprila.
- Pomožne snovi so predgelirani škrob (koruzni), laktoza monohidrat, natrijev hidrogenkarbonat (E500), premreženi natrijev karmelozat (E468), rdeči železov oksid [samo 5-mg tablete] (E172), natrijev stearilfumarat.

Izgled zdravila Ramipril Aurobindo in vsebina pakiranja

Ramipril Aurobindo 5 mg tablete:

Bledo rožnata, lisasta, sploščena neobložena tableta s poševnimi robovi in vtisnjenima oznakama "H" na eni in "19" na drugi strani razdelilne zareze na eni strani tablete ter razdelilno zarezo na drugi strani tablete. Tableta se lahko deli na dve enaki polovici.

Ramipril Aurobindo 10 mg tablete:

Bela do skoraj bela, sploščena neobložena tableta s poševnimi robovi in vtisnjenima oznakama "H" na eni in "20" na drugi strani razdelilne zareze na eni strani tablete ter razdelilno zarezo na drugi strani tablete. Tableta se lahko deli na dve enaki polovici.

Ramipril Aurobindo tablete so na voljo v:

pretisnih omotih (poliamid/aluminij/PVC/aluminij)

belem neprozornem vsebniku iz HDPE s polipropilensko navojno zaporko

Velikosti pakiranja:

Ramipril Aurobindo 5 mg tablete:

pretisni omot: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100 in 500 tablet

HDPE vsebnik: 30 tablet in 1000 tablet

Ramipril Aurobindo 10 mg tablete:

pretisni omot: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 in 500 tablet

HDPE vsebnik: 30 tablet in 1000 tablet

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način izdaje zdravila Ramipril Aurobindo :

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1913

Malta

Izdelovalec

Milpharm Limited,

Ares, Odyssey Business Park,

West End Road,

South Ruislip HA4 6QD,

Velika Britanija

ali

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate

Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000

Malta

To zdravilo je odobreno v državah članicah EGP pod naslednjimi imeni:

Avstrija	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg Tabletten
Belgija	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg comprimés
Bolgarija	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg таблетки
Češka	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tablety
Danska	Ramipril Aurobindo
Estonija	Ramipril Aurobindo
Finska	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tabletti
Francija	RAMIPRIL AUROBINDO 5 mg / 10 mg, comprimé sécable
Francija	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg Tabletten
Grčija	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg δισκία
Madžarska	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tableta
Irska	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tablets
Italija	Ramipril Aurobindo Pharma Limited 5 mg / 10 mg compresse
Litva	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tabletės
Malta	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tablets
Nizozemska	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg, tabletten
Norveška	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tabletter
Poljska	Ramipril Aurobindo
Romunija	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg comprimate
Slovaška	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tablety
Slovenija	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tablete
Španija	ramipril cinfa 5 mg / 10 mg comprimidos EFG
Švedska	Ramipril Aurobindo 5 mg / 10 mg tabletter
Velika Britanija	Ramipril 5 mg / 10 mg tablets

Navodilo je bilo odobreno 8.3.2011