

## NAVODILO ZA UPORABO

**Ciprofloksacin Pfizer 250 mg filmsko obložene tablete**

**Ciprofloksacin Pfizer 500 mg filmsko obložene tablete**

**Ciprofloksacin Pfizer 750 mg filmsko obložene tablete**

ciprofloksacin

### **Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo!**

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

### **Navodilo vsebuje:**

1. Kaj je zdravilo Ciprofloksacin Pfizer in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Ciprofloksacin Pfizer
3. Kako jemati zdravilo Ciprofloksacin Pfizer
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Ciprofloksacin Pfizer
6. Dodatne informacije

## **1. KAJ JE ZDRAVILO CIPROFLOKSACIN PFIZER IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO**

Zdravilo Ciprofloksacin Pfizer je antibiotik, ki spada v družino fluorokinolonov. Zdravilna učinkovina je ciprofloksacin. Ciprofloksacin deluje tako, da uniči bakterije, ki povzročajo okužbe. Deluje le na določene seve bakterij.

### Odrasli

Zdravilo Ciprofloksacin Pfizer se pri odraslih uporablja za zdravljenje naslednjih bakterijskih okužb:

- okužbe dihal
- dolgotrajne ali ponavljajoče se okužbe ušes ali obnosnih votlin
- okužbe sečil
- okužbe mod (testisov)
- okužbe spolnih organov pri ženskah
- okužbe prebavil in okužbe v trebušni votlini
- okužbe kože in mehkih tkiv
- okužbe kosti in sklepov
- za zdravljenje okužb pri bolnikih z zmanjšanim številom belih krvnih celic (nevtropenijo)
- za preprečevanje okužb pri bolnikih z zmanjšanim številom belih krvnih celic (nevtropenijo)
- preprečevanje okužb z bakterijo *Neisseria meningitidis*
- pri izpostavljenosti povzročitelju vraničnega prisada z vdihavanjem

Če imate hudo okužbo, ki jo povzroča več vrst bakterij, boste morda poleg zdravila Ciprofloksacin Pfizer dobili še druga antibiotična zdravila.

### Otroci in mladostniki

Zdravilo Ciprofloksacin Pfizer se pri otrocih in mladostnikih pod nadzorom zdravnika-specialista uporablja za zdravljenje naslednjih bakterijskih okužb:

- okužba pljuč in bronhijev pri otrocih in mladostnikih s cistično fibrozo
- zapletene okužbe sečil, vključno z okužbami ledvic (pielonefritis)

- pri izpostavljenosti povzročitelju vraničnega prisada z vdihavanjem

Zdravilo Ciprofloksacin Pfizer se lahko pri otrocih in mladostnikih uporablja tudi za zdravljenje drugih specifičnih hudih okužb, kadar zdravnik presodi, da je to potrebno.

## 2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO CIPROFLOKSACIN PFIZER

### Ne jemljite zdravila Ciprofloksacin Pfizer:

- če ste alergični (preobčutljivi) na ciprofloksacin, druge kinolone ali katerokoli sestavino zdravila Ciprofloksacin Pfizer (glejte poglavje 6)
- če jemljete tizanidin (glejte poglavje 2: Jemanje drugih zdravil)

### Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Ciprofloksacin Pfizer

#### Preden vzamete zdravilo Ciprofloksacin Pfizer

Povejte svojemu zdravniku, če:

- ste kdaj imeli težave z ledvicami, ker bi bilo morda treba vaše zdravljenje prilagoditi
- imate epilepsijo ali kakšne druge nevrološke težave
- ste imeli težave s tetivami pri prejšnjih zdravljenjih z antibiotiki, ki so podobni zdravilu Ciprofloksacin Pfizer
- če imate miastenijo gravis (vrsta mišične oslabelosti)
- če ste imeli motnje srčnega ritma (aritmije)

#### Težave s srcem

Pri uporabi zdravil iz te skupine je potrebna previdnost, če imate prirojeno podaljšan interval QT (opazimo ga na EKG-ju, električni meritvi srca) ali se je le-ta v preteklosti pojavljal v vaši družini, če imate neravnovesje soli v krvi (še posebej nizko raven kalija ali magnezija v krvi), če imate zelo počasen srčni ritem (tako imenovano "bradikardijo"), če imate šibko srce (srčno popuščanje), če ste imeli v preteklosti srčni napad (miokardni infarkt), če ste ženska ali starejši bolnik ali če jemljete druga zdravila, ki povzročajo nenormalne spremembe EKG-ja (glejte poglavje *Jemanje drugih zdravil*).

#### Med jemanjem zdravila Ciprofloksacin Pfizer

Takoj obvestite zdravnika, če se kaj od navedenega pojavi **med zdravljenjem z zdravilom Ciprofloksacin Pfizer**. Zdravnik se bo odločil, če je treba zdravljenje z zdravilom Ciprofloksacin Pfizer prekiniti.

- **Takojšnja huda alergijska reakcija** (anafilaktična reakcija/šok, edem žil). Že pri prvem odmerku obstaja majhna možnost, da se pojavijo hude alergijske reakcije z naslednjimi simptomi: stiskanje v prsnem košu, omotica, oslabelost, omedlevica ali omotičnost ob vstajanju. **V takih primerih zdravljenje z zdravilom Ciprofloksacin Pfizer prekinite in takoj obvestite svojega zdravnika.**
- Občasno se lahko pojavijo **bolečine in otekanje sklepov ter vnetje kit**, zlasti če ste starejša oseba in se zdravite tudi s kortikosteroidi. Ob prvem znaku bolečine ali vnetja prekinite zdravljenje z zdravilom Ciprofloksacin Pfizer in poskrbite, da bo boleči predel miroval. Izogibajte se nepotrebni telesni dejavnosti, ker se lahko poveča tveganje za pretrganje kite. Do vnetja in pretrganja kite lahko pride tudi še več mesecev po prenehanju jemanja zdravila Ciprofloksacin Pfizer.
- Če imate **epilepsijo** ali kakšne druge **nevrološke težave** (npr. zmanjšana prekrvavitev možganov ali možganska kap), se vam lahko pojavijo neželeni učinki, ki so povezani z

osrednjim živčnim sistemom. V takih primerih zdravljenje z zdravilom Ciprofloksacin Pfizer prekinite in takoj obvestite svojega zdravnika.

- Po prvi uporabi zdravila Ciprofloksacin Pfizer se lahko pojavijo **psihične reakcije**. Če ste **depresivni** ali imate **psihozo** se lahko simptomi med zdravljenjem z zdravilom Ciprofloksacin Pfizer poslabšajo. V takih primerih zdravljenje z zdravilom Ciprofloksacin Pfizer prekinite in takoj obvestite svojega zdravnika.
- Med zdravljenjem se lahko pojavijo simptomi nevropatije, npr. bolečina, pekoč občutek, mravljinčenje, omrtvelost ali šibkost. V takih primerih zdravljenje z zdravilom Ciprofloksacin Pfizer prekinite in takoj obvestite svojega zdravnika.
- Med zdravljenjem z antibiotiki, tudi z zdravilom Ciprofloksacin Pfizer, ali celo več tednov po končanem zdravljenju se lahko pojavi **driska**. Če postane huda ali trdovratna, ali če opazite kri ali sluz v blatu, takoj prekinite zdravljenje z zdravilom Ciprofloksacin Pfizer, kajti to stanje je lahko smrtno nevarno. Ne uporabljajte zdravil, ki zavirajo gibanje prebavil, in se posvetujte z zdravnikom.
- Če morate dati **vzorec krvi ali seča**, obvestite zdravnika ali laboratorijsko osebje, da jemljete zdravilo Ciprofloksacin Pfizer.
- Zdravilo Ciprofloksacin Pfizer lahko povzroči **jetrne okvare**. Če opazite katerikoli simptom, npr. izgubo teka, zlatenico (porumenelost kože), temen seč, srbenje ali napet trebuh, prekinite jemanje zdravila Ciprofloksacin Pfizer in se takoj posvetujte z zdravnikom.
- Zdravilo Ciprofloksacin Pfizer lahko povzroči zmanjšanje števila belih krvnih celic in zato je vaša **odpornost proti okužbam lahko zmanjšana**. Če se vam pojavi okužba s simptomi, kot so povišana telesna temperatura in resno poslabšanje splošnega stanja, ali povišana telesna temperatura z znaki lokalne okužbe, npr. vnetje grla/žrela/ust ali težave s sečili, morate takoj obiskati zdravnika. Treba bo opraviti preiskavo krvi, da bi preverili morebitno zmanjšano število belih krvnih celic (agranulocitozo). Pomembno je, da zdravnika obvestite o svojem zdravilu.
- Obvestite svojega zdravnika, če imate vi ali katerikoli član vaše družine pomanjkanje glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze (G6PD), ker obstaja ob jemanju ciprofloksacina tveganje za anemijo.
- Med zdravljenjem z zdravilom Ciprofloksacin Pfizer lahko postane koža bolj **občutljiva za sončno svetlobo ali ultravijolično (UV) sevanje**. Izogibajte se izpostavljanju močni sončni ali umetni UV svetlobi, npr. solarijem.

## Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerikoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

**Ne jemljite zdravila Ciprofloksacin Pfizer hkrati s tizanidinom**, ker se lahko pojavijo neželeni učinki, npr. nizek krvni tlak in zaspanost (glejte poglavje 2: Ne jemljite zdravila Ciprofloksacin Pfizer).

Svojemu zdravniku morate povedati, če jemljete še kakšna druga zdravila, ki lahko spremenijo vaš srčni ritem: zdravila, ki spadajo med antiaritmike (npr. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), triciklične antidepresive, nekatera protimikrobna zdravila (ki spadajo med makrolide), nekatere antipsihotike.

Za naslednja zdravila je znano, da v telesu medsebojno delujejo z zdravilom Ciprofloksacin Pfizer. Jemanje zdravila Ciprofloksacin Pfizer sočasno s temi zdravili lahko vpliva na terapevtski učinek teh zdravil. Hkrati se lahko poveča možnost pojava neželenih učinkov.

## Obvestite svojega zdravnika, če jemljete:

- varfarin, acenokumarol, fenprokumon, fluindion ali katerikoli drugi peroralni antikoagulant (za redčenje krvi)
- probenecid (za zdravljenje protina)
- metoklopramid (za slabost s siljenjem na bruhanje in migreno)

- omeprazol (za zdravljenje želodčnih razjed, slabe prebave, zgage in Zollinger–Ellisonovega sindroma - trdovratne želodčne razjede zaradi povečanega izločanja želodčnih hormonov)
- ciklosporin (za zmanjšanje imunskega odziva)
- metotreksat (za zdravljenje nekaterih vrst raka, luskavice, revmatoidnega artritis)
- teofilin (za lajšanje težav z dihanjem)
- tizanidin (za zdravljenje mišičnih krčev pri multipli sklerozi)
- klozapin (antipsihotik)
- ropinirol (za zdravljenje Parkinsonove bolezni)
- fenitoin (za zdravljenje epilepsije)
- olanzapin (za zdravljenje psihotičnih stanj)
- glibenklamid (za zdravljenje sladkorne bolezni)

Zdravilo Ciprofloksacin Pfizer lahko **zviša** koncentracijo naslednjih zdravil v krvi:

- pentoksifilina (za zdravljenje motenj obtočil)
- kofeina
- lidokaina (za anestezijo)
- sildenafil (za odpravljanje motenj erekcije)
- duloksetina (za zdravljenje depresije, tesnobe, bolečin in nezmožnosti zadrževanja urina pri stresu)

Nekatera zdravila **zmanjšajo** učinek zdravila Ciprofloksacin Pfizer. Obvestite svojega zdravnika, če jemljete ali nameravate jemati:

- antacide
- mineralne pripravke
- sukralfat
- polimere, ki vežejo fosfat (npr. sevelamer)
- zdravila ali dodatke, ki vsebujejo kalcij, magnezij, aluminij ali železo

Če morate nujno jemati te pripravke, je treba zdravilo Ciprofloksacin Pfizer vzeti približno dve uri pred njimi ali vsaj štiri ure po zaužitju teh pripravkov.

### **Jemanje zdravila Ciprofloksacin Pfizer skupaj s hrano in pijačo**

Če zdravila Ciprofloksacin Pfizer ne vzamete skupaj z obroki, se ob zaužitju tablet izogibajte sočasni uporabi mlečnih izdelkov (npr. mleko ali jogurt), ali s kalcijem obogatenih pijač, ker lahko vplivajo na absorpcijo zdravilne učinkovine.

### **Nosečnost in dojenje**

Po možnosti se izogibajte jemanju zdravila Ciprofloksacin Pfizer med nosečnostjo. Posvetujte se z zdravnikom, če načrtujete nosečnost.

Ne jemljite zdravila Ciprofloksacin Pfizer med dojenjem, ker se ciprofloksacin izloča v materino mleko in lahko škoduje vašemu otroku.

### **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Zdravilo Ciprofloksacin Pfizer lahko zmanjša odzivnost. Pojavijo se lahko nekateri nevrološki neželeni učinki. Ne vozite ter ne upravljajte s stroji, dokler ne veste, kako se vaše telo odziva na zdravilo Ciprofloksacin Pfizer. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom.

### 3. KAKO JEMATI ZDRAVILO CIPROFLOKSACIN PFIZER

Zdravnik vam bo natančno pojasnil, koliko zdravila Ciprofloksacin Pfizer morate jemati, kako pogosto in kako dolgo. To je odvisno od vrste in resnosti okužbe.

Obvestite svojega zdravnika, če imate težave z ledvicami, ker bo morda treba prilagoditi odmerek.

Zdravljenje običajno traja od 5 do 21 dni, pri hudih okužbah tudi dlje.

Pri jemanju zdravila Ciprofloksacin Pfizer natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

- a. Tablete pogoltnite cele z veliko tekočine. Tablet ne žvečite, ker niso dobrega okusa.
- b. Tablete jemljite vsak dan ob približno istem času.
- c. Tablete lahko vzamete ne glede na obroke. Kalcij, ki ga zaužijete kot del obroka, ne bo pomembno vplival na privzem zdravila. **Ne jemljite** pa zdravila Ciprofloksacin Pfizer hkrati z mlečnimi izdelki (npr. z mlekom ali jogurtom) ali z minerali obogatenimi sadnimi sokovi (npr. s kalcijem obogaten pomarančni sok).

Med zdravljenjem z zdravilom Ciprofloksacin Pfizer pijte zadostne količine tekočin.

#### Če ste vzeli večji odmerek zdravila Ciprofloksacin Pfizer, kot bi smeli:

- Če ste vzeli večji odmerek, kot je predpisan, takoj poiščite zdravniško pomoč. Če je mogoče, vzemite s seboj tablete ali škatlo in jih pokažite zdravniku.

#### Če ste pozabili vzeti zdravilo Ciprofloksacin Pfizer

- Vzemite običajni odmerek takoj, ko je mogoče in nato nadaljujte, kot vam je predpisal zdravnik. Če je že skoraj čas za vaš naslednji odmerek, ne vzemite pozabljenega odmerka, ampak nadaljujte kot običajno. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Zanesljivo zaključite celotno zdravljenje.

#### Če ste prenehali jemati zdravilo Ciprofloksacin Pfizer

- Pomembno je, da **zaključite zdravljenje**, tudi če se čez nekaj dni počutite bolje. Če boste prekmalu prenehali jemati zdravilo, se vaša okužba še ne bo popolnoma pozdravila in se simptomi okužbe lahko ponovijo ali poslabšajo. Prav tako se lahko razvije odpornost na antibiotik.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

### 4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Ciprofloksacin Pfizer neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

**Pogosti neželeni učinki** (pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov):

- slabost, driska
- bolečine v sklepih pri otrocih

**Občasni neželeni učinki** (pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov):

- glivične okužbe
- povečano število eozinofilcev (vrsta belih krvnih celic)
- izguba apetita (anoreksija)

- hiperaktivnost ali vznemirjenost
- glavobol, omotica, motnje spanja ali motnje okusa
- bruhanje, bolečine v trebuhu, prebavne motnje, npr. težave z želodcem (slaba prebava/zgaga) ali vetrovi
- zvišane ravni določenih snovi v krvi (transaminaz in/ali bilirubina)
- izpuščaji, srbenje ali koprivnica
- bolečine v sklepih pri odraslih
- slabo delovanje ledvic
- bolečine v mišicah in kosteh, slabo počutje (astenija) ali zvišana telesna temperatura
- zvišane ravni alkalne fosfataze v krvi (posebna snov v krvi)

**Redki neželeni učinki** (pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov):

- vnetje črevesa (kolitis), povezano z uporabo antibiotikov (smrtno nevarno v zelo redkih primerih) (glejte poglavje 2: Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Ciprofloksacin Pfizer)
- spremembe v krvni sliki (levkopenija, levkocitoza, nevtropenija, anemija), zvišane ali znižane vrednosti krvnih ploščic (trombocitov)
- alergijska reakcija, otekanje (edem) ali hitro otekanje kože in sluznic (angioedem)
- zvišane vrednosti krvnega sladkorja (hiperglikemija)
- zmedenost, dezorientiranost, anksioznost, nenavadne sanje, depresija, ki v redkih primerih lahko privedejo do razmišljanj o samomoru ali samomorilnega vedenja ali halucinacije
- mravljinčenje, neobičajno zaznavanje dražljajev, zmanjšana občutljivost kože, tremor, epileptični napadi (glejte poglavje 2: Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Ciprofloksacin Pfizer) ali omotica
- motnje vida
- zvonjenje v ušesih, izguba sluha, poslabšanje sluha
- pospešeno bitje srca (tahikardija)
- razširitev krvnih žil (vazodilatacija), nizek krvni tlak ali omedlevica
- kratka sapa, vključno z znaki astme
- motnje v delovanju jeter, zlatenica (holestatski ikterus), hepatitis
- občutljivost za svetlobo (glejte poglavje 2: Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Ciprofloksacin Pfizer)
- bolečine v mišicah, vnetje sklepov, povečan tonus mišic ali krči
- ledvična odpoved, kri ali kristali v seču (glejte poglavje 2: Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Ciprofloksacin Pfizer), vnetje sečil
- zastajanje tekočine ali prekomerno znojenje
- zvišane ravni encima amilaza

**Zelo redki neželeni učinki** (pojavi se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov):

- zmanjšanje števila rdečih krvnih celic (hemolitična anemija), nevarno zmanjšanje števila vrste belih krvnih celic (agranulocitoza), zmanjšanje števila rdečih in belih krvnih celic in krvnih ploščic (pancitopenija), ki je lahko smrtno nevarno; depresija kostnega mozga, ki je tudi lahko smrtno nevarna (glejte poglavje 2: Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Ciprofloksacin Pfizer)
- huda alergijska reakcija (anafilaški reakcija ali anafilaktični šok, ki je lahko smrtno nevaren – serumska bolezen) (glejte poglavje 2: Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Ciprofloksacin Pfizer)
- duševne motnje (psihotične reakcije), ki v redkih primerih lahko privedejo do razmišljanj o samomoru ali samomorilnega vedenja (glejte poglavje 2: Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Ciprofloksacin Pfizer)
- migrena, motnje koordinacije, negotova hoja (motnje ravnotežja), motnje vohanja (olfaktorne motnje), pritisk na možgane (intrakranialni tlak)
- motnje zaznavanja barv
- vnetje žilnih sten (vaskulitis)
- vnetje trebušne slinavke
- odmrtje jetrnih celic (jetrna nekroza), ki zelo redko napreduje v smrtno nevarno jetrno odpoved

- majhne, pikčaste podkožne krvavitve (petehije); različne kožne spremembe in izpuščaji (npr. Stevens-Johnsonov sindrom ali toksična epidermalna nekroliza, ki sta lahko smrtno nevarna)
- oslabelost mišic, vnetje kit, raztrganje kit – zlasti dolge kite na zadnji strani gležnja (Ahilova tetiva) (glejte poglavje 2: Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Ciprofloksacin Pfizer), poslabšanje simptomov miastenije gravis (glejte poglavje 2: Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Ciprofloksacin Pfizer)

**Pogostnost ni znana** (pogostnosti ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov)

- težave v povezavi z živčnim sistemom (npr. bolečina, pekoč občutek, ščemenje, odrevenelost in/ali oslabelost okončin)
- težave s srcem: nenormalno hiter srčni ritem, smrtno nevaren nepravilen srčni ritem, spremenjen srčni ritem (tako imenovano "podaljšanje intervala QT", opazimo ga na EKG-ju, meritvi električne aktivnosti srca)
- akutna generalizirana eksantematozna pustuloza (AGEP) – vrsta kožnega obolenja z rdečo, mehurjasto kožo
- če se jemlje skupaj z antikoagulantom kot je varfarin, se redčenje krvi lahko okrepi

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

## 5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA CIPROFLOKSACIN PFIZER

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Ciprofloksacin Pfizer ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na pretisnem omotu ali škatli za oznako "Uporabno do:". Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

## 6. DODATNE INFORMACIJE

### Kaj vsebuje zdravilo Ciprofloksacin Pfizer

- Zdravilna učinkovina je ciprofloksacin (kot ciprofloksacinijev klorid).  
Ena filmsko obložena tableta vsebuje 250 mg ciprofloksacina (v obliki ciprofloksacinijevega klorida).  
Ena filmsko obložena tableta vsebuje 500 mg ciprofloksacina (v obliki ciprofloksacinijevega klorida).  
Ena filmsko obložena tableta vsebuje 750 mg ciprofloksacina (v obliki ciprofloksacinijevega klorida).
- Pomožne snovi so:  
*Jedro tablete:* mikrokristalna celuloza (E460), natrijev karboksimetilškrob (vrsta A), povidon (K 30), koloidni brezvodni silicijev dioksid (E551), magnezijev stearat (E572)  
*Filmska obloga:* hipromeloza (E464), makrogol (400), titanov dioksid (E171)

### Izgled zdravila Ciprofloksacin Pfizer in vsebina pakiranja

filmsko obložene tablete

### *Ciprofloksacin Pfizer 250 mg*

Bele do skoraj bele filmsko obložene tablete okrogle oblike z razdelilno zarezo na eni strani in vtisnjenima oznakama "F", "23" na obeh straneh razdelilne zareze na drugi strani.

Razdelilna zareza je namenjena delitvi tablete za lažje požiranje in ne delitvi tablete na dva enaka odmerka.

### *Ciprofloksacin Pfizer 500 mg*

Bele do skoraj bele filmsko obložene tablete kapsulaste oblike s prelomno zarezo na eni strani in vtisnjeno oznako "F 22" na drugi strani.

Tableta se lahko deli na enaki polovici.

### *Ciprofloksacin Pfizer 750 mg*

Bele do skoraj bele filmsko obložene tablete kapsulaste oblike z vtisnjeno oznako "C" na eni strani in "93" na drugi strani.

Pretisni omoti iz PVC/PVdC-aluminijske folije, pakirani v škatli.

Velikosti pakiranja:

*250 mg in 750 mg*: 6, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 50, 100 in 120 filmsko obloženih tablet

*500 mg*: 1, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 50, 100 in 120 filmsko obloženih tablet

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

### **Način in režim izdaje zdravila**

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

### **Imetnik dovoljenja za promet**

Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luksemburg

### **Izdelovalec**

Pfizer Italia s.r.l, Localita Marino del Tronto, Ascoli Piceno, Italija

Pfizer Service Company, Hoge Wei 10, B-1930, Zaventem, Vlaams Brabant, Belgija

### **To zdravilo je odobreno v državah članicah EGP pod naslednjimi imeni:**

Avstrija:	Ciprofloxacin "Pfizer" 250 mg/ 500 mg/ 750 mg Filmtabletten
Belgija:	Ciprofloxacin Pfizer 250 mg/ 500 mg/ 750 mg comprimés pelliculés
Francija:	Ciprofloxacin Pfizer 250 mg comprimé pelliculé / 500 mg comprimé pelliculé sécable / 750 mg, comprimé pelliculé
Madžarska:	Ciprofloxacin Pfizer 250 mg/ 500 mg / 750 mg filmtabletta
Irska:	Ciprofloxacin Pfizer 250 mg/ 500 mg/ 750 mg film-coated tablets
Italija:	Ciprofloxacin Pfizer 250 mg/ 500 mg/ 750 mg compresse rivestite con film
Litva:	Ciprofloxacin Pfizer 250 mg/ 500 mg / 750 mg plėvele dengtos tabletės
Luksemburg:	Ciprofloxacin Pfizer 250 mg/ 500 mg/ 750 mg comprimés pelliculés
Nizozemska:	Ciprofloxacin Pfizer 250 mg/ 500 mg/ 750 mg, filmomhulde tabletten
Norveška:	Ciprofloxacin Pfizer 250 mg/ 500 mg/ 750 mg tablett, filmdrasjerte
Portugalska:	Ciprofloxacin Parke-Davis
Slovenija:	Ciprofloksacin Pfizer 250 mg/ 500 mg/ 750 mg filmsko obložene tablete
Španija:	CIPROFLOXACINO PHARMACIA 250 mg/ 500 mg/ 750 mg comprimidos recubiertos con película
Švedska:	Ciprofloxacin Pfizer 250 mg/ 500 mg/ 750 mg filmdragerade tablett
Velika Britanija:	Ciprofloxacin 250 mg/ 500 mg/ 750 mg film-coated tablets

**Navodilo je bilo odobreno: 2.11.2011**



**Nasvet/zdravstvena vzgoja**

Antibiotiki se uporabljajo za zdravljenje bakterijskih okužb. Ne učinkujejo proti virusnim okužbam. Če vam je zdravnik predpisal antibiotike, jih uporabite le za vašo sedanjo bolezen. Kljub antibiotičnemu zdravljenju lahko nekaj bakterij preživi ali zraste. Ta pojav se imenuje rezistenca; nekatera antibiotična zdravljenja postanejo neučinkovita.

Napačna uporaba antibiotikov zvečuje odpornost. Z nepravilnim jemanjem se lahko povzroči tudi, da se razvije odpornost bakterij in se zato podaljša vaše zdravljenje ali zmanjša učinkovitost antibiotikov. Pri jemanju upoštevajte:

- odmerek
- shemo jemanja
- trajanje zdravljenja.

**Za ohranitev učinkovitosti tega zdravila je treba:**

- 1 – Uporabljati antibiotike samo kadar so predpisani.
- 2 – Natančno upoštevati navodila.
- 3 – Ne uporabljati antibiotika ponovno brez zdravnikovega nasveta, tudi če bi želeli zdraviti podobno bolezen.
- 4 – Nikoli dati antibiotika drugi osebi; morda ni primeren za njeno bolezen.
- 5 – Po končanem zdravljenju vrnite neuporabljeno zdravilo v lekarno. S tem bo zagotovljeno pravilno odstranjevanje zdravila.