

NAVODILO ZA UPORABO

Omeprazol Aurobindo 10 mg trde gastrorezistentne kapsule **Omeprazol Aurobindo 20 mg trde gastrorezistentne kapsule** **Omeprazol Aurobindo 40 mg trde gastrorezistentne kapsule**

omeprazol

Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Omeprazol Aurobindo in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Omeprazol Aurobindo
3. Kako jemati zdravilo Omeprazol Aurobindo
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Omeprazol Aurobindo
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO OMEPRAZOL AUROBINDO IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Omeprazol Aurobindo vsebuje zdravilno učinkovino omeprazol. Spada v skupino zdravil, imenovanih "zaviralci protonske črpalke". Ta zdravila delujejo tako, da zmanjšajo nastajanje kisline v želodcu.

Zdravilo Omeprazol Aurobindo se uporablja za zdravljenje naslednjih bolezni:

Pri odraslih:

- Gastroezofagealne refluksne bolezni (GERB). Gre za bolezen, pri kateri kislina iz želodca uhaja v požiralnik (cev, ki povezuje žrelo z želodcem); to povzroča bolečine, vnetje in zgago.
- Razjed v zgornjem delu črevesa (razjed na dvanajstniku) ali želodcu (razjed na želodcu).
- Razjed, okuženih z bakterijo, ki se imenuje *Helicobacter pylori*. Če imate to bolezen, vam bo zdravnik morda predpisal tudi antibiotike za zdravljenje okužbe in zacelitev razjede.
- Razjed na želodcu, ki so posledica jemanja nesteroidnih protivnetnih zdravil (NSAR). Zdravilo Omeprazol Aurobindo se lahko uporablja tudi za preprečitev nastanka razjed, če jemljete NSAR.
- Čezmernega izločanja želodčne kisline, ki je posledica rašče v trebušni slinavki (Zollinger-Ellisonovega sindroma).

Pri otrocih:

Otroci, starejši od 1 leta in s telesno maso ≥ 10 kg

- Gastroezofagealne refluksne bolezni (GERB). Gre za bolezen, pri kateri kislina iz želodca uhaja v požiralnik (cev, ki povezuje žrelo z želodcem); to povzroča bolečine, vnetje in zgago. Pri otrocih so lahko med simptomi te bolezni vračanje želodčne vsebine v usta (regurgitacija), bruhanje in slabo pridobivanje telesne mase.

Otroci in mladostniki, starejši od 4 let

- Razjed, okuženih z bakterijo, ki se imenuje *Helicobacter pylori*. Če ima vaš otrok to bolezen, mu bo zdravnik morda predpisal tudi antibiotike za zdravljenje okužbe in zacelitev razjede.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO OMEPRAZOL AUROBINDO

Ne jemljite zdravila Omeprazol Aurobindo

- če ste alergični (preobčutljivi) na omeprazol ali katerokoli sestavino zdravila Omeprazol Aurobindo;
- če ste alergični na zdravila, ki vsebujejo druge zaviralce protonske črpalke (npr. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol);
- če jemljete kakšno zdravilo, ki vsebuje nelfinavir (uporablja se pri okužbi s HIV).

Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete zdravilo Omeprazol Aurobindo.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Omeprazol Aurobindo:

Zdravilo Omeprazol Aurobindo lahko prikrije simptome drugih bolezni. Zato se morate takoj posvetovati s svojim zdravnikom, če se vam kaj od naštetega zgodi pred začetkom jemanja zdravila Omeprazol Aurobindo ali medtem, kot jemljete to zdravilo:

- brez razloga precej shujšate in imate težave s požiranjem;
- pojavijo se vam bolečine v želodcu ali težave z želodcem;
- začnete bruhati hrano ali kri;
- iztrebljate črno (krvavo obarvano) blato;
- če se vam pojavi huda ali dolgotrajna driska, kajti omeprazol je bil povezan z nekoliko večjo pogostnostjo infekcijske driske;
- imate hude težave z jetri.

Če jemljete zdravilo Omeprazol Aurobindo dolgo časa (več kot 1 leto), vas bo zdravnik verjetno redno kontroliral. Kadar obiščete zdravnika, mu morate povedati za vse novonastale ali izredne simptome in okoliščine.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta. Zdravilo Omeprazol Aurobindo namreč lahko vpliva na delovanje nekaterih zdravil in nekatera zdravila lahko vplivajo na zdravilo Omeprazol Aurobindo.

Ne jemljite zdravila Omeprazol Aurobindo, če jemljete kakšno zdravilo, ki vsebuje **nelfinavir** (uporablja se za zdravljenje okužbe s HIV).

Svojemu zdravniku ali farmacevtu morate povedati, če jemljete katero od naslednjih zdravil:

- ketokonazol, itrakonazol ali vorikonazol (uporablja se za zdravljenje glivičnih okužb);
- digoksin (uporablja se za zdravljenje težav s srcem);
- diazepam (uporablja se za zdravljenje tesnobe, za sproščanje mišic ali pri epilepsiji);
- fenitoin (uporablja se pri epilepsiji). Če jemljete fenitoin, vas bo moral zdravnik kontrolirati, ko boste začeli ali nehali jemati zdravilo Omeprazol Aurobindo;
- zdravila za redčenje krvi, npr. varfarin ali druge antagonistice vitamina K. Zdravnik vas bo morda moral kontrolirati, ko boste začeli ali nehali jemati zdravilo Omeprazol Aurobindo;
- rifampicin (uporablja se za zdravljenje tuberkuloze);
- atazanavir (uporablja se za zdravljenje okužbe s HIV);
- takrolimus (uporablja se pri presaditvi organov);
- šentjanževko (*Hypericum perforatum*) (uporablja se za zdravljenje blage depresije);
- cilostazol (uporablja se za zdravljenje intermitentne klavdikacije);
- sakvinavir (uporablja se za zdravljenje okužbe s HIV);
- klopidoogrel (uporablja se za preprečevanje krvnih strdkov (trombov)).

Če vam je zdravnik poleg zdravila Omeprazol Aurobindo za zdravljenje razjed, ki jih povzroča okužba s *Helicobacter pylori*, predpisal tudi antibiotika amoksicilin in klaritromicin, je zelo pomembno, da mu poveste za vsa druga zdravila, ki jih morda jemljete.

Jemanje zdravila Omeprazol Aurobindo skupaj s hrano in pijačo

Kapsule lahko vzamete s hrano ali na prazen želodec.

Nosečnost in dojenje

Preden vzamete zdravilo Omeprazol Aurobindo, morate zdravniku povedati, če ste noseči ali če poskušate zanositi. Zdravnik bo presodil, ali lahko med tem časom jemljete zdravilo Omeprazol Aurobindo.

Zdravnik bo presodil, ali lahko jemljete zdravilo Omeprazol Aurobindo, če dojite.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni verjetno, da bi zdravilo Omeprazol Aurobindo vplivalo na vašo sposobnost za upravljanje vozil ali strojev. Pojavijo se lahko neželeni učinki, npr. omotica ali motnje vida (glejte poglavje 4). Če se vam to zgodi, ne smete voziti ali upravljati s stroji.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Omeprazol Aurobindo

Omeprazol Aurobindo kapsule vsebujejo laktozo. Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO OMEPRAZOL AUROBINDO

Pri jemanju zdravila Omeprazol Aurobindo natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Zdravnik vam bo povedal, koliko kapsul morate vzeti in koliko časa jih morate jemati. To bo odvisno od vaše bolezni in vaše starosti.

Običajni odmerki so navedeni spodaj.

Odrasli:

Za zdravljenje simptomov GERB, npr. **zgage in vračanja kisline:**

- Če je zdravnik ugotovil, da imate rahlo poškodovan požiralnik, je običajen odmerek 20 mg zdravila Omeprazol Aurobindo enkrat na dan od 4 do 8 tednov. Če se požiralnik še ni pozdravil, vam zdravnik lahko naroči, da jemljite odmerek 40 mg nadaljnjih 8 tednov.
- Potem, ko se požiralnik pozdravi, je običajen odmerek 10 mg enkrat na dan.
- Če požiralnik ni bil poškodovan, je običajen odmerek 10 mg enkrat na dan.

Za zdravljenje **razjed v zgornjem delu črevesa** (razjed na dvanajstniku):

- Običajen odmerek je 20 mg enkrat na dan 2 tedna. Če se razjeda še ni pozdravila, vam zdravnik lahko naroči, da jemljite enak odmerek še nadaljnja 2 tedna.
- Če se vam razjeda ne pozdravi povsem, je odmerek mogoče povečati na 40 mg enkrat na dan za 4 tedne.

Za zdravljenje **razjed v želodcu:**

- Običajen odmerek je 20 mg enkrat na dan 4 tedne. Če se razjeda še ni pozdravila, vam zdravnik lahko naroči, da jemljite enak odmerek še nadaljnje 4 tedne.
- Če se vam razjeda ne pozdravi povsem, je odmerek mogoče povečati na 40 mg enkrat na dan za nadaljnjih 8 tednov.

Za **preprečitev ponovitve razjede na dvanajstniku ali želodcu:**

- Običajen odmerek je 10 mg ali 20 mg enkrat na dan. Zdravnik vam odmerek lahko poveča na 40 mg enkrat na dan.

Za zdravljenje razjed na dvanajstniku ali želodcu, **ki so posledica nesteroidnih protivnetnih zdravil (NSAR):**

- Običajen odmerek je 20 mg enkrat na dan od 4 do 8 tednov.

Za **preprečevanje razjed na dvanajstniku ali želodcu**, če jemljete NSAR

- Običajen odmerek je 20 mg enkrat na dan.

Za zdravljenje **razjed, ki jih povzroči okužba s *Helicobacter pylori***, in za preprečevanje njihovih ponovitev:

- Običajen odmerek je 20 mg zdravila Omeprazol Aurobindo dvakrat na dan en teden.
- Zdravnik vam bo predpisal tudi dva izmed naslednjih treh antibiotikov: amoksicilin, klaritromicin in metronidazol.

Za zdravljenje čezmernega izločanja želodčne kisline, ki je posledica **rašče v trebušni slinavki (Zollinger-Ellisonovega sindroma)**:

- Običajen odmerek je 60 mg enkrat na dan.
- Zdravnik vam bo odmerek prilagodil glede na vaše potrebe in bo tudi odločil, koliko časa morate jemati zdravilo.

Otroci:

Za zdravljenje simptomov GERB, npr. **zgage in vračanja kisline**:

- Otroci, ki so starejši od 1 leta in tehtajo več kot 10 kg, lahko jemljejo zdravilo Omeprazol Aurobindo. Odmerek za otroka temelji na njegovi telesni masi in ustrezeni odmerek bo določil zdravnik.

Za zdravljenje **razjed, ki jih povzroči okužba s *Helicobacter pylori***, in za preprečevanje njihovih ponovitev:

- Otroci, stari več kot 4 leta, lahko jemljejo zdravilo Omeprazol Aurobindo. Odmerek za otroka temelji na njegovi telesni masi in ustrezeni odmerek bo določil zdravnik.
- Zdravnik bo otroku predpisal tudi dva antibiotika, ki se imenujeta amoksicilin in klaritromicin.

Jemanje tega zdravila

- Priporočljivo je, da kapsule vzamete zjutraj.
- Kapsule lahko vzamete s hrano ali na prazen želodec.
- Kapsule pogoltnite cele s pol kozarca vode. Kapsul ne grizite in ne drobite: vsebujejo namreč obložene kroglice, ki preprečijo, da bi kislina v želodcu razgradila zdravilo. Pomembno je, da se te kroglice ne poškodujejo.

Kaj storiti, če vi ali vaš otrok težko pogoltneta kapsule

- Če vi ali vaš otrok težko pogoltneta kapsule:
 - Odprite kapsule in njihovo vsebino neposredno zaužijte s pol kozarca vode, ali pa njihovo vsebino dajte v kozarec navadne vode (brez mehurčkov), katerikoli kisel sadni sok (npr. jabolčni, pomarančni ali ananasov) ali v čežano.
 - Mešanico vedno premešajte, tik preden jo popijete (mešanica ne bo bistra). Potem mešanico popijte takoj ali najkasneje v 30 minutah.
 - Da boste popili zares vse zdravilo, kozarec nato zelo dobro splaknite s pol kozarca vode in to vodo popijte. Trdni delci vsebujejo zdravilo – ne žvečite jih in jih ne drobite.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Omeprazol Aurobindo, kot bi smeli

Če ste vzeli več zdravila Omeprazol Aurobindo, kot vam ga je predpisal zdravnik, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Omeprazol Aurobindo

Če pozabite vzeti odmerek, ga vzemite, čim se spomnite. Če pa je že skoraj čas za naslednji odmerek, preskočite izpuščen odmerek. Ne vzemite dvojnega odmerka, da bi nadomestili pozabljen odmerek.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Omeprazol Aurobindo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če opazite katerega od naslednjih redkih, toda resnih neželenih učinkov, nehajte jemati zdravilo Omeprazol Aurobindo in se nemudoma posvetujte z zdravnikom:

- Nenadno piskajoče dihanje, oteklost ustnic, jezika in žrela ali telesa, izpuščaj, omedlevico ali težave s požiranjem (huda alergijska reakcija).
- Pordelost kože z mehurji ali lupljenjem. Pojavijo se lahko tudi hudi mehurji in krvavitve na ustnicah, očeh, ustih, nosu in spolovilih. To je lahko t. i. Stevens-Johnsonov sindrom ali toksična epidermalna nekroliza.
- Porumenelost kože, temen urin in utrujenost; to so lahko simptomi težav z jetri.

Neželeni učinki se lahko pojavijo z določenimi pogostnostmi, ki so opredeljene takole:

Zelo pogosti:	pojavi se pri več kot 1 od 10 uporabnikov
Pogosti:	pojavi se pri 1 do 10 od 100 uporabnikov
Občasni:	pojavi se pri 1 do 10 od 1.000 uporabnikov
Redki:	pojavi se pri 1 do 10 od 10.000 uporabnikov
Zelo redki:	pojavi se pri manj kot 1 od 10.000 uporabnikov
Ni znano:	pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

Med drugimi neželenimi učinki so:

Pogosti neželeni učinki

- glavobol
- učinki na želodec in črevo: driska, bolečine v želodcu, zaprtost, vetrovi
- siljenje na bruhanje ali bruhanje

Občasni neželeni učinki

- otekanje stopal in gležnjev
- motnje spanja (nespečnost)
- omotica, ščemeči občutki, npr. "mravljinčenje", zaspanost.
- vrtoglavica
- spremembe izvidov preiskav krvi, ki preverjajo delovanje jeter
- izpuščaj na koži, bulast izpuščaj (koprivnica) in srbenje kože
- splošno slabo počutje in pomanjkanje energije

Redki neželeni učinki

- krvne motnje, npr. zmanjšanje števila belih krvnih celic ali krvnih ploščic. Posledice so lahko šibkost, podplutbe ali večja verjetnost okužb.
- alergijske reakcije, ki so včasih zelo hude, vključno z otekanjem ustnic, jezika in žrela, zvišana telesna temperatura, piskajoče dihanje
- nizka raven natrija v krvi. To lahko povzroči šibkost, bruhanje in krče.
- vznemirjenost, zmedenost ali potrtost
- spremembe okušanja
- težave z vidom, npr. zamegljen vid
- nenadno piskajoče dihanje ali kratka sapa (bronhospazem)
- suha usta
- vnetje v ustih
- okužba, imenovana "gobice", ki lahko prizadene črevo in jo povzročajo glivice
- težave z jetri, vključno z zlatenico, ki lahko povzroči porumenelost kože, temen urin in utrujenost
- izpadanje las (alopecija)
- izpuščaj na koži po izpostavljenosti soncu
- bolečine v sklepih (artralgija) ali mišicah (mialgija)
- hude težave z ledvicami (intersticijski nefritis)

- močnejše znojenje

Zelo redki neželeni učinki

- spremembe števila krvnih celic, vključno z agranulocitozo (pomanjkanjem belih krvnih celic)
- napadalnost (agresivnost)
- videnje, občutenje ali slišanje stvari, ki jih ni (halucinacije)
- hude težave z jetri, ki povzročijo odpoved jeter in vnetje možganov
- nenaden pojav hudega izpuščaja, mehurjev ali lupljenja kože. To je lahko povezano z zelo visoko telesno temperaturo in bolečinami v sklepih (multiformni eritem, Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza)
- šibkost mišic
- povečanje prsi pri moških
- hipomagneziemija

Zdravilo Omeprazol Aurobindo lahko v zelo redkih primerih prizadene bele krvne celice in povzroči imunsko pomanjkljivost. Če imate okužbo s simptomi, kot sta npr. zvišana telesna temperatura in **zelo** slabo splošno stanje, ali zvišana telesna temperatura s simptomi lokalne okužbe, npr. bolečinami v vratu, žrelu ali ustih, ali s težavami pri uriniranju, se morate čim prej posvetovati z zdravnikom, da bo lahko s preiskavo krvi izključil pomanjkanje belih krvnih celic (agranulocitozo). V takšnem primeru je pomembno, da mu poveste za svoje zdravilo.

Vendar naj vam ta seznam možnih neželenih učinkov ne zbuja skrbi. Morda se vam ne bo pojavil nobeden od njih. Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA OMEPRAZOL AUROBINDO

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Omeprazol Aurobindo ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na pretisnem omotu, steklenici in škatli poleg oznake »EXP«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadno vodo ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Omeprazol Aurobindo

- Zdravilna učinkovina je omeprazol. Ena gastrorezistentna kapsula, trda vsebuje 10 mg, 20 mg ali 40 mg omeprazola.
- Pomožne snovi so
Vsebinska kapsule: laktoza monohidrat, natrijev lavrilsulfat, mikrokristalna celuloza (E460), hidroksipropilceluloza (E463), manitol (E421), natrijev dihidrogenfosfat (E339), hipromeloza (E464), trietilcitrat (E1505), smukec (E553b), metakrilna kislina in etilakrilat, kopolimer 1:1, glicerol monostearat 40-55, polisorbitat 80 (E433), titanov dioksid (E171).

Ovojnica kapsule: rdeči železov oksid (E172), titanov dioksid (E171), želatina, natrijev lavrilsulfat.

Barvilo za tisk: šelak (E904), propilenglikol (E1520), črni železov oksid (E172), kalijev hidroksid (E525).

Izgled zdravila Omeprazol Aurobindo in vsebina pakiranja

trda gastrorezistentna kapsula

Omeprazol Aurobindo 10 mg:

Rožnate/rožnate trde želatinske kapsule, velikost "3", ki imajo s črnim črnilom vtisnjen "E" na rožnato kapico ter "65" na rožnato telo in so napolnjene z belimi do skoraj belimi gastrorezistentnimi zrci.

Omeprazol Aurobindo 20 mg:

Rdečkastorjave/rožnate trde želatinske kapsule, velikost "1", ki imajo s črnim črnilom vtisnjen "E" na rdečkastorjavo kapico ter '67' na rožnato telo in so napolnjene z belimi do skoraj belimi gastrorezistentnimi zrci.

Omeprazol Aurobindo 40 mg:

Rdečkastorjave/rdečkastorjave trde želatinske kapsule, velikost "0", ki imajo s črnim črnilom vtisnjen "E" na rdečkastorjavo kapico ter '69' na rdečkastorjavo telo in so napolnjene z belimi do skoraj belimi gastrorezistentnimi zrci.

Omeprazol Aurobindo kapsule so na voljo v pretisnih omotih iz PVC/poliamida/aluminija/PVC/papirja/poliestra/aluminija in v HDPE plastenkah.

Pretisni omot iz PVC/poliamida/aluminija/PVC/papirja/poliestra/aluminija:

Omeprazol Aurobindo 10 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 in 500 kapsul

Omeprazol Aurobindo 20 mg: 1, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 250, 500 in 1000 kapsul

Omeprazol Aurobindo 40 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 in 500 kapsul

HDPE plastenka vsebuje sušilno sredstvo (silikagel), ki se nahaja v polipropilenski zaporki:

Omeprazol Aurobindo 10 mg, 20 mg in 40 mg: 14, 28, 50 in 500 kapsul

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Aurobindo Pharma (Malta) Limited
Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront
Floriana FRN 1913
Malta

Izdelovalec

APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate
Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000
Malta

Zdravilo Omeprazol Aurobindo trde kapsule je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Avstrija: Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg magensaftresistente Hartkapseln
Belgija: Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg gélules gastro-résistante
Bolgarija: Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg стомашно-устойчиви капсули, твърди
Češka: Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky
Ciper: Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό
Danska: Omeprazol Aurobindo
Estonija: Omeprazole Aurobindo

Finska:	Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg enterokapseli, kova
Nemčija:	Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg magensaftresistente Hartkapseln
Grčija:	Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό
Madžarska:	Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula
Irska:	Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg gastro-resistant capsules, hard
Italija:	Omeprazolo Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg capsule rigide gastroresistenti
Latvija:	Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg zarnās šķīstošās cietās kapsulas
Litva:	Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg skrandyje neirios kietos kapsulės
Luksemburg:	Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg gélules gastro-résistante
Malta:	Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg gastro-resistant capsules, hard
Nizozemska:	Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg, maagsapresistente capsules, hard
Norveška:	Omeprazol Aurobindo
Poljska:	Omeprazol Aurobindo
Portugalska:	Omeprazol Aurobindo
Romunija:	Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg capsule gastrorezistente
Slovaška:	Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Slovenija:	Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg trde gastrorezistentne kapsule
Španija:	Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg cápsulas duras gastrorresistentes EFG
Švedska:	Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg enterokapsel, hård
Velika Britanija:	Omeprazole 10 mg/ 20 mg/ 40 mg gastro-resistant capsules, hard

Navodilo je bilo odobreno 04.05.2011