

NAVODILO ZA UPORABO

Piramil™ 1,25 mg tablete
Piramil™ 2,5 mg tablete
Piramil™ 5 mg tablete
Piramil™ 10 mg tablete

ramipril

Pred uporabo natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Piramil in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Piramil
3. Kako jemati zdravilo Piramil
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Piramil
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO PIRAMIL IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Piramil vsebuje zdravilno učinkovino ramipril. Zdravilo Piramil sodi v skupino zdravil, ki se imenujejo zaviralci ACE (encima angiotenzinske konvertaze).

Zdravilo Piramil deluje tako, da:

- v telesu zmanjša nastajanje snovi, ki lahko zvišajo krvni tlak
- sprosti in razširi žile
- srcu olajša črpanje krvi po telesu.

Zdravilo Piramil se lahko uporablja za:

- zdravljenje visokega krvnega tlaka (hipertenzije),
- zmanjšanje tveganja za srčni infarkt ali možgansko kap
- zmanjšanje tveganja ali upočasnitev poslabšanja težav z ledvicami (ne glede na to ali imate sladkorno bolezen ali ne),
- za zdravljenje stanja, pri katerem srce ne more prečrpati dovolj krvi po telesu (to stanje imenujemo srčno popuščanje)
- zdravljenje po srčnem infarktu (miokardnem infarktu), pri katerem se kot zaplet pojavi srčno popuščanje.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO PIRAMIL

Ne jemljite zdravila Piramil,

- če ste alergični (preobčutljivi) na ramipril, katerikoli drug zaviralec ACE ali katerikoli sestavino zdravila Piramil, ki so navedene v poglavju 6
Med znaki alergijske reakcije so lahko izpuščaji, težave s požiranjem ali dihanjem, oteklost ustnic, obraza, žrela ali jezika.
- če ste kdajkoli imeli resno preobčutljivostno reakcijo imenovano »angioedem«
Znaki vključujejo srbenje, koprivnico (urtikarijo), rdeče spremembe na rokah, stopalih in žrelu, oteklost žrela in jezika, oteklost okrog oči in ustnic, težko dihanje in težko požiranje.
- če se zdravite z dializo ali kakšno drugo vrsto filtracije krvi
Odvisno od za to uporabljene naprave, je mogoče, da zdravilo Piramil ni primerno za vas.
- če imate ledvične težave, zaradi katerih pride do zmanjšane oskrbe s krvjo (zaradi zožitve ledvičnih arterij)
- v **zadnjih 6 mesecih nosečnosti** (glejte poglavje spodaj "Nosečnost in dojenje")
- če imate nenormalno nizek ali nestabilen krvni tlak. To mora oceniti zdravnik.

Če karkoli od zgoraj naštetega velja za vas, ne vzemite zdravila Piramil. Če ste negotovi se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom preden vzamete zdravilo Piramil.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Piramil

Preden vzamete zdravilo se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

- če imate težave s srcem, jetri ali ledvicami
- če ste izgubili veliko količino telesnih soli ali tekočin (zaradi bolezni (bruhanja), driske, prekomernega potenja, diete z malo soli, dolgotrajnega jemanja diuretikov (tablete za odvajanje vode) ali dialize)
- če imate predvideno zdravljenje za odpravljanje alergije na pike čebel ali os (desenzibilizacija)
- če boste prejeli anestetik. Dobite ga lahko za operacijo ali kakšen zobozdravstven poseg. Morda boste morali en dan pred tem prenehati z jemanjem zdravila Piramil; posvetujte se s svojim zdravnikom.
- če imate visoke vrednosti kalija v krvi (ugotovljeno s krvnimi preiskavami)
- če imate kolagensko žilno bolezen, kot je skleroderma ali sistemski eritematozni lupus
- Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali bi lahko zanosili).
Uporaba zdravila Piramil ni priporočljiva v prvih 3 mesecih nosečnosti, po tretjem mesecu nosečnosti pa lahko povzroči resno škodo vašemu otroku (glejte poglavje Nosečnost in dojenje).

Otroci

Zdravila Piramil ni priporočljivo uporabljati pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let, ker za to populacijo ni informacij.

Če karkoli od naštetega velja za vas (ali niste prepričani), se preden vzamete zdravilo Piramil posvetujete z zdravnikom.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta (vključno z zeliščnimi pripravki). Zdravilo Piramil lahko vpliva na delovanje drugih zdravil, prav tako pa lahko tudi nekatera druga zdravila vplivajo na delovanje zdravila Piramil.

Zdravniku morate povedati če jemljete katero od naslednjih zdravil, saj le ta lahko zmanjšajo učinke zdravila Piramil:

- Zdravila za lajšanje bolečin in vnetja (npr. nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID), kot so ibuprofen ali indometacin in aspirin).
- Zdravila za zdravljenje nizkega krvnega tlaka, šoka, srčnega popuščanja, astme ali alergij, kot so efedrin, noradrenalin ali adrenalin. Zdravnik vam bo moral preverjati krvni tlak.

Zdravniku morate povedati če jemljete katero od naslednjih zdravil. Naslednja zdravila lahko povečajo možnost neželenih učinkov, če jih jemljete skupaj z zdravilom Piramil:

- Zdravila za lajšanje bolečin in vnetja (npr. nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID), kot so ibuprofen ali indometacin in aspirin).
- Zdravila za zdravljenje raka (kemoterapija).
- Zdravila za preprečitev zavrnitve organov po presaditvi, kot je ciklosporin.
- Diuretiki (tablete za odvajanje vode), kot je furosemid.
- Zdravila, ki lahko povečajo količino kalija v krvi, kot so spironolakton, triamteren, amilorid, kalijeve soli in heparin (za redčenje krvi).
- Steroidna zdravila proti vnetju, kot je prednizolon).
- alopurinol (uporablja se za zniževanje sečne kisline v krvi).
- prokainamid (za težave s srčnim ritmom).

Zdravniku morate povedati če jemljete katero od naslednjih zdravil. Zdravilo Piramil lahko vpliva na delovanje naslednjih zdravil:

- Zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni, kot so peroralna zdravila za zniževanje glukoze in insulin. Zdravilo Piramil lahko zniža krvni sladkor. Med jemanjem zdravila Piramil morate redno spremljati vaš krvni sladkor.
- Litij (za duševne motnje). Zdravilo Piramil lahko poveča količino litija v krvi. Zdravnik vam bo moral natančno spremljati količino litija.

Če karkoli od naštetega velja za vas (ali če niste prepričani), se preden vzamete zdravilo Piramil posvetujte s svojim zdravnikom.

Uporaba zdravila Piramil skupaj s hrano in pijačo

- Pitje alkoholnih pijač hkrati z jemanjem zdravila Piramil lahko povzroči omotico ali vrtoglavost. Če vas skrbi, koliko lahko med jemanjem zdravila Piramil popijete, se posvetujte z zdravnikom, saj lahko alkohol poveča učinke zdravil za zniževanje krvnega tlaka.
- Zdravilo Piramil lahko vzamete s hrano ali brez nje.

Nosečnost in dojenje

Povejte svojemu zdravniku, če mislite da ste noseči (ali nameravate zanositi). Zdravila Piramil ni dobro jemati v prvih 12 tednih nosečnosti, od 13. tedna naprej pa ga sploh ne smete jemati, ker lahko njegova uporaba med nosečnostjo škoduje otroku.

Če zanosite med zdravljenjem z zdravilom Piramil, morate to takoj povedati zdravniku. Pred načrtovano nosečnostjo je treba vnaprej opraviti prehod na ustrezno alternativno zdravljenje.

Zdravila Piramil ne smete jemati, če dojite.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Med jemanjem zdravila Piramil se lahko pojavi omotica. Verjetnost tega je večja, ko začnete jemati zdravilo Piramil ali prehodu na višjo jakost. Če se to pojavi pri vas, ne vozite ali upravljajte s stroji.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO PIRAMIL

Pri uporabi zdravila Piramil natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Jemanje tega zdravila

- Zdravilo zaužijte skozi usta vsak dan ob istem času.
- Tablete pogoltnite cele in s tekočino.
- Tablete ne smete zdrobit ali zgristi.

Koliko zdravila morate vzeti

Zdravljenje visokega krvnega tlaka

- Običajni začetni odmerek je 1,25 mg ali 2,5 mg enkrat na dan.
- Zdravnik vam bo prilagajal količino zdravila, dokler vaš krvni tlak ne bo urejen.
- Največji dnevni odmerek je 10 mg.
- Če že jemljete diuretike (tablete za odvajanje vode), vam bo zdravnik pred začetkom zdravljenja z zdravilom Piramil morda naročil, da diuretike nehate jemati, ali vam bo odmerek diuretika zmanjšal.

Za zmanjšanje tveganja za srčni infarkt in možgansko kap

- Običajni začetni odmerek je 2,5 mg enkrat na dan.
- Zdravnik se nato lahko odloči in poveča odmerek, ki ga jemljete.
- Običajen odmerek je 10 mg enkrat na dan.

Zdravljenje za zmanjšanje ali upočasnitev slabšanja težav z ledvicami

- Zdravljenje je mogoče začeti z odmerkom 1,25 mg ali 2,5 mg enkrat na dan.
- Zdravnik vam bo prilagodil odmerek, ki ga jemljete.
- Običajen odmerek je 5 mg ali 10 mg enkrat na dan.

Zdravljenje srčnega popuščanja.

- Običajen začetni odmerek je 1,25 mg enkrat na dan.
- Zdravnik vam bo prilagodil odmerek, ki ga jemljete.
- Največji dnevni odmerek je 10 mg. Priporočeno je jemanje zdravila dvakrat na dan.

Zdravljenje po srčnem infarktu

- Običajen začetni odmerek je od 1,25 mg enkrat na dan do 2,5 mg dvakrat na dan.
- Zdravnik vam bo prilagodil odmerek, ki ga jemljete.
- Običajen odmerek je 10 mg na dan. Priporočeno je jemanje zdravila dvakrat na dan.

Starejši

Zdravnik bo zmanjšal začetni odmerek in bo bolj počasi prilagajal vaše zdravljenje.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Piramil, kot bi smeli

se takoj posvetujte z zdravnikom ali pojdite v ambulanto za nujno pomoč najbližje bolnišnice. Ne vozite v bolnišnico sami, pelje naj vas nekdo drug ali pokličite reševalce. S seboj vzemite ovojnino zdravila, Tako bo zdravnik lahko vedel, kaj ste vzeli.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Piramil

- Če ste pozabili vzeti odmerek, običajen odmerek vzamite ob naslednjem predvidenem času.
- Ne vzemite dvojnega odmerka zdravila, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Piramil neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če opazite katerega od naslednjih resnih neželenih učinkov, nehajte jemati zdravilo Piramil in nemudoma pojdite k zdravniku. Morda boste potrebovali nujno zdravniško pomoč.

- Oteklost obraza, ustnic ali žrela, ki otežijo požiranje ali dihanje, kot tudi srbenje in izpuščaji. To je lahko znak hude alergijske reakcije na zdravilo Piramil.
- Med hudimi kožnimi reakcijami so izpuščaji, razjede v ustih, poslabšanje že obstoječe bolezni kože, pordelost, mehurji ali odstopanje kože (npr. Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza ali multiformni eritem).

Zdravnika morate nemudoma obvestiti, če se vam pojavijo:

- Hitrejšje bitje srca, neenakomerno ali močno bitje srca (palpitacije), bolečine v prsih, tiščanje v prsih ali resnejše težave, vključno srčnim infarktom in možgansko kapjo.
- Težko dihanje ali kašelj. To so lahko znaki težav s pljuči.
- Večja nagnjenost k podplutbam, dolgotrajnejše krvavitve kot po navadi, kakršnekoli krvavitve (npr. krvavitev iz dlesni), vijoličaste pege na koži ali večja nagnjenost k okužbam kot po navadi, vnetje žrela in zvišana telesna temperatura, utrujenost, omedlevica, omotica ali bledica. To so lahko znaki težav s kostnim mozgom.
- Huda bolečina v želodcu, ki lahko sega v hrbet. To je lahko znak pankreatitisa (vnetja trebušne slinavke).
- Zvišana telesna temperatura, mrzlica, utrujenost, izguba teka, bolečine v želodcu, siljenje na bruhanje, porumenelost kože ali očesnih beločnic (zlatenica). To so lahko znaki težav z jetri, npr. hepatitisa (vnetja jeter) ali okvare jeter.

Drugi neželeni učinki

Zdravniku ali farmacevtu morate povedati, če kateri od teh neželenih učinkov postane resen ali traja dlje kot le nekaj dni.

Pogosti (pojavi se pri manj kot 1 na 10 bolnikov):

- glavobol ali utrujenost,
- omotica

Verjetnost omotice je večja, ko začnete jemati zdravilo PIRAMIL ali začnete jemati večji odmerek.

- omedlevica, nenormalno nizek krvni tlak (hipotenzija), zlasti kadar hitro vstanete ali sedete
- suh dražeč kašelj, vnetje obnosnih votlin (sinuzitis) ali bronhitis, kratka sapa
- bolečine v želodcu ali črevesu, driska, prebavne težave, siljenje na bruhanje ali bruhanje
- izpuščaji na koži, z dvignjenim predelom ali brez njega
- bolečine v prsnem košu
- krči ali bolečine v mišicah
- krvne preiskave kažejo več kalija v krvi kot običajno

Občasni (pojavi se pri manj kot 1 na 100 bolnikov):

- težave z ravnotežjem (vrtoglavica)
- srbenje in neobičajne zaznave na koži, npr. odrevenelost, mravljinčenje, zbadanje, pekoč ali gomazeč občutek na koži (parestezije)
- izguba ali sprememba okusa
- težave s spanjem
- potrtost, tesnoba, izrazitejša živčnost kot po navadi ali nemir
- zamašen nos, težko dihanje ali poslabšanje astme
- oteklota črevesa, ki jo imenujemo "intestinalni angioedem" in se kaže s simptomi, kot so bolečine v trebuhu, bruhanje in driska
- zgaga, zaprtje ali suha usta
- odvajanje več vode (urina) čez dan kot po navadi
- močnejše znojenje kot po navadi

- izguba ali zmanjšanje teka (neješčnost)
- hitrejša ali neredno bitje srca,
- oteklost rok ali nog.

To je lahko znak, da se v telesu zadržuje več vode kot po navadi.

- zardevanje
- zamegljen vid
- bolečine v sklepih
- zvišana telesna temperatura
- impotenca pri moških, zmanjšano spolno poželenje pri moških ali ženskah
- večje število določenih belih krvnih celic (eozinofilija) na preiskavah krvi
- spremembe izvidov krvnih preiskav, ki kažejo delovanje jeter, trebušne slinavke ali ledvic

Redki (pojavi se pri manj kot 1 na 1.000 bolnikov):

- občutek tresenja ali zmedenosti
- rdeč in otekel jezik
- hudo luščenje ali lupljenje kože, srbeč in bulast izpuščaj
- težave z nohti (npr. zrahljanje ali odstopanje nohtov z nohtne posteljice)
- izpuščaj na koži ali podplutbe
- pege na koži in hladni udi
- rdeče, srbeče, otekle ali solzeče se oči
- motnje sluha ali zvonjenje v ušesih
- občutek šibkosti
- spremembe izvidov krvnih preiskav, ki kažejo zmanjšanje števila eritrocitov, levkocitov ali trombocitov ali zmanjšanje količine hemoglobina.

Zelo redki (pojavi se pri manj kot 1 na 10.000 bolnikov):

- prekomerna občutljivost na sončno svetlobo kot običajno.

Drugi opisani neželeni učinki so:

Zdravniku ali farmacevtu morate povedati, če kateri od teh neželenih učinkov postane resen ali traja dlje kot le nekaj dni.

- težave s koncentracijo
- oteklost ust
- preiskave krvi, ki kažejo premalo krvnih celic v krvi
- preiskave krvi, ki kažejo manj natrija v krvi, kot po navadi
- prsti na rokah in nogah spremenijo barvo, kadar ste na hladu, potem pa mravljinčijo ali bolijo, ko se ogrejejo (Raynaudov pojav)
- povečanje prsi pri moških
- počasno ali prizadeto reagiranje
- pekoč občutek
- spremembe vonja stvari
- izpadanje las.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA PIRAMIL

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Zdravila Piramil ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli, poleg oznake »EXP:«. Datum izteka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte v originalni ovojnini.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Piramil

Piramil 1,25 mg tablete

- Zdravilna učinkovina je ramipril. Ena 1,25 mg tableta vsebuje 1,25 mg ramiprila.
- Pomožne snovi so mikrokristalna celuloza, predgelirani (koruzni) škrob, silicijev dioksid (E551), glicinijev klorid (E640), glicerildibehenat.

Piramil 2,5 mg tablete

- Zdravilna učinkovina je ramipril. Ena 2,5 mg tableta vsebuje 2,5 mg ramiprila.
- Pomožne snovi so mikrokristalna celuloza, predgelirani (koruzni) škrob, silicijev dioksid (E551), glicinijev klorid (E640), glicerildibehenat, rumeni železov oksid (E172).

Piramil 5 mg tablete

- Zdravilna učinkovina je ramipril. Ena 5 mg tableta vsebuje 5 mg ramiprila.
- Pomožne snovi so mikrokristalna celuloza, predgelirani (koruzni) škrob, silicijev dioksid (E551), glicinijev klorid (E640), glicerildibehenat, rdeči železov oksid (E172).

Piramil 10 mg tablete

- Zdravilna učinkovina je ramipril. Ena 10 mg tableta vsebuje 10 mg ramiprila.
- Pomožne snovi so mikrokristalna celuloza, predgelirani (koruzni) škrob, silicijev dioksid (E551), glicinijev klorid (E640), glicerildibehenat.

Izgled zdravila Piramil in vsebina pakiranja

Piramil 1,25 mg tablete

- podolgovate, bele do belkaste tablete, z zarezo na obeh straneh.
- škatlice s pretisnimi omoti ali dvojnimi trakovi po

20, 28, 30, 50, 100, 250 tablet in s pretisnimi omoti z enkratnim odmerkom 100 x 1 tablet.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Piramil 2,5 mg tablete

- podolgovate, svetlo rumene melirane tablete, z zarezo na eni strani.
- škatlice s pretisnimi omoti ali dvojnimi trakovi po 10, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 250 tablet in s pretisnimi omoti z enkratnim odmerkom 100 x 1 tablet.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Piramil 5 mg tablete

- podolgovate, svetlo rožnate melirane tablete, z zarezo na eni strani.
- škatlice s pretisnimi omoti ali dvojnimi trakovi po 10, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 250 tablet in s pretisnimi omoti z enkratnim odmerkom 100 x 1 tablet.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Piramil 10 mg tablete

- podolgovate, bele do belkaste tablete, z zarezo na eni strani.
- škatlice s pretisnimi omoti ali dvojnimi trakovi po 10, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 250 tablet in s pretisnimi omoti z enkratnim odmerkom 100 x 1 tablet.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila Piramil

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, Kundl, Avstrija

Izdelovalci

Lek S.A., ul.Podlipie 16, 95-010 Strykow, Poljska

Lek S.A., ul.Domaniowska 50 C, 02-672 Varšava, Poljska

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, D-70839 Gerlingen, Nemčija

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Nemčija

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Avstrija

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavnika imetnika dovoljenja za promet z zdravilom:

Lek farmacevtska družba d.d, Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo je registrirano v naslednjih državah članicah EGP pod naslednjimi imeni:

Avstrija	Ramipril Sandoz 1,25 mg – Tabletten Ramipril Sandoz 2,5 mg – Tabletten Ramipril Sandoz 5 mg – Tabletten Ramipril Sandoz 10 mg – Tabletten
Češka	PIRAMIL 1,25 mg PIRAMIL 2,5 mg PIRAMIL 5 mg PIRAMIL 10 mg
Danska Estonija	Ramipril Sandoz Ramicor 2,5 mg Ramicor 5 mg Ramicor 10 mg
Finska	Ramipril Sandoz 1,25 tabletti Ramipril Sandoz 2,5 tabletti Ramipril Sandoz 5 tabletti Ramipril Sandoz 10 tabletti
Madžarska	Piramil 1,25 mg tableta Piramil 2.5 mg tableta Piramil 5 mg tableta Piramil 10 mg tableta
Italija Latvija	RAMIPRIL HEXAL AG 10 mg compresse Ramicor 2,5 mg tablettes Ramicor 5 mg tablettes Ramicor 10 mg tablettes
Litva	Ramicor 1,25 mg Ramicor 2,5 mg Ramicor 5 mg Ramicor 10 mg
Nizozemska	Ramipril Sandoz 1,25 mg, tabletten 1,25 mg Ramipril Sandoz 2,5 mg, tabletten 2,5 mg Ramipril Sandoz 5 mg, tabletten 5 mg Ramipril Sandoz 10 mg, tabletten 10 mg
Norveška	Ramipril sandoz tableter 1.25 mg Ramipril sandoz tableter 2.5 mg Ramipril sandoz tableter 5 mg Ramipril sandoz tableter 10 mg
Poljska	Piramil 1,25 mg Piramil 2,5 mg

	Piramil 5 mg Piramil 10 mg
Portugalska	RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg COMPRIMIDOS RAMIPRIL SANDOZ 5 mg COMPRIMIDOS RAMIPRIL SANDOZ 10 mg COMPRIMIDOS
Slovaška	Piramil 1,25 mg tables Piramil 2,5 mg tables Piramil 5 mg tables Piramil 10 mg tables
Slovenija	Piramil 1,25 mg tablete Piramil 2,5 mg tablete Piramil 5 mg tablete Piramil 10 mg tablete
Švedska	Ramipril Sandoz 1,25 mg tablett Ramipril Sandoz 2,5 mg tablett Ramipril Sandoz 5 mg tablett Ramipril Sandoz 10 mg tablett

Navodilo je bilo odobreno
17. 3. 2010