

NAVODILO ZA UPORABO

Voltaren® forte 50 mg filmsko obložene tablete

diclofenacum natricum

Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Voltaren® forte in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Voltaren® forte
3. Kako jemati zdravilo Voltaren® forte
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Voltaren® forte
6. Dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Voltaren® forte in za kaj ga uporabljamo

Lajšanje bolečin in vnetja pri različnih boleznih in bolečinskih stanjih:

- vnetne revmatične bolezni: revmatoidni artritis, spondiloartritis
- degenerativne revmatične bolezni: osteoartroza sklepov in hrbtenice
- zunajsklepni revmatizem: periartritis, tendinitis, tendosinovitis, burzitis
- akutni napadi protina
- bolečine v hrbtenici, mišične bolečine
- boleča in /ali vnetna stanja v ginekologiji (boleča menstruacija (primarna dismenoreja), vnetje jajcevodov in jajčnikov (adneksitis))
- po poškodbah
- po operacijah: ortopedskih, stomatoloških, manjših kirurških posegih

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Voltaren® forte

Ne jemljite zdravila Voltaren® forte

- če ste alergični (preobčutljivi) na diklofenak ali katerikoli sestavino zdravila Voltaren® forte;
- če ste imeli ob zdravljenju z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili kadarkoli krvavitve iz prebavil ali predrtje stene prebavil;
- če imate ali pa ste imeli v preteklosti dve ali več razjed na prebavilih ali krvavitev iz prebavil;
- v zadnjem trimesečju nosečnosti;
- če imate hudo okvaro jeter ali ledvic;
- če imate hudo srčno popuščanje;

- če ste imeli ob prejemanju podobnih zdravil (acetilsalicilna kislina in druga nesteroidna protivnetna zdravila) težave, kot so poslabšanje astme, koprivnica ali vnetje nosne sluznice (rinitis).

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Voltaren® forte

- Pri vseh nesteroidnih protivnetnih zdravilih so poročali o krvavitvah iz prebavil, razjedah in predrtjih stene prebavil, ki so lahko smrtne. Pojavijo se lahko kadarkoli med zdravljenjem, s simptomi ali brez njih ter s predhodnimi prebavnimi težavami ali brez njih. Pogostost neželenih učinkov pri zdravljenju z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, zlasti krvavitev iz prebavil in predrtja, ki so lahko smrtne, je običajno večja pri starostnikih. Če se pri vas pojavijo krvavitve iz prebavil ali razjede, je potrebno zdravljenje prekiniti.
- Pri zdravljenju z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, vključno z diklofenakom, so poročali o zelo redkih primerih resnih kožnih reakcij (nekateri so bile smrtne), vključno z ekfoliativnim dermatitisom (ekcemu podobno vnetje kože), Stevens-Johnsonovim sindromom (bolezen kože, ki se kaže s prehladu ali gripi podobnimi simptomi ter hudo izraženimi bolezenskimi spremembami na koži in sluznicah) in toksično epidermalno nekrolizo (ločitev podkožnice od podlage zaradi odmrtnosti tkiva). Kaže, da je tveganje največje ob začetku zdravljenja, reakcije pa se večinoma pojavijo prvi mesec zdravljenja. Če se pri vas pojavijo izpuščaji, razjede sluznice ali katerikoli znaki preobčutljivosti je potrebno zdravljenje z diklofenakom prekiniti.
- Tako kot pri drugih nesteroidnih protivnetnih zdravilih so tudi pri diklofenaku možne alergične reakcije, vključno s hudimi preobčutljivostnimi (anafilaktičnimi/anafilaktoidnimi) reakcijami, ki se lahko v redkih primerih pojavijo tudi ob prvem stiku z zdravilom.
- Tako kot druga nesteroidna protivnetna zdravila, lahko tudi diklofenak s svojim farmakološkim delovanjem prikrije znake in simptome okužbe.
- Diklofenak lahko zmanjša plodnost žensk, zato ni priporočljiv pri ženskah, ki želijo zanositi. Če ne morete zanositi ali če se zdravite zaradi neplodnosti, se posvetujte z zdravnikom o morebitni prekinitvi zdravljenja z diklofenakom.
- Možnost neželenih učinkov se lahko zmanjša z uporabo najmanjšega učinkovitega odmerka za najkrajše možno trajanje zdravljenja za obvladovanje (lajšanje) simptomov.
- Zaradi pomanjkanja podatkov o morebitni koristi in potencialu za seštevanje neželenih učinkov, se je potrebno izogibati sočasni uporabi diklofenaka in drugih sistemskih nesteroidnih protivnetnih zdravil, vključno s selektivnimi zaviralci ciklooksigenaze-2.
- Pri starostnikih je potrebna previdnost. Še zlasti je priporočljiva uporaba najmanjših učinkovitih odmerkov pri oslabeledih starostnikih in starostnikih z majhno telesno maso.
- Reakcije na nesteroidna protivnetna zdravila, kot so poslabšanje astme (tako imenovana intoleranca na analgetike/analgetična astma), Quinckejev edem (oteklina ob alergični reakciji) ali koprivnica, so pri bolnikih z astmo, sezonskim alergijskim rinitisom, oteklo nosno sluznico (nosnimi polipi), kronično obstruktivno pljučno boleznijo ali

kroničnimi okužbami dihal (še posebej, če so povezane z alergijskimi simptomi, podobnimi rinitisu) pogostejše kot običajno. Pri omenjenih bolnikih je zato potrebna posebna previdnost (pripravljenost na takojšnje ukrepanje). Enako velja tudi za bolnike, ki so alergični na druge snovi, npr. bolniki s kožnimi reakcijami, srbečico in koprivnico.

- Tako kot pri drugih nesteroidnih protivnetnih zdravilih, je tudi pri diklofenaku potrebna posebna previdnost in skrbno spremljanje pri bolnikih s prebavnimi težavami, ali bolnikih, ki so imeli v preteklosti razjede želodca in črevesja, krvavitve ali predrtje stene prebavil. Tveganje za krvavitve iz prebavil je večje pri velikih odmerkih nesteroidnih protivnetnih zdravil, pri bolnikih s predhodnimi razjedami (še zlasti ob pridruženih krvavitvi ali predrtju stene prebavil) in pri starostnikih.
- Pri omenjenih bolnikih in bolnikih, ki potrebujejo zdravljenje z majhnimi odmerki acetilsalicilne kisline ali drugimi zdravili, ki lahko zvečajo tveganje za zaplete na prebavilih, je potrebno razmisliti o sočasnem zdravljenju z zdravili, ki ščitijo sluznico prebavil (zaviralci protonske črpalke ali misoprostol). Posvetujte se z zdravnikom.
- O pojavu katerihkoli nenavadnih prebavnih težav (zlasti krvavitev iz prebavil) morate obvestiti zdravnika.
- Previdnost je potrebna pri bolnikih z ulceroznim kolitisom ali Crohnovo boleznijo (vnetni črevesni bolezni), saj lahko zdravljenje z diklofenakom poslabša obstoječo bolezen.
- Zdravila kot je Voltaren[®] forte so lahko povezana z majhnim povečanjem tveganja srčne kapi (miokardnega infarkta) ali možganske kapi. Večja verjetnost morebitnega tveganja je pri visokih odmerkih in dolgotrajnem zdravljenju. Ne prekoračite priporočenega odmerka ali trajanja zdravljenja. Če imate težave s srcem ali ste preboleli možgansko kap ali menite, da za vas obstaja morebitno tveganje za nastanek takih dogodkov (na primer, če imate visok krvni tlak, sladkorno bolezen ali visok holesterol ali ste kadilec), se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Diklofenak lahko poslabša okvaro jeter, zato je potrebno bolnike z okvaro jeter skrbno spremljati. Tako kot pri drugih nesteroidnih protivnetnih zdravilih, se lahko tudi pri diklofenaku zvečajo vrednosti enega ali več jetrnih testov. Pri daljšem zdravljenju z diklofenakom je potrebno redno spremljanje delovanja jeter. Če so vrednosti jetrnih testov dalj časa nenormalne ali se še poslabšajo, če se pojavijo znaki in simptomi bolezni jeter ali če se pojavijo druge težave, je potrebno zdravljenje z diklofenakom prekiniti. Vnetje jetrnega tkiva (hepatitis) se lahko pojavi tudi brez predhodnih simptomov.
- Previdnost je potrebna pri bolnikih s hepatično porfirijo (dedna hepatična porfirija, ki se kaže s ponavljajočimi se napadi bolečin v trebuhu, krvavitami v želodcu ali črevesju, nevrološkim motnjami in zvečano količino *delta*-aminolevulinske kisline v urinu), saj lahko diklofenak sproži napad.
- Pri zdravljenju z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, vključno z diklofenakom, so poročali o zadrževanju tekočine in oteklinah. Posebna previdnost je potrebna pri bolnikih z okvaro ledvic, boleznimi srca, visokim krvnim tlakom, starostnikih, bolnikih, ki prejemajo diuretike

(zdravila za izločanje vode) ali zdravila, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje ledvic, in bolnikov s pomembnimi motnjami volumna zunajceličnih tekočin kateregakoli vzroka (npr. pred ali po večjem kirurškem posegu). Kot previdnostni ukrep je potrebnospremljanje delovanja ledvic.

- Ob dlje časa trajajočem zdravljenju je, tako kot pri drugih nesteroidnih protivnetnih zdravilih, potrebno spremljanje krvne slike.
- Tako kot druga nesteroidna protivnetna zdravila, lahko tudi zdravilo Voltaren® začasno zavre zlepljenje trombocitov (krvnih ploščic). Bolnike z motnjami strjevanja krvi je potrebno skrbno spremljati.
- Odmerki za otroke so manjši od odmerkov za odrasle. Odmerek bo določil zdravnik glede na otrokovo starost in telesno težo. Za zdravljenje otrok mlajših od 14 let zdravilo Voltaren® forte ni primerno.

Jemanje drugih zdravil

Če jemljete katerokoli od naštetih zdravil, se posvetujte z zdravnikom:

- *litij (zdravilo za zdravljenje bipolarnе motnje):* Diklofenak lahko ob sočasni uporabi zveča koncentracije litija v krvi, zato je potrebno spremljanje koncentracije litija v krvi.
- *digoksin (zdravilo za zdravljenje bolezni srca):* Diklofenak lahko ob sočasni uporabi zveča koncentracije digoksina v krvi, zato je potrebno spremljanje koncentracije digoksina v krvi.
- *diuretiki in antihipertenzivi (zdravila za izločanje vode iz telesa ter zdravljenje visokega krvnega tlaka):* Diklofenak lahko (tako kot druga nesteroidna protivnetna zdravila) zmanjša učinek diuretikov ali drugih antihipertenzivov (npr. adrenergičnih zaviralcev beta, zaviralcev angiotenzin-konvertaze). Ob sočasnem zdravljenju je zato potrebna previdnost.
- Sočasno zdravljenje z *zdravili, ki zadržujejo kalij v telesu*, je lahko povezano z zvečanimi koncentracijami kalija v krvi, zato je v takem primeru potrebno pogosto spremljanje koncentracij kalija v krvi.
- *Druga nesteroidna protivnetna zdravila in kortikosteroidi:* Sočasno zdravljenje z drugimi sistemskimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili ali kortikosteroidi lahko zveča pogostost neželenih učinkov na prebavilih.
- *Antikoagulantni in antitrombotiki (zdravila za preprečevanje strjevanja krvi):* Sočasno zdravljenje lahko zveča tveganje za krvavitve iz prebavil, zato je potrebna previdnost.
- *Selektivni zaviralci ponovnega privzema serotonina (zdravila za zdravljenje depresije - SSRI):* Sočasna uporaba sistemskih nesteroidnih protivnetnih zdravil, vključno z diklofenakom, in SSRI lahko zveča tveganje za krvavitve iz prebavil.
- *Antidiabetiki (zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni):* Ob sočasnem zdravljenju je kot previdnostni ukrep potrebno spremljanje ravni sladkorja v krvi.
- *Metotreksat (zdravilo za zdravljenje rakavih obolenj in revmatskih bolezni):* Ob dajanju nesteroidnih protivnetnih zdravil, vključno z diklofenakom, manj kot 24 ur pred zdravljenjem z metotreksatom ali 24

ur po njem je potrebna previdnost, saj se lahko zvečajo koncentracije metotreksata v krvi.

- *Ciklosporin (zdravilo za zaviranje imunskega sistema):* Diklofenak lahko okrepi toksičnost ciklosporina za ledvice.
- *Kinoloni (vrsta antibiotikov):* Obstajajo možnost pojava epileptičnih (božjastnih) napadov ob sočasni uporabi kinolonov in nesteroidnih protivnetnih zdravil.

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Jemanje zdravila Voltaren® forte skupaj s hrano in pijačo

Zdravilo Voltaren® forte zaužijte s kozarcem vode pred jedjo. Tablet ne smete lomiti ali žvečiti.

Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Uporabe diklofenaka pri nosečnicah niso proučevali. Diklofenak se zato ne sme uporabljati v prvih dveh trimesečjih nosečnosti, razen če koristi zdravljenja matere odtehtajo morebitno tveganje za plod. Uporaba v zadnjem trimesečju je zaradi možnosti zmanjšane krčljivosti maternice in/ali prezgodnjega zaprtja arterioznega duktusa prepovedana.

Dojenje

Diklofenak se v majhnih količinah izloča z materinim mlekom. Zdravila se zato med dojenjem ne sme uporabljati.

Plodnost

Diklofenak lahko, tako kot druga nesteroidna protivnetna zdravila, zmanjša plodnost žensk in ni priporočljiv pri ženskah, ki želijo zanositi. Pri ženskah, ki ne morejo zanositi, in ženskah, ki se zdravijo zaradi neplodnosti, je potrebno razmisliti o morebitni prekinitvi zdravljenja z diklofenakom.

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom preden vzamete katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in s strojev

Zdravilo Voltaren® forte lahko vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev. Če se pri vas pojavijo omotica, vrtoglavica, motnje vida, zaspanost ali drugi učinki na osrednje živčevje, ne smete voziti ali upravljati strojev.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Voltaren® forte

Zdravilo Voltaren® forte vsebuje laktozo. Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. Kako jemati zdravilo Voltaren® forte

Pri jemanju zdravila Voltaren® forte natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Odmerjanje in način uporabe

Zdravilo Voltaren® forte zaužijte s kozarcem vode, najbolje pred jedjo. Tablet ne smete lomiti ali žvečiti.

Odrasli

Priporočeni začetni odmerek je 100 do 150 mg dnevno. Pri blagih obolenjih in pri dolgotrajnem zdravljenju običajno zadoščajo odmerki od 75 do 100 mg dnevno.

Celokopni dnevni odmerek je potrebno razdeliti na 2 ali 3 odmerke. Za lajšanje nočnih bolečin in jutranje okorelosti se lahko zdravljenju s tabletami preko dneva dodajo svečke pred spanjem (do celokupnega dnevnega odmerka 150 mg).

Odmerek za bolnice s primarno dismenorejo je potrebno določiti individualno. Običajni odmerek je od 50 do 150 mg dnevno. Zdravljenje se prične z začetnimi odmerki od 50 do 100 mg. Če je potrebno, se lahko odmerek preko več menstruacijskih ciklusov zveča do največjega odmerka 200 mg dnevno. Zdravljenje se prične ob pojavu prvih simptomov in traja nekaj dni (odvisno od simptomov).

Otroci in mladostniki

Zdravilo Voltaren® forte zaradi se svoje jakosti ne priporoča za zdravljenje otrok in mladostnikov, mlajših od 14 let. Pri teh bolnikih se lahko uporabi Voltaren® 12,5 mg svečke in Voltaren® 25 mg svečke.

Starostniki

Pri uporabi nesteroidnih protivnetnih zdravil je potrebna previdnost, saj so starostniki bolj nagnjeni k pojavu neželenih učinkov. Uporaba najmanjših učinkovitih odmerkov je še zlasti na mestu pri oslabeledih starostnikih in starostnikih z majhno telesno maso.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Voltaren® forte, kot bi smeli

Značilnih znakov prevelikega odmerjanja ni. Pojavijo se lahko bruhanje, krvavitve iz prebavil, driska, omotica, šumenje v ušesih ali epileptični napadi. Pri hudi zastrupitvi je možna akutna odpoved ledvic in okvara jeter.

Če ste vzeli prevelik odmerek zdravila, zaužijte aktivno oglje ali poskusite izzvati bruhanje in nemudoma pokličite nujno medicinsko pomoč. Če je bolnik nezavesten, mu ne dajajte zdravil ali pijač. Bolnika obrnite v položaj za nezavestne in nemudoma pokličite nujno medicinsko pomoč.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Voltaren® forte

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjega.

Če ste pozabili vzeti zdravilo, vzemite naslednji odmerek kot ponavadi.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Voltaren® forte neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Pogostnost neželenih učinkov je opredeljena takole:

Zelo pogosti	pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov
--------------	--

Pogosti	pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov
Občasni	pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov
Redki	pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov
Zelo redki	pojavi se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov
Neznana pogostnost	pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

Najpogosteje opaženi neželeni učinki na prebavilih. Pojavijo se lahko peptične razjede, predrtje stene prebavil ali krvavitve iz prebavil, včasih smrtne, še zlasti pri starostnikih. Poročali so tudi o slabosti, bruhanju, driski, vetrovih, zaprtju, prebavnih težavah po obroku (dispepsiji), bolečini v trebuhu, temnem blatu, bruhanju krvi, vnetju ustne sluznice (ulceroznem stomatitisu), strikturah ter poslabšanju kolitisa in Crohnove bolezni (vnetne črevesne bolezni) (glejte poglavje 4.4). Redkeje so zabeležili vnetje trebušne sluznice (gastritis).

Pogosti: glavobol, omotica, vrtoglavica, slabost, bruhanje, driska, prebavne težave po obroku (dispepsija), bolečine v trebuhu, vetrovi, pomanjkanje ali izguba apetita (anoreksija), izpuščaji, spremenjeni jetrni testi (zvečane ravni transaminaz).

Redki: zaspanost, utrujenost, astma (vključno s težkim dihanjem), vnetje želodčne sluznice (gastritis), krvavitve iz prebavil, bruhanje krvi iz želodca ali požiralnika (hematemeza), krvava driska, temno blato, razjede želodca ali črevesja (s krvavitvijo ali brez nje ali s predrtjem stene prebavil), vnetje zadnjika (proktitis), koprivnica, oteklina, preobčutljivost, anafilaktične in anafilaktoidne reakcije (vključno z nizkim krvnim tlakom in šokom), vnetje jeter (hepatitis) z zlatenico ali brez nje, okvara jeter.

Zelo redki; neznana pogostnost: neprijetni občutki ob pospešenem bitju srca (palpitacije), bolečine v prsih, odpoved srca, srčni infarkt, spremembe krvne slike (trombocitopenija, levkopenija, anemija (vključno s hemolitično in aplastično anemijo), agranulocitoza), mravljinčenje, motnje spomina; krči, ki se kažejo s hudim tresenjem dela telesa ali celega telesa (konvulzije); tesnoba, tresenje mišic, udov in drugih delov telesa (tremor); aseptični meningitis, motnje okusa, možganskožilni dogodki, motnje vida, zamegljen vid, dvojni vid, šumenje v ušesih, poslabšanje sluha, pljučnica, vnetje črevesa (kolitis - vključno s hemoragičnim kolitisom in poslabšanjem ulceroznega kolitisa ali Crohnove bolezni), zaprtje, vnetje ustne sluznice, vnetje jezika, motnje požiralnika, diafragmi podobne zožitve v prebavilih, vnetje trebušne slinavke, poslabšanje hemoroidov, akutna odpoved ledvic, kri v urinu, beljakovine v urinu, bolezni ledvic (nefrotski sindrom, intersticijski nefritis, renalna papilarna nekroza), mehurjasti izpuščaji, ekcem, rdečina, eksudativni multiformni eritem, Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza (Lyellova bolezen), ekfoliativni dermatitis, izpadanje las, preobčutljivost na svetlobo, krvavitve v kožo in podkožje (purpura, alergična purpura), srbečica, visok krvni tlak, vnetje žil, angionevrotični edem (lokalna oteklina, ki izgine v 24 urah, vključno z oteklino obraza), vnetje jeter (fulminantni hepatitis), dezorientacija, depresija, nespečnost, nočne more, razdražljivost, psihotične motnje.

Zdravila kot je Voltaren® forte so lahko povezana z majhnim povečanjem tveganja srčne kapi (miokardnega infarkta) ali možganske kapi.

Če se pojavi alergijska reakcija na zdravilo, se kaže kot otekanje obraza, ustnic, grla in jezika. To lahko povzroči težave pri dihanju ali požiranju. V takem primeru takoj prenehajte jemati zdravilo in nemudoma obiščite zdravnika.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. Shranjevanje zdravila Voltaren® forte

ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM!

Zdravila Voltaren® forte ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojniku. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Voltaren® forte

Zdravilna učinkovina je natrijev diklofenakat.

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 50 mg natrijevega diklofenakata.

Pomožne snovi so:

jedro tablete:

brezvodni koloidni silicijev dioksid (E551)

mikrokristalna celuloza (E460)

laktoza monohidrat

magnezijev stearat (E572)

koruzni škrob

povidon

natrijev karboksimetilškrob (vrsta A)

obloga tablete:

hipromeloza (E464)

polisorbat 80 (E433)

železovi oksidi in hidroksidi (E172)

smuvec (E553b)

titanov dioksid (E171)

kopolimer metakrilne kisline in etilakrilata (1:1)

makrogol 6000

simetikon

Izgled zdravila Voltaren® forte in vsebina pakiranja

Voltaren® forte 50 mg filmsko obložene tablete so rjave, zaobljene, bikonveksne filmsko obložene tablete.

Škatla z 20 filmsko obloženimi tabletami (2 x 10 filmsko obloženih tablet v pretisnem omotu).

Način in režim izdaje zdravila Voltaren® forte
Predpisovaneje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Pliva Ljubljana d.o.o.,
Pot k sejmišču 35,
1231 Ljubljana Črnuče

Izdelovalec

Pliva Ljubljana d.o.o., Pot k sejmišču 35, 1231 Ljubljana, Slovenija
Pliva Krakow S.A., 80 Mogilska Str., 31 546 Krakow, Poljska

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom:

Pliva Ljubljana d.o.o.
Pot k sejmišču 35
SI-1231 Ljubljana Črnuče
Tel.:00 386 1 58 90 390

Navodilo je bilo odobreno 11.12.2009