

NAVODILO ZA UPORABO: INFORMACIJE ZA BOLNIKA**Esomeprazol Mylan 20 mg gastrorezistentne tablete**
Esomeprazol Mylan 40 mg gastrorezistentne tablete
esomeprazol

Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

Kaj je v navodilu:

1. Kaj je zdravilo **Esomeprazol Mylan** in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo **Esomeprazol Mylan**
3. Kako jemati zdravilo **Esomeprazol Mylan**
4. Možni neželeni učinki
5. Kako shranjevati zdravilo **Esomeprazol Mylan**
6. Vsebina pakiranja in ostale informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO **ESOMEPRAZOL MYLAN IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO**

Zdravilo **Esomeprazol Mylan** vsebuje zdravilno učinkovino, ki se imenuje esomeprazol. Spada med zdravila, ki jih imenujemo "zaviralci protonske črpalke". Ta zdravila zmanjšujejo nastajanje kisline v želodcu.

Zdravilo **Esomeprazol Mylan** se uporablja za zdravljenje naslednjih bolezni:

Odrasli in mladostniki, stari 12 let in več

- "Gastroezofagealno refluksno bolezen" (GERB), ki nastane zaradi vračanja želodčne kisline v požiralnik (del prebavne cevi, ki povezuje žrelo in želodec) in povzroča bolečino, vnetje in zgago.
- razjed na želodcu ali zgornjem delu črevesa, okuženih z bakterijo *Helicobacter pylori*. Če imate to bolezen, vam bo zdravnik za ozdravitev okužbe in zaceljenje razjed predpisal tudi antibiotike.

Odrasli

- razjed na želodcu, ki so posledica zdravljenja z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili (NSAR). Zdravilo **Esomeprazol Mylan** je mogoče uporabiti tudi za preprečitev nastajanja razjed na želodcu, če jemljete nesteroidna protivnetna zdravila.
- čezmernega izločanja želodčne kisline zaradi novotvorb v trebušni slinavki (Zollinger-Ellisonov sindrom).
- preprečevanje ponovne krvavitve želodčne razjede po zdravljenju z esomeprazolom v parenteralni obliki.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO **ESOMEPRAZOL MYLAN****Ne jemljite zdravila **Esomeprazol Mylan**:**

- če ste alergični na esomeprazol ali katerokoli sestavino zdravila tega zdravila (navedene v poglavju 6),
- če ste alergični na druge zaviralce protonske črpalke (npr. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol),
- če jemljete zdravilo, ki vsebuje nelfinavir (za zdravljenje okužbe z virusom HIV).

Ne jemljite zdravila **Esomeprazol Mylan**, če kaj od navedenega velja za vas. Če ste negotovi, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete zdravilo **Esomeprazol Mylan**.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Preden vzamete zdravilo **Esomeprazol Mylan**, se morate posvetovati s svojim zdravnikom ali farmacevtom:

- če imate hude težave z jetri,
- če imate hude težave z ledvicami,
- če imate zmanjšane telesne zaloge ali prisotne dejavnike tveganja za zmanjšano absorpcijo vitamina B₁₂ in se dlje časa zdravite z zdravilom **Esomeprazol Mylan**. Tako kot vsa druga zdravila, ki zavirajo izločanje kisline, lahko tudi **Esomeprazol Mylan** zmanjšuje absorpcijo vitamina B₁₂.

Zdravilo **Esomeprazol Mylan** lahko prikrije simptome drugih bolezni. **Zato se morate nemudoma posvetovati z zdravnikom, če se vam pred začetkom jemanja zdravila **Esomeprazol Mylan** ali med njegovo uporabo pojavi kaj od naslednjega:**

- brez razloga močno hujšate in imate težave s požiranjem.
- se vam pojavijo bolečine v želodcu ali težave z želodcem.
- začnete bruhati hrano ali kri.
- odvajate črno (ali krvavo) blato.

Če vam je zdravnik predpisal zdravilo **Esomeprazol Mylan** za jemanje »po potrebi«, se morate z njim posvetovati, če simptomi ne izzvenijo ali se spremenijo.

Druga zdravila in zdravilo **Esomeprazol Mylan**

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali, oziroma bi lahko jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta. Zdravilo **Esomeprazol Mylan** namreč lahko vpliva na delovanje nekaterih drugih zdravil in nekatera druga zdravila lahko vplivajo na zdravilo **Esomeprazol Mylan**.

Ne jemljite zdravila **Esomeprazol Mylan**, če jemljete zdravilo, ki vsebuje nelfinavir (za zdravljenje okužbe z virusom HIV).

Svojemu zdravniku ali farmacevtu morate povedati, če jemljete katero od naslednjih zdravil:

- atazanavir (za zdravljenje okužbe z virusom HIV)
- ketokonazol, itrakonazol ali vorikonazol (za zdravljenje glivičnih okužb)
- citalopram, imipramin ali klomipramin (za zdravljenje depresije)
- diazepam (za zdravljenje tesnobe, za sproščanje mišic ali pri epilepsiji)
- fenitoin (pri epilepsiji). Če jemljete fenitoin, vas bo moral zdravnik ob začetku ali koncu zdravljenja z zdravilom **Esomeprazol Mylan**, nadzorovati.
- zdravila za redčenje krvi, npr. varfarin. Če jemljete varfarin vas bo moral zdravnik ob začetku ali koncu zdravljenja z zdravilom **Esomeprazol Mylan**, nadzorovati.
- cilostazol (za zdravljenje intermitentne klavdikacije – bolečine v nogah ob gibanju zaradi nezadostne preskrbe nog s krvjo).
- cisaprid (uporablja se za zdravljenje težav z želodcem in zgage).
- klopidoogrel (za preprečevanje nastanka krvnih strdkov - trombov)
- digoksin (za zdravljenje težav s srcem).
- metotreksat (kemoterapevtik, ki se v visokih odmerkih uporablja za zdravljenje raka) – če jemljete metotreksat v visokih odmerkih, vam bo zdravnik morda začasno ukinitel zdravljenje z zdravilom **Esomeprazol Mylan**.
- rifampicin (uporablja se za zdravljenje tuberkuloze).
- šentjanževka (*Hypericum perforatum*) (uporablja se za zdravljenje depresije).

Če vam je zdravnik poleg zdravila **Esomeprazol Mylan** za zdravljenje razjed, ki jih povzroča okužba z bakterijo *Helicobacter pylori*, predpisal tudi antibiotika amoksicilin in klaritromicin, je zelo pomembno, da mu poveste za vsa druga zdravila, ki jih jemljete.

Zdravilo **Esomeprazol Mylan** skupaj s hrano in pijačo

Tablete lahko vzamete s hrano ali na prazen želodec.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, domnevate, da ste zanosili ali nosečnost načrtujete, to pred začetkom jemanja zdravila **Esomeprazol Mylan** povejte svojemu zdravniku ali farmacevtu. Vaš zdravnik bo odločil, ali lahko v tem obdobju jemljete zdravilo **Esomeprazol Mylan**.

Ni znano, ali zdravilo **Esomeprazol Mylan** prehaja v materino mleko, zato ga ne smete jemati, če dojite.

Sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni verjetno, da bi zdravilo **Esomeprazol Mylan** vplivalo na vašo sposobnost vožnje ali upravljanja z orodji in s stroji.

Esomeprazol Mylan vsebuje saharozo

Če vam je zdravnik povedal, da imate netoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO ESOMEPRAZOL MYLAN

Pri jemanju zdravila **Esomeprazol Mylan** natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

- Zdravilo **Esomeprazol Mylan** ni priporočljivo za otroke, mlajše od 12 let.
- Če to zdravilo jemljete dolgo časa, bo zdravnik nadziral vaše zdravljenje (zlasti če zdravilo jemljete več kot eno leto).
- Če vam je zdravnik naročil, da to zdravilo vzamete po potrebi, mu morate povedati, če se vam simptomi spremenijo.

Jemanje tega zdravila

- Tablete lahko vzamete kadarkoli tekom dneva.
- Tablete lahko vzamete s hrano ali na prazen želodec.
- Tablete zaužijte cele z nekaj vode. Ne žvečite jih in ne drobite; vsebujejo namreč obložena zrnca, ki preprečijo, da bi kislina v želodcu razgradila zdravilo. Pomembno je, da zrnca ne poškodujete.

Kaj storiti, če imate težave s požiranjem tablet

- Če imate težave s požiranjem tablet:
 - Tableto raztopite v kozarcu navadne (negazirane) vode. Ne uporabljajte nobenih drugih tekočin.
 - Mešajte dokler tableta ne razpade (mešanica ne bo bistra). Mešanico popijte takoj ali najkasneje v 30 minutah. Vedno premešajte mešanico, tik preden jo popijete.
 - Da bi se prepričali, da ste zaužili cel odmerek zdravila, zelo dobro sperite kozarec s pol kozarca vode, premešajte in jo prav tako popijte. Trdni delci vsebujejo zdravilo – ne smete jih žvečiti ali zdrobiti.
- Če ne morete požirati, lahko tableto raztopite in zmešate v nekaj vode ter daste v brizgo. Tako se lahko zdravilo da po cevki ("gastrični sondi") neposredno v želodec.

Koliko zdravila jemati

- Vaš zdravnik vam bo povedal, koliko tablet morate jemati in koliko časa. Odmerek in trajanje jemanja bosta odvisna od vaše bolezni, starosti in delovanja jeter.
- Spodaj so napisani priporočeni odmerki.

Zdravljenje zgage zaradi gastroezofagealne refluksne bolezni (GERB):

Odrasli in otroci, stari 12 let in več:

- Če je vaš zdravnik ugotovil, da imate poškodovan požiralnik, je priporočeni odmerek ena tableta zdravila **Esomeprazol Mylan** 40 mg enkrat na dan 4 tedne. Vaš zdravnik vam bo morda svetoval enak odmerek za nadaljnje 4 tedne, če se požiralnik še ni pozdravil.
- Ko se požiralnik pozdravi, je priporočeni odmerek ena tableta zdravila **Esomeprazol Mylan** 20 mg enkrat na dan.
- Če požiralnik ni poškodovan, je priporočeni odmerek ena tableta zdravila **Esomeprazol Mylan** 20 mg enkrat na dan. Po izboljšanju stanja vam bo zdravnik morda svetoval, da jemljete zdravilo, ko ga potrebujete, a največ eno tableto zdravila **Esomeprazol Mylan** 20 mg enkrat na dan.
- Če imate hujšo bolezen jeter, vam lahko vaš zdravnik predpiše manjši odmerek.

Zdravljenje razjed zaradi okužbe z *H. pylori* in preprečevanje ponovitve:

- Odrasli in mladostniki, stari 12 let ali več: priporočeni odmerek je ena tableta zdravila **Esomeprazol Mylan** 20 mg dvakrat na dan en teden.
- Vaš zdravnik vam bo predpisal tudi antibiotika amoksicilin in klaritromicin.

Zdravljenje razjed na želodcu, ki so posledica zdravljenja z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili (NSAR):

- Odrasli, stari 18 let in več: priporočeni odmerek je ena tableta zdravila **Esomeprazol Mylan** 20 mg enkrat na dan od 4 do 8 tednov.

Preprečevanje razjed na želodcu, če jemljete nesteroidna protivnetna zdravila:

- Odrasli, stari 18 let in več: priporočeni odmerek je ena tableta zdravila **Esomeprazol Mylan** 20 mg enkrat na dan.

Zdravljenje čezmernega izločanja želodčne kisline zaradi novotvorb v trebušni slinavki (Zollinger-Ellisonov sindrom):

- Odrasli, stari 18 let in več: priporočeni odmerek je ena tableta zdravila **Esomeprazol Mylan** 40 mg dvakrat na dan.
- Zdravnik vam bo odmerek prilagodil glede na vaše potrebe in bo tudi odločil, koliko časa morate jemati zdravilo. Največji odmerek je 80 mg dvakrat na dan.

Podaljšano zdravljenje z esomeprazolom z namenom preprečevanja ponovne krvavitve iz razjed po intravenskem zdravljenju:

- Odrasli, stari 18 let in več: priporočeni odmerek je ena tableta zdravila **Esomeprazol Mylan** 40 mg enkrat na dan 4 tedne.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila **Esomeprazol Mylan, kot bi smeli**

Če ste vzeli več zdravila **Esomeprazol Mylan**, kot vam ga je predpisal zdravnik, se nemudoma posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če ste pozabili vzeti zdravilo **Esomeprazol Mylan**

- Če pozabite vzeti odmerek, ga vzemite, takoj, ko se spomnite. Če pa je že skoraj čas za naslednji odmerek, preskočite pozabljeni odmerek.
- Ne vzemite dvojnega odmerka (dveh odmerkov hkrati), če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo **Esomeprazol Mylan** neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če opazite kateregakoli izmed naslednjih neželenih učinkov, nemudoma prenehajte jemati zdravilo **Esomeprazol Mylan in se posvetujte z zdravnikom:**

- nenadno zasoplost, otekanje ustnic, jezika in žrela ali telesa, izpuščaj, omedlevico ali težave s požiranjem (huda alergijska reakcija);
- pordelost kože z mehurji ali luščenjem. Pojavijo se lahko tudi hude kožne reakcije z mehurji in krvavitvami na ustnicah, očeh, ustih, nosu in spolovilih. To sta lahko "Stevens-Johnsonov sindrom" ali "toksična epidermalna nekroliza".
- rumeno obarvanje kože, temen urin in utrujenost so lahko simptomi težav z jetri.

Ti učinki so redki in se lahko pojavijo manj kot 1 od 1.000 bolnikov.

Jemanje zaviralcev protonске črpalke, kot je zdravilo **Esomeprezol Mylan**, posebno, če je jemanje daljše od enega leta, lahko blago poveča tveganje za zlome kolka, zapestja ali hrbtenice. Svojega zdravnika obvestite, če imate osteoporozo ali jemljete kortikosteroide (lahko povečajo tveganje za osteoporozo).

Drugi neželeni učinki so:

Pogosti (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov)

- glavobol
- težave z želodcem ali črevesjem, driska, bolečine v trebuhu, zaprtje, vetrovi (flatulenca)
- občutek slabosti (navzea), slabost (bruhanje)

Občasni (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov)

- otekanje stopal in gležnjev
- težave pri spanju (nespečnost)
- omotica, občutek mravljinčenja, zaspanost
- vrtoglavica (vertigo)
- suha usta
- spremembe izvidov preiskav krvi, s katerimi se ugotavlja delovanje jeter
- kožni izpuščaji, bulast izpuščaji (koprivnica), srbečica
- zlomi kolka, zapestja ali hrbtenice (če se Esomeprazol Mylan uporablja v večjih odmerkih in dalj časa).

Redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov)

- krvne spremembe, kot sta zmanjšanje števila belih krvnih celic ali zmanjšanje števila krvnih ploščic; lahko povzročajo utrujenost, modrice ali povečajo možnost okužb
- znižane ravni natrija v krvi; lahko povzroči oslabelost, bruhanje ali krče
- razdražljivost, zmedenost, depresija
- motnje okusa
- težave z vidom, npr. zamegljen vid
- nenaden pojav piskajočega ali težkega dihanja (bronhospazem)
- vnetje v ustih
- okužba, imenovana "gobice": povzročajo jo glivice in lahko prizadene črevo
- težave z jetri, vključno z zlatenico, ki lahko povzročijo porumenelost kože, temen urin in utrujenost
- izpadanje las (alopecija)
- kožni izpuščaji po izpostavljenosti soncu
- bolečine v sklepih (artralgija) ali mišicah (mialgija)
- splošno slabo počutje in pomanjkanje energije
- povečano znojenje

Zelo redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov)

- spremembe krvne slike, vključno z agranulocitozo (pomanjkanje belih krvnih celic)
- agresivnost
- videnje, občutenje ali slišanje stvari, ki jih ni (halucinacije)
- hude težave z jetri, ki vodijo do odpovedi jeter in vnetja možganov
- nenaden pojav hudega izpuščaja, mehurjev na koži ali luščenja kože. Spremljajo jih lahko močno povišana telesna temperatura in bolečine v sklepih (multiformni eritem, Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza)
- šibkost mišic
- hude težave z ledvicami
- povečanje prsi pri moških

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče določiti)

- vnetje črevesa (vodi v drisko)
- če jemljete zdravilo **Esomeprazol Mylan** več kot tri mesece, se lahko znižajo vrednosti magnezija v vaši krvi. Nizke vrednosti magnezija v krvi lahko prepoznamo po naslednjih simptomih: utrujenost, nehoteno krčenje mišic, izguba orientacije, krči, omotica, pospešeno bitje srca. Če opazite katerega od

naštetih simptomov, o tem nemudoma obvestite svojega zdravnika. Nizke vrednosti magnezija v krvi lahko vodijo do zmanjšanih vrednosti kalija ali kalcija v krvi. Vaš zdravnik se bo morda odločil za redno izvajanje krvnih testov, da bi preveril vrednosti magnezija v vaši krvi.

Zdravilo **Esomeprazol Mylan** lahko zelo redko povzroči zmanjšanje števila belih krvnih celic, kar oslabi imunski sistem. Če imate okužbo z vročino in **hudim** poslabšanjem splošnega počutja ali povišano telesno temperaturo z znaki lokalne okužbe, ki se kažejo z bolečinami v vratu, žrelu ali ustih ali kot težave pri uriniranju, se morate nemudoma posvetovati z zdravnikom, ki bo naredil preiskave krvi, da bi izključil možnost pomanjkanja belih krvnih celic (agranulocitoze). Pomembno je, da tedaj poveste, katera zdravila jemljete.

Naj vam seznam možnih neželenih učinkov ne vzbuja skrbi. Morda se pri vas ne bo pojavil nobeden od njih. Če opazite katerikoli neželeni učinek, oziroma neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika, farmacevta ali medicinsko sestro.

5. KAKO SHRANJEVATI ZDRAVILO **ESOMEPRAZOL MYLAN**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki plastenke, škatli ali pretisnem omotu, za oznako "Uporabno do". Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjске odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. VSEBINA PAKIRANJA IN OSTALE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo **Esomeprazol Mylan**

Zdravilna učinkovina je esomeprazol. Ena gastrorezistentna tableta vsebuje 20 mg ali 40 mg esomeprazola (v obliki magnezijevega esomeprazolata).

Pomožne snovi so:

- Jedro tablete: sladkorne kroglice (vsebujejo saharozo in koruzni škrob), krospovidon (tip B) (E1202), hidroksoipropilceluloza (E463), natrijev lavrilsulfat
- Podobloga 1: manitol (E421)
- Podobloga 2: povidon (E1202), smukec (E553b), makrogol 6000
- Gastrorezistentna obloga: 30 % disperzija kopolimera metakrilne kisline in etilakrilata, (1 : 1), trietilcitrata (E1505), glicerilmonostearat (E471), polisorbat 80 (E433), smukec (E553b), titanov dioksid (E171)
- Lubrikant: smukec (E553b)
- Mešanje in stiskanje: mikrokristalna celuloza (E460), manitol (E421), krospovidon (tip A) (E1202), makrogol 6000, natrijev stearilfumarat.
- Samo za jakost 20 mg: rožnati Opadry, sestavljen iz: hipromeloze (E464), titanovega dioksida (E171), makrogola 400, natrijevega lavrilsulfata, rdečega železovega oksida (E172), rumenega železovega oksida (E172), črnega železovega oksida (E172)
- Samo za jakost 40 mg: rjavi Opadry, sestavljen iz: hipromeloze (E464), titanovega dioksida (E171), makrogola 400, natrijevega lavrilsulfata, rdečega železovega oksida (E172), rumenega železovega oksida (E172).

Izgled zdravila **Esomeprazol Mylan** in vsebina pakiranja

Esomeprazol Mylan 20 mg gastrorezistentne tablete so svetlo roza, podolgovate, bikonveksne filmsko obložene tablete, z vtisnjeno oznako "M" na eni strani in "EM3" na drugi strani tablete.

Esomeprazol Mylan 40 mg gastrorezistentne tablete so roza, podolgovate, bikonveksne filmsko obložene tablete z vtisnjeno oznako "M" na eni strani in "EM4" na drugi strani tablete.

Tablete **Esomeprazol Mylan** so na voljo:

- v pretisnih omotih s po 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 ali 200 gastrorezistentnih tablet.
- v perforiranih enoodmernih pretisnih omotih s po (14 x 1), (28 x 1), (56 x 1), ali (100 x 1) gastrorezistentno tableto.
- v HDPE plastenkah s po 14, 28, 56, 98, 100, 200 ali 500 gastrorezistentnimi tabletami.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila

Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet

Generics [UK] Ltd.,
Station Close,
Potters Bar,
Hertfordshire EN6 1TL,
Velika Britanija

Izdelovalci

- McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Irska
- Generics (UK) Ltd. Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velika Britanija
- Mylan Hungary Kft., H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Madžarska

Zdravilo je v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora odobreno z naslednjimi imeni:

Avstrija:	Esomeprazol Arcana 20mg & 40mg magensaftresistente Tabletten
Belgija:	Esomeprazole Mylan 20mg & 40mg maagsapresistente tabletten
Češka:	Esomeprazol Mylan 20mg & 40mg entersolventní tablety
Francija:	Esomeprazole Mylan 20mg & 40mg Comprimé gastro-résistant
Irska:	Esomeprazole Mylan 20mg & 40mg Gastro-resistant Tablets
Madžarska:	Esomeprazole Mylan 20 mg & 40 mg gyomornedv-ellenálló tableta
Nemčija:	Esomeprazol Mylan 20mg & 40mg magensaftresistente Tabletten
Nizozemska:	Esomeprazol Mylan 20mg & 40mg maagsapresistente tablet
Portugalska:	Esomeprazol Mylan 20mg & 40mg Gastro-resistant tablets
Slovenija:	Esomeprazol Mylan 20 mg gastrorezistentne tablete Esomeprazol Mylan 40 mg gastrorezistentne tablete
Španija:	Esomeprazol Mylan 20 mg & 40 mg comprimidos gastroresistentes EFG
Velika Britanija:	Esomeprazole 20mg / 40mg Gastro-resistant Tablets

Navodilo je bilo odobreno: **25.02.2013**