

Navodilo za uporabo

Skopryl 10 mg tablete Skopryl 20 mg tablete lisinoprilum

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Skopryl in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Skopryl
3. Kako jemati zdravilo Skopryl
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Skopryl
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Skopryl in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Skopryl vsebuje učinkovino lizinopril, ki je zaviralec encima angiotenzin konvertaze (zaviralec ACE) in spada med zdravila za zniževanje krvnega tlaka. Deluje tako, da razširi žile in s tem pripomore k znižanju krvnega tlaka in srcu olajša črpanje krvi v vse dele telesa. Uporablja se lahko kot samostojno zdravilo ali pa v kombinaciji z drugimi zdravili.

Zdravilo Skopryl se uporablja za zdravljenje:

- povišanega krvnega tlaka (hipertenzije),
- vseh stopenj srčnega popuščanja, pri katerem vaše srce ne črpa krvi po telesu, kot bi jo moralo,
- akutnega srčnega infarkta,
- bolezni ledvic (diabetične nefropatije) pri bolnikih s sladkorno boleznijo, ki so odvisni od inzulina, imajo pa normalen krvni tlak, in pri bolnikih s povišanim krvnim tlakom in sladkorno boleznijo, ki ni odvisna od inzulina.

Zdravilo Skopryl je pri otrocih in mladostnikih (starih od 6 do 16 let) priporočeno **le za zdravljenje visokega krvnega tlaka** (hipertenzije).

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Skopryl

Ne jemljite zdravila Skopryl:

- če ste alergični na lizinopril ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6) ali druge zaviralce ACE,
- če ste se že kdaj prej zdravili z zdravilom iz iste skupine, kot je lizinopril (zaviralci ACE), in ste imeli alergijsko reakcijo z oteženim požiranjem in dihanjem, z otečenimi rokami, stopali, gležnji, obrazom, ustnicami, jezikom ali grlom (angioedem),
- če veste za primere angioedema v vaši družini ali ste kdaj imeli angioedem v kakšnih drugih okoliščinah,
- če imate sladkorno bolezen ali okvarjeno delovanje ledvic in se zdravite z zdravilom za znižanje krvnega tlaka, ki vsebuje aliskiren,
- če ste noseči že več kot tri mesece (bolje se je izogniti jemanju zdravila Skopryl v zgodnjem obdobju nosečnosti – glejte poglavje Nosečnost, dojenje in plodnost).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Skopryl se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro:

- če ste dehidrirani zaradi zdravljenja z zdravili, ki odvajajo vodo (diuretiki), dialize, omejevanja soli v prehrani, driske ali ker ste bruhal, saj je v tem primeru večja verjetnost, da bo po začetku zdravljenja z lizinoprilom prišlo do prekomernega znižanja krvnega tlaka in boste to občutili kot vrtoglavico ali omedlevico,
- če imate zoženo aorto (aortno stenozo) ali srčno zaklopko (stenoza mitralne zaklopke), zadebeljeno srčno mišico (hipertrofično kardiomiopatijo),
- če imate zastojno srčno popuščanje,
- če imate ishemično srčno ali srčno-žilno bolezen ali akutni srčni infarkt,
- če imate ledvično bolezen ali zoženo eno ali obe ledvični arteriji, ki vodita v ledvice,
- če imate bolezen jeter,
- če imate težave z ožiljem (na primer periferno žilno bolezen ali generalizirano poapnenje žil ali kolagensko žilno bolezen),
- če imate sladkorno bolezen,
- če jemljete zdravila za odvajanje vode (diuretike), kalijeve nadomestke ali soli,
- če jemljete katero od naslednjih zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje visokega krvnega tlaka:
 - antagonist receptorjev angiotenzina II (ARB) (ta zdravila imenujemo tudi "sartani" - mednje spadajo na primer valsartan, telmisartan in irbesartan), še zlasti če imate kakšne težave z ledvicami, ki so povezane s sladkorno boleznijo,
 - aliskiren.

Zdravnik vam bo morda v rednih presledkih kontroliral delovanje ledvic, krvni tlak in količino elektrolitov (npr. kalija) v krvi.

Glejte tudi informacije pod naslovom "Ne jemljite zdravila Skopryl".

- če imate nizek krvni tlak (ki se kaže kot vrtoglavica ali občutek, da boste omedleli, posebno pri vstajanju),
- če dojdete,
- če imate visoke vrednosti holesterola in se zdravite s tako imenovano aferezo LDL,
- če ste pripadnik črne rase, ker je lahko zdravilo Skopryl manj učinkovito in se pri vas lahko prej pojavi neželeni učinek - angioedem (huda alergijska reakcija),
- če opravljate ali imate predvideno desenzibilizacijsko zdravljenje proti alergiji, na primer proti pikom žuželk. Desenzibilizacijsko zdravljenje zmanjša učinke alergije (na primer na pike čebel ali os), a lahko v nekaterih primerih povzroči hujše alergijske reakcije, če med desenzibilizacijskim zdravljenjem jemljete zaviralce ACE,

- če imate predviden operativni poseg (vključno z zobozdravstvenim operativnim posegom) zdravniku ali zobozdravniku povejte, da jemljete zdravilo Skopryl. Zdravilo Skopryl lahko v kombinaciji z lokalnimi ali splošnimi anestetiki povzroči kratkotrajen padec krvnega tlaka kmalu po zaužitju tablet.

Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali bi lahko zanosili).

Uporaba zdravila Skopryl v zgodnjem obdobju nosečnosti **ni priporočljiva**, po tretjem mesecu nosečnosti pa ni dovoljena, saj lahko zdravilo v tem obdobju resno škoduje vašemu otroku (glejte poglavje Nosečnost, dojenje in plodnost).

Takoj prenehajte jemati zdravilo in pojdite k zdravniku, če pride do naslednjih alergijskih reakcij:

- težav z dihanjem hkrati z ali brez oteklosti obraza, ustnic, jezika in/ali grla,
- oteklosti obraza, ustnic, jezika in/ali grla, ki lahko povzroči težave pri požiranju,
- močnega srbenja kože (mehurjasti ali drugačni izpuščaji),
- oteklosti in srbenja dlani, stopal ali gležnjev.

Posebno pozorni bodite pri prvi uporabi zdravila Skopryl

Zdravilo Skopryl lahko povzroči **večje znižanje krvnega tlaka**. To boste morda občutili kot vrtoglavico ali občutek, da boste omedleli. V takem primeru lahko pomaga, če se uležete. V primeru, da vas skrbi, se čimprej posvetujte z zdravnikom.

Če jemljete katero koli izmed naslednjih zdravil, pri vas obstaja povečano tveganje za angioedem (hitro podkožno otekanje na mestih, kot je npr. grlo):

- sirolimus, everolimus in druga zdravila, ki spadajo v razred zaviralcev mTOR (ki jih uporabljamo za preprečevanje zavrnitve presajenih organov)

Druga zdravila in zdravilo Skopryl

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Nekatera zdravila lahko vplivajo na delovanje zdravila Skopryl in obratno.

Zdravnik vam bo morda moral spremeniti odmerek in/ali upoštevati druge previdnostne ukrepe:

- če jemljete antagonist receptorjev angiotenzina II (ARB) ali aliskiren (glejte tudi informacije pod naslovom "Ne jemljite zdravila Skopryl" in "Opozorila in previdnostni ukrepi").

Zdravniku povejte, če jemljete:

- kalijeve dodatke ali nadomestke soli, ki vsebujejo kalij, diuretike (tablete za odvajanje vode, še posebej takšne, ki zadržujejo kalij), druga zdravila, ki lahko dvignejo raven kalija v vaši krvi (npr. heparin in kotrimoksazol, imenovan tudi trimetoprim/sulfametoksazol).
- druga zdravila za zdravljenje povišanega krvnega tlaka (antihipertenzive),
- nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID) kot je indometacin ali velike odmerke acetilsalicilne kisline (več ko 3 g na dan), ki se uporabljajo za zdravljenje artritisa ali bolečin v mišicah,
- zdravila, ki vsebujejo soli zlata in se uporabljajo v injekcijah (na primer natrijev avrotiomalat, ki se uporablja za zdravljenje artritisa),
- zdravila za zdravljenje duševnih motenj, na primer litij (ker je potrebno ob njunem sočasnem zdravljenju pogosto preverjanje koncentracije litija v krvi), antipsihotike ali triciklične antidepressive,
- tablete s kalijem ali nadomestke soli, ki vsebujejo kalij,

- zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni kot je inzulin ali tista, ki se jih zaužije za zmanjševanje krvnega sladkorja;
- zdravila, ki spodbujajo osrednje živčevje (simpatikomimetike). Mednje spadajo efedrin, psevdoefedrin in salbutamol, ki jih je mogoče najti v nekaterih dekonjestivih, zdravilih proti kašlju/prehladu in v zdravilih proti astmi,
- zdravila, ki se najpogosteje uporabljajo za preprečevanje zavračanja presajenih organov (sirolimus, everolimus in druga zdravila, ki spadajo v razred zaviralcev mTOR). Glejte poglavje “Opozorila in previdnostni ukrepi”;
- zdravila, ki zavirajo imunski odziv telesa (imunosupresivi), alopurinol (za zdravljenje protina) ali prokainamid (proti motnjam srčnega ritma).

Zdravilo Skopryl skupaj s hrano in pijačo

Tablete lahko zaužijete pred, med ali po jedi.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Nosečnost

Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali bi lahko zanosili).

Uporaba zdravila Skopryl v zgodnjem obdobju nosečnosti **ni priporočljiva**.

Uporaba zdravila Skopryl po tretjem mesecu nosečnosti **pa ni dovoljena**, saj lahko zdravilo v tem obdobju resno škoduje vašemu otroku.

Zdravnik vam bo praviloma svetoval, da prekinete z jemanjem zdravila Skopryl preden boste zanosili ali takoj, ko izveste, da ste noseči in vam bo svetoval jemanje drugega zdravila, namesto zdravila Skopryl.

Dojenje

Obvestite zdravnika, če dojite ali nameravate dojiti.

Med dojenjem zdravljenje z zdravilom Skopryl **ni priporočljivo**. Če nameravate dojiti, še posebej novorojenčka ali nedonošenčka, vam zdravnik lahko predpiše zdravljenje z drugim zdravilom.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Med zdravljenjem z zdravilom Skopryl lahko občasno pride do **omotičnosti ali utrujenosti**.

Če zdravilo vpliva tako na vas, potem ne upravljajte vozil ali strojev in ne opravljajte dejavnosti, ki zahtevajo posebno pozornost.

3. Kako jemati zdravilo Skopryl

Pri jemanju zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravnik vam bo predpisal velikost odmerka, pogostnost jemanja zdravila in vam povedal koliko časa bo trajalo zdravljenje. Odmerjanje je prilagojeno vsakemu posamezniku.

Pomembno je, da zdravilo jemljete, **kot vam je predpisal zdravnik**. Vaš začetni odmerek in odmerek za dolgotrajno uporabo sta odvisna od vašega zdravstvenega stanja in od tega ali jemljete kakšna druga zdravila.

Za odmerke, ki jih z zdravilom Skopryl ni mogoče doseči, vam bo zdravnik predpisal drugo zdravilo z isto učinkovino, vendar druge jakosti.

Tablete Skopryl so namenjene **za peroralno uporabo**.

Zaužijte jih pred, med ali po jedi.

Običajno odmerjanje pri odraslih s povišanim krvnim tlakom

- Priporočeni začetni odmerek je **10 mg** enkrat na dan. Odmerek je treba prilagoditi glede na znižanje krvnega tlaka.
- Običajni vzdrževalni odmerek v obliki enkratnega odmerka znaša **od 20 do 40 mg**.
- Dnevni odmerek se veča v tedenskih intervalih in sicer **do največjega**, ki znaša **80 mg** enkrat na dan.

Pri bolnikih s povišanim krvnim tlakom zaradi zoženja ene ali obeh ledvičnih arterij (renovaskularna hipertenzija):

- Priporočeni začetni odmerek znaša **do 5 mg** enkrat na dan.
- Odmerjanje je individualno, običajni vzdrževalni odmerek je **20 mg** enkrat na dan.

Običajno odmerjanje pri bolnikih s srčnim popuščanjem:

- Priporočeni začetni odmerek znaša **od 2,5 do 5 mg** enkrat na dan.
- Vsem bolnikom se na dva do štiri tedne odmerek postopno povečuje, dokler ne doseže običajnega učinkovitega enkratnega odmerka (**od 5 do 20 mg** na dan).

Običajno odmerjanje pri bolnikih z akutnim srčnim infarktom

- Priporočeni začetni odmerek za bolnike s sistoličnim krvnim tlakom **nad 120 mmHg** je **5 mg** enkrat na dan prva dva dni po akutnem srčnem infarktu.
- Vzdrževalni odmerek je **10 mg** enkrat na dan šest tednov.
- Priporočeni začetni odmerek za bolnike s sistoličnim krvnim tlakom **med 100 do 120 mmHg** je **2,5 mg** enkrat na dan prva dva dni po akutnem srčnem infarktu.
- Vzdrževalni odmerek je **5 mg** enkrat na dan šest tednov.
- Če se med zdravljenjem sistolični krvni tlak **zniža na manj kot 100 mmHg** je treba vzdrževalni odmerek zmanjšati na **2,5 mg** enkrat na dan.
- Če ostaja krvni tlak **še naprej nizek** (sistolični krvni tlak je več kot eno uro manj kot 90 mmHg), je treba lizinopril **prenehati uporabljati**.

Običajno odmerjanje pri bolezni ledvic (diabetična nefropatija) pri bolnikih s sladkorno boleznijo, ki so odvisni od insulina, imajo pa normalen krvni tlak, in pri bolnikih s povišanim krvnim tlakom in sladkorno boleznijo, ki ni odvisna od insulina

- Priporočeni začetni odmerek je **2,5 mg** enkrat na dan, ki pa ga je med vzdrževalnim zdravljenjem potrebno prilagoditi vsakemu bolniku posebej, tako da bo krvni tlak urejen.

Prilagoditev odmerka pri bolnikih z ledvično okvaro

Če ste bolnik z ledvično okvaro vam bo zdravnik morda predpisal manjši odmerek lizinopрила.

Starejši

Če ste starejši, vam bo zdravnik morda predpisal manjši odmerek.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih (stari od 6 do 16 let)

Zdravnik bo vašemu otroku morda predpisal manjši začetni odmerek ali povečal razmik med posameznimi odmerki. Zdravnik bo izbral za otroka primeren odmerek. Odmerek je odvisen od otrokove telesne mase.

Običajno odmerjanje pri otrocih in mladostnikih, ki tehtajo od 20 do 50 kg

- Običajen začetni odmerek je **2,5 mg** enkrat na dan.
- Odmerek je mogoče povečati **do največ 20 mg** enkrat na dan.

Običajno odmerjanje pri otrocih in mladostnikih, ki tehtajo **več kot 50 kg**

- Običajni začetni odmerek je **5 mg** enkrat na dan;
- Odmerek je mogoče povečati **do največ 40 mg** enkrat na dan.

Uporaba lizinopрила (zdravilna učinkovina) **ni priporočljiva** pri:

- otrocih, mlajših od 6 let,
- otrocih, ki imajo hude težave z ledvicami.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Skopryl, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek zdravila kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Najizrazitejši simptom prevelikega odmerjanja lizinopрила je prekomerno znižanje krvnega tlaka. Posledici tega sta lahko omotica in vrtoglavica. Pojavijo se lahko tudi povišana koncentracija kalija v krvi (hiperkaliemija), znižana koncentracija natrija v krvi (hiponatriemija) in moteno delovanje ledvic, tudi akutna ledvična odpoved.

Zdravljenje je simptomatsko. Zagotoviti je treba delovanje vitalnih organov. Bolniku je treba izprati želodec, mu dati aktivno oglje in odpraviti dehidracijo, elektrolitsko neravnovesje in znižanje krvnega tlaka. Specifičnega protistrupa ni.

Lizinopril se iz organizma odstrani s hemodializo.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Skopryl

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Nadaljujte z jemanjem po običajnem urniku.

Če ste prenehali jemati zdravilo Skopryl

Ne prenehajte jemati tablet, če vam tega ne naroči zdravnik, tudi če se počutite dobro.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Prenehajte z jemanjem zdravila in se posvetujte z zdravnikom oziroma obiščite najbližjo bolnišnico, če imate naslednje znake, ki kažejo na angioedem: oteženo požiranje in dihanje, otečene roke, stopala, gležnje, obraz, ustnice, jezik ali grlo.

Pogosti neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):

- glavobol,
- omotica ali občutek, da boste omedleli, posebno pri hitrem vstajanju,
- kašelj,
- driska,
- bruhanje,
- nepravilno delovanje ledvic (pokaže se pri preiskavah krvi).

Občasni neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- spremembe razpoloženja,

- mravljinčenje,
- vrtoglavica,
- motnje okusa,
- motnje spanja,
- srčna ali možganska kap,
- neprijetni občutki ob hitrem ali močnem utripanju srca (palpitacija),
- hitro utripanje srca (tahikardija),
- motnja v delovanju arterij in arteriol, ki se kaže z občasnimi napadi hude bledice prstov, zlasti na rokah, včasih tudi uhljev in nosa, spremljajo jih parestezije in bolečine, napad pa sprožijo mraz in/ali psihični pretresi (Raynaudov fenomen),
- izcedek iz nosu,
- siljenje na bruhanje,
- bolečina v trebuhu,
- prebavne motnje,
- izpuščaj,
- srbenje,
- preobčutljivostna reakcija, ki se kaže v obliki otekline obraza, okončin, ustnic, jezika ali grla,
- nezmožnost dosega erekcije,
- občutek utrujenosti ali šibkosti,
- spremembe izvidov preiskav krvi, ki pokažejo, kako delujejo vaša jetra in ledvice.

Redki neželeni učinki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- znižana koncentracija rdečega krvnega barvila - hemoglobina v krvi in znižan volumski odstotek rdečih krvničk v krvi,
- zmedenost,
- suha usta,
- koprivnica,
- izpadanje las,
- luskavica,
- nenadna odpoved ledvic,
- povečanje prsi pri moških (ginekomastija),
- znižana vrednost natrija v krvi, ki se lahko kaže z utrujenostjo, glavobolom, občutkom siljenja na bruhanje, bruhanjem.

Zelo redki neželeni učinki (pojavi se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

- krvne motnje,
- bolezen bezgavk,
- bolezen, ki je posledica imunskega odziva na lastne sestavine (avtoimunska bolezen),
- alergijska reakcija v obliki krožnega nabiranja medcelične tekočine v podkožnem tkivu (angionevrotični edem),
- nizke vrednosti sladkorja v krvi (hipoglikemija), katere znaki lahko vključujejo občutek lakote, šibkosti, znojenja in hitro utripanje srca,
- zoženje svetline bronhijev (bronhospazem), ki se kaže s težkim dihanjem,
- vnetje sinusov, ki se kaže z bolečino v obnosnih votlinah,
- vnetje pljuč, ki se kaže s kašljem, občutkom kratke sape in visoko telesno temperaturo,
- nakopičenje tekočine v medceličnem prostoru črevesja,
- vnetje trebušne slinavke, ki povzroči zmerno do hudo bolečino v trebuhu, siljenje na bruhanje in bruhanje,
- vnetje jeter, ki lahko povzroči izgubo apetita, rumeno obarvanost kože in/ali oči,
- zlatenica (rumena obarvanost kože in/ali oči),

- odpoved jeter,
- prekomerno znojenje,
- resne kožne spremembe (simptomi, ki vključujejo rdečino kože, mehurčast izpuščaj, luščenje kože),
- zmanjšano ali prekinjeno izločanje urina.

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- simptomi depresije,
- omedlevica.

Dodatni neželeni učinki pri otrocih in mladostnikih

Neželeni učinki pri otrocih in mladostnikih so podobni kot pri odraslih.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

5. Shranjevanje zdravila Skopryl

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in pretisnem omotu poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Ne uporabljajte zdravila, če opazite znake poškodb ali spremembo barve tablet.

Zdravila ne smete odvreči v odpadno vodo ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Skopryl

- Učinkovina je lizinopril.
- Skopryl 10 mg tablete:
Ena tableta vsebuje 10 mg lizinopрила v obliki 10,89 mg lizinopril dihidrata.

Skopryl 20 mg tablete:

Ena tableta vsebuje 20 mg lizinopрила v obliki 21,78 mg lizinopril dihidrata.

- Druge sestavine zdravila so:

Skopryl 10 mg tablete:

manitol, brezvodni kalcijev hidrogenfosfat, koruzni škrob, predgelirani škrob, rumeni železov oksid (E172), magnezijev stearat in povidon.

Skopryl 20 mg tablete:

manitol, brezvodni kalcijev hidrogenfosfat, koruzni škrob, predgelirani škrob, rumeni železov oksid (E172), rdeči železov oksid (E172), magnezijev stearat in povidon.

Izgled zdravila Skopryl in vsebina pakiranja

Skopryl 10 mg tablete:

Bledo rumene, okrogle, bikonveksne tablete z razdelilno zarezo na eni strani. Tableta se lahko deli na enake odmerke.

Škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu). Pretisni omot Al/PVC folije.

Škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu). Pretisni omot Al/PVC folije.

Skopryl 20 mg tablete:

Bledo rožnate, okrogle, bikonveksne tablete z razdelilno zarezo na eni strani. Tableta se lahko deli na enake odmerke.

Škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu). Pretisni omot Al/PVC folije.

Škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu). Pretisni omot Al/PVC folije.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Skopryl

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

ALKALOID-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana-Črnuče

R Slovenija

Tel.: +386 (0)1 300 42 90

Faks: +386 (0)1 300 42 91

e-pošta: info@alkaloid.si

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 8. 1. 2018.