

## NAVODILO ZA UPORABO

**Ciprofloksacin Arrow 250 mg filmsko obložene tablete**  
**Ciprofloksacin Arrow 500 mg filmsko obložene tablete**  
**Ciprofloksacin Arrow 750 mg filmsko obložene tablete**  
(ciprofloksacinijev klorid)

### **Pred uporabo natančno preberite navodilo!**

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

### **Navodilo vsebuje:**

1. Kaj je zdravilo Ciprofloksacin Arrow in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Ciprofloksacin Arrow
3. Kako jemati zdravilo Ciprofloksacin Arrow
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Ciprofloksacin Arrow
6. Dodatne informacije

### **1. KAJ JE ZDRAVILO CIPROFLOKSACIN ARROW IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO**

Ime zdravila je **Ciprofloksacin Arrow 250 mg, 500 mg ali 750 mg filmsko obložene tablete** (in se v tem navodilu nanaša na Ciprofloksacin Arrow ali ciprofloksacin).

Zdravilo Ciprofloksacin Arrow je antibiotik iz skupine fluorokinolonov. Zdravilna učinkovina je ciprofloksacin. Ciprofloksacin uničuje določene vrste bakterij, ki povzročajo okužbe.

#### Odrasli

Zdravilo Ciprofloksacin Arrow se pri odraslih uporablja za zdravljenje naslednjih bakterijskih okužb:

- okužbe dihal
- dolgotrajne ali ponavljajoče se okužbe ušes in obnosnih sinusov
- okužbe sečil
- okužbe mod (testisov)
- okužbe spolnih organov pri ženskah
- okužbe prebavil in okužbe v trebušni votlini
- okužbe kože in mehkih tkiv
- okužbe kosti in sklepov
- zdravljenje okužb pri bolnikih z zmanjšanim številom belih krvnih celic (nevtropenija)
- preprečevanje okužb pri bolnikih z zmanjšanim številom belih krvnih celic (nevtropenija)
- za preprečevanje okužb, ki jih povzroča bakterija *Neisseria meningitidis*
- vranični prisad (izpostavljenost povzročitelju z vdihavanjem)

Če imate hudo okužbo ali okužbo, ki jo povzroča več vrst bakterij, boste mogoče hkrati z zdravilom Ciprofloksacin Arrow dobili še dodaten antibiotik.

### Otroci in mladostniki

Zdravilo Ciprofloksacin Arrow se pri otrocih in mladostnikih uporablja pod zdravniškim nadzorom za zdravljenje naslednjih bakterijskih okužb:

- pljučno in bronhialno poslabšanje cistične fibroze pri otrocih in mladostnikih
- zapletene okužbe sečil, vključno z okužbami ledvic (pielonefritis)
- vranični prisad (izpostavljenost povzročitelju z vdihavanjem)

Zdravilo Ciprofloksacin Arrow se lahko uporablja tudi za zdravljenje hudih okužb pri otrocih in mladostnikih, kadar zdravnik presodi, da je to potrebno.

## **2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO CIPROFLOKSACIN ARROW**

**Ne jemljite zdravila Ciprofloksacin Arrow, če:**

- ste alergični (preobčutljivi) na zdravilno učinkovino, druge kinolone ali katerokoli sestavino zdravila Ciprofloksacin Arrow (glejte poglavje 6)
- jemljete zdravilo tizanidin (glejte poglavje 2: Jemanje drugih zdravil)

**Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Ciprofloksacin Arrow**

**Preden vzamete zdravilo Ciprofloksacin Arrow**

Povejte svojemu zdravniku, če:

- ste kdaj imeli težave z ledvicami, ker bi bilo lahko treba vaše zdravljenje prilagoditi
- imate epilepsijo ali kakšne druge nevrološke težave
- ste imeli težave s tetivami pri prejšnjih zdravljenjih z antibiotiki, ki so podobni zdravilu Ciprofloksacin Arrow
- imate miastenijo gravis (vrsta mišične oslabelosti)
- imate težave s srcem. Če imate prirojen ali ima kdo v vaši družini podaljšan interval QT (ki je opazen na EKG, električnem zapisu delovanja srca), imate neravnovesje soli v krvi (zlasti majhen nivo kalija ali magnezija v krvi), imate zelo počasen srčni ritem (imenovan 'bradikardija'), imate šibko srce (srčno popuščanje), ste v preteklosti imeli srčni napad (miokardni infarkt), ste ženska ali ste starejši ali jemljete druga zdravila, ki povzročijo nenormalne spremembe EKG (glejte poglavje Jemanje drugih zdravil), je potrebna previdnost.

**Med zdravljenjem z zdravilom Ciprofloksacin Arrow**

Obvestite svojega zdravnika, če se kaj od navedenega pojavi **med zdravljenjem z zdravilom Ciprofloksacin Arrow**. Zdravnik se bo odločil, če je treba zdravljenje z zdravilom Ciprofloksacin Arrow prekiniti.

- **Takojšnje hude alergijske reakcije** (anafilaktične reakcije/šok, edem žil). Že po prvi uporabi zdravila obstaja majhna možnost, da se pojavijo hude alergijske reakcije z naslednjimi simptomi: stiskanje v prsnem košu, vrtoglavica, oslabelost, omedlevica ali vrtoglavica ob vstajanju. **V takih primerih zdravljenje z zdravilom Ciprofloksacin Arrow takoj prekinite in obvestite svojega zdravnika.**

- Občasno se lahko pojavijo **bolečine, otekanje sklepov in vnetje kit**, predvsem pri starejših in bolnikih, ki se zdravijo s kortikosteroidi. Ob prvih znakih bolečine ali vnetja prekinite zdravljenje z zdravilom Ciprofloksacin Arrow. Prizadeta okončina naj miruje. Izogibajte se nepotrebni telesni dejavnosti, ker se lahko zveča tveganje za raztrganje kite.
- Če imate **epilepsijo** ali kakšne druge **nevrološke motnje** (npr. zmanjšana prekrvavitev možganov ali možganska kap), se lahko pojavijo neželeni učinki, ki so povezani z osrednjim živčnim sistemom. V takih primerih zdravljenje z zdravilom Ciprofloksacin Arrow takoj prekinite in obvestite svojega zdravnika.
- Po prvi uporabi zdravila Ciprofloksacin Arrow se lahko pojavijo **psihiatrične reakcije**. Če ste **depresivni** ali imate **psihoze**, se simptomi lahko poslabšajo med zdravljenjem z zdravilom Ciprofloksacin Arrow. V takih primerih zdravljenje z zdravilom Ciprofloksacin Arrow takoj prekinite in obvestite svojega zdravnika.
- Med zdravljenjem se vam lahko pojavijo simptomi nevropatije npr. bolečina, žarenje, ščemenje, odrevenelost in/ali mišična oslabelost. V takih primerih zdravljenje z zdravilom Ciprofloksacin Arrow takoj prekinite in obvestite svojega zdravnika.
- Med zdravljenjem z antibiotiki, po zdravljenju z zdravilom Ciprofloksacin Arrow ali celo več tednov po končanem zdravljenju se lahko pojavi **driska**. Če je huda in trdovratna ali če v blatu opazite kri ali sluz, takoj prekinite zdravljenje z zdravilom Ciprofloksacin Arrow. Stanje je lahko življenjsko ogrožajoče. Ne uporabljajte zdravil, ki ustavijo ali upočasnijo gibanje prebavil in se posvetujte z zdravnikom.
- Če morate dati **vzorec krvi ali urina** za laboratorijske preiskave, obvestite svojega zdravnika ali laboratorijsko osebje, da jemljete zdravilo Ciprofloksacin Arrow.
- Zdravilo Ciprofloksacin Arrow lahko povzroči **jetrne okvare**. Če opazite katerikoli simptom kot so izguba apetita, zlatenica (porumenelost kože), temen urin, srbenje ali napetost trebuha, prenehajte jemati zdravilo Ciprofloksacin Arrow in se takoj posvetujte s svojim zdravnikom.
- Zdravilo Ciprofloksacin Arrow lahko povzroči zmanjšanje števila belih krvnih celic in zato je vaša **odpornost proti okužbam lahko zmanjšana**. Če imate okužbo s simptomi zvišane telesne temperature in resnim poslabšanjem vašega splošnega stanja, ali zvišano telesno temperaturo s simptomi lokalne okužbe (npr. vneto grlo, žrelo, usta) ali težave s sečili, morate takoj obiskati zdravnika. Potrebno bo opraviti preiskavo krvi, da bi preverili morebitno zmanjšanje števila belih krvnih celic (agranulocitoza). Pomembno je, da obvestite vašega zdravnika o vašemu zdravilu.
- Obvestite zdravnika, če imate vi ali katerikoli član vaše družine pomanjkanje glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD), ker obstaja ob jemanju ciprofloksacina tveganje za anemijo.
- Med zdravljenjem z zdravilom Ciprofloksacin Arrow lahko postane koža bolj **občutljiva za sončno svetlobo ali ultravijolično sevanje (UV)**. Izogibajte se izpostavljanju močni sončni ali umetni UV svetlobi (npr. solarij).

### Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Zdravnika morate obvestiti, če jemljete zdravila, ki lahko spremenijo srčni ritem: zdravila, ki spadajo v skupino antiaritmikov (npr. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), triciklične antidepresive, nekatere antibiotike (ki spadajo v skupino makrolidov), nekatere antipsihotike.

**Ne jemljite zdravila Ciprofloksacin Arrow hkrati s tizanidinom**, ker se lahko pojavijo neželeni učinki, kot sta nizek krvni tlak in zaspanost (glejte poglavje 2: Ne jemljite zdravila Ciprofloksacin).

Za naslednja zdravila je znano, da v telesu medsebojno delujejo z zdravilom Ciprofloksacin Arrow. Jemanje zdravila Ciprofloksacin Arrow sočasno s temi zdravili lahko vpliva na terapevtski učinek teh zdravil. Hkrati se lahko poveča možnost pojava neželenih učinkov.

#### **Obvestite svojega zdravnika, če jemljete:**

- varfarin ali katerikoli drugi peroralni antikoagulant (proti strjevanju krvi)
- probenicid (za zdravljenje protina)
- metotreksat (za zdravljenje nekaterih vrst raka, luskavice, revmatoidnega artritisa)
- teofilin (za lajšanje težav pri dihanju)
- tizanidin (za zdravljenje mišičnih krčev pri multipli sklerozi)
- klozapin (antipsihotik)
- ropinirol (za zdravljenje Parkinsonove bolezni)
- fenitoin (za zdravljenje epilepsije)

Zdravilo Ciprofloksacin Arrow lahko v krvi **zveča** vrednosti naslednjih zdravil:

- pentoksifilina (za zdravljenje motenj obtočil)
- kofeina

Nekatera zdravila **zmanjšajo** učinek zdravila Ciprofloksacin Arrow. Obvestite svojega zdravnika, če nameravate jemati ali jemljete:

- antacide
- mineralne pripravke
- sukralfat
- polimere, ki vežejo fosfat (npr. sevelamer)
- zdravila ali dodatke, ki vsebujejo kalcij, magnezij, aluminij ali železo

Če morate nujno jemati te pripravke, je treba zdravilo Ciprofloksacin Arrow vzeti eno do dve uri pred ali vsaj štiri ure po zaužitju teh pripravkov.

#### **Jemanje zdravila Ciprofloksacin Arrow skupaj s hrano in pijačo**

Če zdravila Ciprofloksacin Arrow ne jemljete med obrokom, se izogibajte sočasni uporabi z mlečnimi izdelki (npr. mleko, jogurt) ali s kalcijem obogatenimi pijačami, ker se lahko zmanjša absorpcija zdravilne učinkovine.

#### **Nosečnost in dojenje**

Po možnosti se izogibajte jemanju zdravila Ciprofloksacin Arrow med nosečnostjo. Posvetujte se z zdravnikom, če načrtujete nosečnost.

Ne jemljite zdravila Ciprofloksacin Arrow med dojenjem, ker se ciprofloksacin izloča v materino mleko in je lahko škodljiv za vašega otroka.

## Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Ciprofloksacin Arrow lahko zmanjša odzivnost. Pojavijo se lahko nekateri nevrološki neželeni učinki. Ne vozite ter ne upravljajte s stroji, dokler ne veste, kako se vaše telo odziva na zdravilo Ciprofloksacin Arrow. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom.

### 3. KAKO JEMATI ZDRAVILO CIPROFLOKSACIN ARROW

Pri jemanju zdravila Ciprofloksacin Arrow natančno upoštevajte zdravnikova navodila, kdaj in kako pogosto morate vzeti tablete in koliko časa jih morate jemati. To je odvisno od vrste in resnosti okužbe.

Obvestite svojega zdravnika, če imate ledvične težave, ker je v teh primerih potrebno odmerke prilagoditi.

Običajno traja zdravljenje od 5 do 21 dni, pri hudih okužbah tudi dlje. Natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi koliko tablet morate vzeti in kako dolgo jih morate jemati, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

- a. Tablete pogoltnite cele, z dovolj tekočine. Tablet ne žvečite, ker niso dobrega okusa.
- b. Tablete jemljite vsak dan ob približno istem času.
- c. Tablete lahko jemljete v času obeda ali med obroki hrane. Kalcij, ki ga zaužijete kot del obroka, ne bo pomembno vplival na jemanje zdravila. **Ne jemljite zdravila Ciprofloksacin Arrow hkrati z mlečnimi izdelki (npr. mleko, jogurt) ali s pijačami, obogatenimi z minerali (npr. s kalcijem obogaten pomarančni sok).**

Med zdravljenjem z zdravilom Ciprofloksacin Arrow pijte zadostne količine tekočin.

#### Če ste vzeli večji odmerek zdravila Ciprofloksacin Arrow, kot bi smeli

- Če ste vzeli večji odmerek kot je predpisan, takoj poiščite zdravniško pomoč. Če je mogoče, vzemite s seboj tablete ali škatlo in jih pokažite zdravniku.

#### Če ste pozabili vzeti zdravilo Ciprofloksacin Arrow

- Vzemite običajni odmerek takoj, ko je mogoče in nato nadaljujte kot vam je predpisal zdravnik. Če je že skoraj čas za vaš naslednji odmerek, ne vzemite pozabljenega odmerka, ampak nadaljujte kot običajno. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Zanesljivo zaključite celotno zdravljenje.

#### Če ste prenehali jemati zdravilo Ciprofloksacin Arrow

- Pomembno je, da **zaključite zdravljenje**, tudi če se že čez nekaj dni počutite bolje. Če boste prekmalu prenehali jemati zdravilo, se vaša okužba ne bo popolnoma pozdravila in simptomi okužbe se lahko ponovijo oz. poslabšajo. Prav tako se lahko razvije odpornost na antibiotik.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila Ciprofloksacin Arrow, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

### 4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Ciprofloksacin Arrow filmsko obložene tablete neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

**Pogosti** (lahko se pojavijo pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov)

- slabost, driska
- bolečine v sklepih pri otrocih

**Občasni** (lahko se pojavijo pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov)

- glivične okužbe
- zvečane vrednosti eozinofilcev (vrsta belih krvnih celic)
- izguba apetita (anoreksija)
- hiperaktivnost ali vznemirjenost
- glavobol, omotica, motnje spanja ali motnje okusa
- bruhanje, bolečine v trebuhu, prebavne motnje (npr. želodčne motnje; slaba prebava/zgaga) ali vetrovi
- zvečane vrednosti določenih snovi v krvi (transaminaze in/ali bilirubina)
- izpuščaj, srbenje ali koprivnica
- bolečine v sklepih pri odraslih
- slabo delovanje ledvic
- bolečine v mišicah in kosteh, slabo počutje (astenija) ali zvišana telesna temperatura
- zvečane vrednosti alkalne fosfataze v krvi (posebna snov v krvi)

**Redki** (lahko se pojavijo pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov)

- črevesno vnetje (kolitis) povezano z uporabo antibiotikov (smrtno nevarno v zelo redkih primerih) (glejte poglavje 2)
- spremembe v krvni sliki (levkopenija, levkocitoza, nevtropenija, anemija), zvečane ali zmanjšane vrednosti krvnih ploščic (trombocitov)
- alergijska reakcija, otekanje (edem) ali hitro otekanje kože in sluznic (angioedem)
- zvečane vrednosti krvnega sladkorja (hiperglikemija)
- zmedenost, dezorientiranost, anksioznost, nočne more, depresija, halucinacije
- zbadanje, neobičajno zaznavanje dražljajev, zmanjšana občutljivost kože, tremor, krči (glejte poglavje 2) ali omotica
- motnje vida
- zvonjenje v ušesih, izguba sluha, poslabšanje sluha
- pospešeno bitje srca (tahikardija)
- razširitev krvnih žil (vazodilatacija), nizek krvni tlak ali omedlevica
- kratka sapa, tudi znaki astme
- motnje v delovanju jeter, zlatenica (holestatski ikterus), hepatitis
- občutljivost za svetlobo (glejte poglavje 2)
- mišične bolečine, vnetje sklepov, povečan tonus mišic ali krči
- ledvična odpoved, kri ali kristali v seču (glejte poglavje 2), vnetje sečil
- zastajanje tekočine ali prekomerno znojenje
- nenormalne vrednosti faktorja strjevanja krvi (protrombin) ali zvečane vrednosti encima amilaza

**Zelo redki** (lahko se pojavijo pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov)

- zmanjšanje števila rdečih krvnih celic (hemolitična anemija), nevarno zmanjšanje števila vrste belih krvnih celic (agranulocitoza), zmanjšanje števila rdečih in belih

- krvnih celic in krvnih ploščic (pancitopenija), ki je lahko smrtno nevarna; depresija kostnega mozga, ki je tudi lahko smrtno nevarna (glejte poglavje 2)
- huda alergijska reakcija (anfilaktična reakcija ali anafilaktični šok, ki je lahko smrtno nevaren – serumska bolezen) (glejte poglavje 2)
- duševne motnje (psihotične reakcije) (glejte poglavje 2)
- migrena, motnje koordinacije, nestabilna hoja (motnje ravnotežja), motnje čuta za voh (olfaktorne motnje), pritisk na možgane (intrakranialni tlak)
- motnje zaznavanja barv
- vnetje žilnih sten (vaskulitis)
- vnetje trebušne slinavke
- odmrle jetrne celice (jetrna nekroza) zelo redko napreduje v smrtno nevarno jetrno odpoved
- majhne, pikčaste podkožne krvavitve (petehije); različne kožne spremembe in izpuščaji (npr. lahko smrtno nevaren Stevens-Johnsonov sindrom ali toksična epidermalna nekroliza)
- oslabelost mišic, vnetje kit, raztrganje tetiv – posebno dolge tetive na zadnji strani gležnja (Ahilova tetiva, glejte poglavje 2), poslabšanje simptomov miastenije gravis (glejte poglavje 2)

**Neznana pogostnost** (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti)

- težave v povezavi z živčnim sistemom, kot so bolečina, žarenje, ščemenje, odrevenelost in/ali oslabelost okončin
- nenormalno hiter srčni ritem, neenakomerni srčni ritem, ki je življenje ogrožajoči, sprememba srčnega ritma (imenovana ‘podaljšanje intervala QT’ in je opazna na EKG, električni aktivnosti srca)

## 5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA CIPROFLOKSACIN ARROW

### **Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!**

Zdravila Ciprofloksacin Arrow ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in pretisnem omotu poleg oznake “Uporabno do”. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Ne uporabljajte zdravila Ciprofloksacin Arrow, če ste opazili, da so tablete okrušene, prelomljene ali razbarvane.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

## 6. DODATNE INFORMACIJE

### **Kaj vsebuje zdravilo Ciprofloksacin Arrow**

Zdravilna učinkovina je ciprofloksacinijev klorid.

Pomožne snovi v jedru tablete so koruzni škrob, mikrokristalna celuloza, krosповidon, brezvodni koloidni silicijev dioksid, predgeliran koruzni škrob in magnezijev stearat.

Filmska obloga vsebuje polivinilalkohol, titanov dioksid (E171), makrogol in smukec.

### **Izgled zdravila Ciprofloksacin Arrow in vsebina pakiranja**

Ciprofloksacin Arrow 250 mg filmsko obložene tablete so bele barve, okrogle, izbočene oblike in označene CR/250 na eni strani in > na drugi.

Ciprofloksacin Arrow 500 mg filmsko obložene tablete so bele barve, podolgovate, izbočene oblike in označene CR/500 na eni strani in > na drugi.

Ciprofloksacin Arrow 750 mg filmsko obložene tablete so bele barve, podolgovate, izbočene oblike in označene CR/750 na eni strani in > na drugi.

Zdravilo Ciprofloksacin Arrow je na voljo v pretisnih oмотih in/ali vsebnikih po 6, 10, 12, 14, 16, 20, 56, 100 in 120 filmsko obloženih tablet.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

### **Način izdaje zdravila Ciprofloksacin Arrow**

Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

### **Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom**

Arrow Generics Limited, Unit 2, Stevenage, Hertfordshire SG1 4SZ, Velika Britanija

### **Izdelovalec**

Arrow Pharm (Malta) Ltd, HF 62, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia BBG 06, Malta

Arrow Generics (Ireland), Units 4/5 Willsborough Cluster, Clonsaugh Industrial Estate, Dublin 17, Irska

Arrow Generics Limited, Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4SZ, Velika Britanija

Juta Pharma GmbH, Gutenbergstrasse 13, 24941 Flensburg, Nemčija

Medicofarma S.A., ul. Żelazna 58, 00-866 Varšava, Poljska

### **Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:**

Belgija:	Ciprofloxacine "Arrow" 250 mg Filmomhulde Tabletten Ciprofloxacine "Arrow" 500 mg Filmomhulde Tabletten
Češka:	Ciprofloxacine Arrow 250mg Ciprofloxacine Arrow 500mg Ciprofloxacine Arrow 750mg
Danska:	Ciprofloxacine "Arrow" 250 mg Filmovertrukne tabletter Ciprofloxacine "Arrow" 500 mg Filmovertrukne tabletter Ciprofloxacine "Arrow" 750 mg Filmovertrukne tabletter
Nemčija:	Cipro-Q 250mg Filmtabletten Cipro-Q 500mg Filmtabletten Cipro-Q 750mg Filmtabletten
Madžarska:	Ciprofloxacine Arrow 250mg film tableta Ciprofloxacine Arrow 500mg film tableta
Italija:	Ciprofloxacina Arrow 250mg Compresse rivestite con film Ciprofloxacina Arrow 500mg Compresse rivestite con film Ciprofloxacina Arrow 750mg Compresse rivestite con film
Nizozemska:	Ciprofloxacine 250 mg, Filmomhulde tabletten Ciprofloxacine 500 mg, Filmomhulde tabletten Ciprofloxacine 750 mg, Filmomhulde tabletten



Poljska:	Cyprofloksacyna 250mg tabletki powlekane Cyprofloksacyna 500mg tabletki powlekane
Slovaška:	Ciprofloxacín Arrow 250mg filmom obalené tablety Ciprofloxacín Arrow 500mg filmom obalené tablety Ciprofloxacín Arrow 750mg filmom obalené tablety
Slovenija:	Ciprofloksacin Arrow 250 mg filmsko obložene tablete Ciprofloksacin Arrow 500 mg filmsko obložene tablete Ciprofloksacin Arrow 750 mg filmsko obložene tablete
Švedska:	Ciprofloxacín "Arrow" 250 mg Filmdragerad tablet Ciprofloxacín "Arrow" 500 mg Filmdragerad tablet Ciprofloxacín "Arrow" 750 mg Filmdragerad tablet
Velika Britanija:	Ciprofloxacín 250 mg Film-coated Tablets Ciprofloxacín 500 mg Film-coated Tablets Ciprofloxacín 750 mg Film-coated Tablets

**Navodilo je bilo odobreno 12. aprila 2012.**