

Navodilo za uporabo

Ramipril Teva 5 mg tablete Ramipril Teva 10 mg tablete ramipril

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. **Kaj je zdravilo Ramipril Teva in za kaj ga uporabljamo**
2. **Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Ramipril Teva**
3. **Kako jemati zdravilo Ramipril Teva**
4. **Možni neželeni učinki**
5. **Shranjevanje zdravila Ramipril Teva**
6. **Vsebina pakiranja in dodatne informacije**

1. Kaj je zdravilo Ramipril Teva in za kaj ga uporabljamo

- Zdravilo Ramipril Teva vsebuje zdravilno učinkovino ramipril. Ta učinkovina spada v skupino zdravil, ki jih imenujemo zaviralci ACE (zaviralci angiotenzin-konvertaze).
- Zdravilo Ramipril Teva deluje tako, da:
 - v telesu zmanjša nastajanje snovi, ki lahko zvišajo krvni tlak,
 - sprosti in razširi žile,
 - srcu olajša črpanje krvi po telesu.
- Zdravilo Ramipril Teva se lahko uporablja:
 - za zdravljenje visokega krvnega tlaka (hipertenzije),
 - za zmanjšanje tveganja za srčni infarkt ali možgansko kap,
 - za zmanjšanje tveganja za pojav težav z ledvicami ali za upočasnitev njihovega slabšanja (ne glede na to, ali imate sladkorno bolezen ali ne),
 - za zdravljenje srca, ki ne more prečrpati dovolj krvi po telesu (to se imenuje srčno popuščanje),
 - kot zdravljenje po srčnem infarktu (miokardnem infarktu), pri katerem se kot zaplet pojavi srčno popuščanje.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Ramipril Teva

Ne jemljite zdravila Ramipril Teva

- če ste alergični na ramipril, kateri koli drug zaviralec ACE ali katero koli sestavino tega zdravila (naštete so v poglavju 6);
Med znaki alergijske reakcije so lahko izpuščaj, težave s požiranjem ali dihanjem, oteklost ustnic, obraza, žrela ali jezika;
- če ste po jemanju drugih zdravil kdaj imeli resno alergijsko reakcijo, imenovano angioedem. Med njenimi znaki so srbenje, koprivnica (urtikarija), rdeče spremembe na dlaneh, stopalih in žrelu, oteklost žrela in jezika, oteklost okoli oči in ustnic, težko dihanje in težko požiranje;
- če se zdravite z dializo ali kakšno drugo vrsto filtracije krvi. Odvisno od naprave, ki se za to uporablja, zdravilo Ramipril Teva morda ni primerno za vas;

- če imate težave z ledvicami, pri katerih je prekrvavitev ledvic zmanjšana (zožitev ledvične arterije);
- med zadnjimi 6 meseci nosečnosti (glejte poglavje »Nosečnost in dojenje« v nadaljevanju);
- če imate nenormalno nizek ali nestabilen krvni tlak. To mora oceniti zdravnik;
- če imate sladkorno bolezen ali okvarjeno delovanje ledvic in se zdravite z zdravilom za zniževanje krvnega tlaka, ki vsebuje aliskiren;
- ne vzemite zdravila Ramipril Teva, če kaj od naštetega velja za vas. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete zdravilo Ramipril Teva.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Ramipril Teva se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom:

- če imate težave s srcem, jetri ali ledvicami;
- če ste izgubili veliko telesnih soli ali tekočin (zaradi bruhanja, driske, močnejšega znojenja kot po navadi, uživanja diete z malo soli, dolgotrajnega jemanja tablet za odvajanje vode (diuretikov) ali dialize);
- če imate predvideno zdravljenje za odpravljanje alergije na pike čebel ali os (desenzibilizacija);
- če boste dobili anestetik. Dobite ga lahko za operacijo ali zobozdravniški poseg. Morda boste morali en dan pred tem prenehati jemati zdravilo Ramipril Teva; o tem se posvetujte s svojim zdravnikom;
- če imate v krvi veliko kalija (to pokaže preiskava krvi);
- če jemljete zdravila imenovana zaviralci mTOR (npr. temsirolimus, everolimus, sirolimus) ali vildagliptin saj lahko povečajo tveganje za angioedem, ki je resna alergijska reakcija;
- če imate kolagensko žilno bolezen, npr. sklerodermo ali sistemski eritematozni lupus;
- Zdravniku morate povedati če mislite, da ste noseči (ali bi lahko zanosili). V prvih 3 mesecih nosečnosti uporaba zdravila Ramipril Teva ni priporočljiva in lahko resno škoduje vašemu otroku po 3 mesecih nosečnosti (glejte poglavje »Nosečnost in dojenje« v nadaljevanju);
- če jemljete katero od naslednjih zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje visokega krvnega tlaka:
 - antagonist receptorjev angiotenzina II (ARB) (ta zdravila imenujemo tudi "sartani" – mednje spadajo na primer valsartan, telmisartan in irbesartan), še zlasti če imate kakšne težave z ledvicami, ki so povezane s sladkorno boleznijo;
 - aliskiren.

Zdravnik vam bo morda v rednih presledkih kontroliral delovanje ledvic, krvni tlak in količino elektrolitov (npr. kalija) v krvi.

Glejte tudi informacije pod naslovom "Ne jemljite zdravila Ramipril Teva".

Otroci in mladostniki

Zdravila Ramipril Teva ni priporočljivo uporabljati pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let, ker varnost in učinkovitost ramiprila pri otrocih še nista dokazani.

Druga zdravila in zdravilo Ramipril Teva

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta (vključno z zdravili rastlinskega izvora). Zdravilo Ramipril Teva namreč lahko vpliva na delovanje nekaterih drugih zdravil. Tudi nekatera zdravila lahko vplivajo na delovanje zdravila Ramipril Teva.

Obvestite zdravnika, če jemljete katero od naslednjih zdravil, ker bi se lahko delovanje zdravila Ramipril Teva zaradi tega poslabšalo:

- zdravila za lajšanje bolečin in vnetja (npr. nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID), kot so ibuprofen ali indometacin in aspirin);
- zdravila za zdravljenje nizkega krvnega tlaka, šoka, srčnega popuščanja, astme ali alergij, npr. efedrin, noradrenalin ali adrenalin. Zdravnik bo moral preverjati vaš krvni tlak.

Obvestite zdravnika, če jemljete katero od naslednjih zdravil. Ta lahko povečajo možnost za pojav neželenih učinkov, če jih jemljete skupaj z zdravilom Ramipril Teva:

- zdravila za lajšanje bolečin in vnetja (npr. nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID), kot so ibuprofen ali indometacin in aspirin);

- zdravila za zdravljenje raka (kemoterapija);
- zdravila za preprečitev zavrnitve organov po presaditvi, kot sta ciklosporin, takrolimus;
- diuretiki (tablete za odvajanje vode, npr. furosemid);
- zdravila, ki lahko povečajo količino kalija v krvi (npr. spironolakton, triamteren, amilorid, kalijeve soli in heparin, ki se uporablja za redčenje krvi);
- steroidna zdravila proti vnetju (npr. prednizolon);
- alopurinol (uporablja se za znižanje ravni sečne kisline v krvi);
- prokainamid (proti motnjam srčnega ritma);
- trimetoprim in kotrimoksazol (za zdravljenje bakterijskih okužb);
- temsirolimus (za zdravljenje raka);
- sirolimus, everolimus (za preprečevanje zavrnitve presadka);
- vildagliptin (uporablja se za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2).

Zdravnik vam bo morda moral spremeniti odmerek in/ali upoštevati druge previdnostne ukrepe: če jemljete antagoniste receptorjev angiotenzina II (ARB) ali aliskiren (glejte tudi informacije pod naslovoma “Ne jemljite zdravila Ramipril Teva” in “Opozorila in previdnostni ukrepi”).

Obvestite zdravnika, če jemljete katero od naslednjih zdravil, ker bi zdravilo Ramipril Teva lahko vplivalo na njihovo delovanje:

- zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni (npr. peroralna zdravila za zniževanje ravni glukoze in insulin). Zdravilo Ramipril Teva lahko zniža raven sladkorja v krvi. Med jemanjem zdravila Ramipril Teva morate natančno preverjati krvni sladkor;
- litij (za zdravljenje duševnih motenj). Zdravilo Ramipril Teva lahko poveča količino litija v krvi. Zdravnik vam bo moral natančno preverjati količino litija.

Zdravilo Ramipril Teva skupaj s hrano in alkoholom

- Pitje alkoholnih pijač v obdobju, ko jemljete zdravilo Ramipril Teva, lahko povzroči omotico ali vrtoglavico. Če vas skrbi, koliko lahko popijete med jemanjem zdravila Ramipril Teva, se posvetujte z zdravnikom. Učinki zdravil za zniževanje krvnega tlaka in alkohola se lahko seštevajo.
- Zdravilo Ramipril Teva lahko jemljete s hrano ali brez nje.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Nosečnost

Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali bi lahko zanosili).

Zdravila Ramipril Teva ne jemljite v prvih 12 tednih nosečnosti, od 13. tedna naprej pa ga sploh ne smete jemati, ker lahko njegova uporaba med nosečnostjo škoduje otroku.

Če med zdravljenjem z zdravilom Ramipril Teva zanosite, morate o tem nemudoma obvestiti svojega zdravnika. Pred načrtovano nosečnostjo je treba vnaprej opraviti prehod na ustrezno drugačno zdravljenje.

Dojenje

Zdravila Ramipril Teva ne smete jemati, če dojite.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katero koli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

V obdobju jemanja zdravila Ramipril Teva se lahko pojavi omotica. Verjetnost za to je večja, ko začnete jemati zdravilo ali začnete jemati večji odmerek. Če se vam to zgodi, ne vozite in ne uporabljajte orodij ali strojev.

3. Kako jemati zdravilo Ramipril Teva

Pri jemanju tega zdravila vedno natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Jemanje tega zdravila

- Zdravilo zaužijte vsak dan ob istem času.
- Tablete pogoltnite z nekaj tekočine.
- Tablet ne smete zdrobiti ali zgristi.

Zdravljenje visokega krvnega tlaka

- Priporočeni začetni odmerek je 1,25 mg ali 2,5 mg enkrat na dan.
- Zdravnik vam bo prilagajal količino zdravila, dokler vaš krvni tlak ne bo urejen.
- Največji odmerek je 10 mg enkrat na dan.
- Če že jemljete diuretike (tablete za odvajanje vode), vam bo zdravnik pred začetkom zdravljenja z zdravilom Ramipril Teva morda naročil, da diuretike nehate jemati, ali pa vam bo odmerek diuretika zmanjšal.

Za zmanjšanje tveganja za srčni infarkt ali možgansko kap

- Priporočeni začetni odmerek je 2,5 mg enkrat na dan.
- Zdravnik se nato lahko odloči za povečanje odmerka, ki ga jemljete.
- Priporočeni odmerek je 10 mg enkrat na dan.

Zdravljenje za zmanjšanje težav z ledvicami ali upočasnitev njihovega slabšanja

- Zdravljenje je mogoče začeti z odmerkom 1,25 mg ali 2,5 mg enkrat na dan.
- Zdravnik vam bo prilagodil odmerek, ki ga jemljete.
- Priporočeni odmerek je 5 mg ali 10 mg enkrat na dan.

Zdravljenje srčnega popuščanja

- Priporočeni začetni odmerek je 1,25 mg enkrat na dan.
- Zdravnik vam bo prilagodil odmerek, ki ga jemljete.
- Največji odmerek je 10 mg na dan. Po možnosti je treba zdravilo vzeti dvakrat na dan.

Zdravljenje po srčnem infarktu

- Priporočeni začetni odmerek je 1,25 mg enkrat na dan do 2,5 mg dvakrat na dan.
- Zdravnik vam bo prilagodil odmerek, ki ga jemljete.
- Priporočeni odmerek je 10 mg na dan. Po možnosti je treba zdravilo vzeti dvakrat na dan.

Starostniki

- Zdravnik bo zmanjšal začetni odmerek in bo počasneje prilagajal vaše zdravljenje.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Ramipril Teva, kot bi smeli

Tako se posvetujte z zdravnikom ali pojdite v ambulanto za nujno pomoč najbližje bolnišnice. Ne vozite v bolnišnico sami, pelje naj vas nekdo drug ali pa pokličite reševalce. S seboj vzemite ovojnino zdravila, da bo zdravnik vedel, kaj ste vzeli.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Ramipril Teva

Če ste pozabili vzeti odmerek, vzemite običajen odmerek, ko je čas za naslednjega. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjo tableto.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če opazite katerega od naslednjih resnih neželenih učinkov, nehajte jemati zdravilo Ramipril Teva in nemudoma pojdite k zdravniku (morda boste potrebovali nujno zdravniško pomoč):

- oteklost obraza, ustnic ali žrela, kar oteži požiranje ali dihanje, ali srbenje in izpuščaji. To je lahko znak hude **alergijske reakcije** na zdravilo Ramipril Teva;
- hude kožne reakcije, npr. izpuščaji, razjede v ustih, poslabšanje že obstoječe kožne bolezni, pordelost, mehurji ali odstopanje kože (npr. Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza ali multiformni eritem).

Zdravnika morate nemudoma obvestiti, če se pri vas pojavijo:

- hitreje bitje srca, neenakomerno ali močno bitje srca (palpitacije), bolečine v prsih, tiščanje v prsih ali resnejše težave, vključno srčnim infarktom in možgansko kapjo;
- težko dihanje ali kašelj. To sta lahko znaka težav s pljuči;
- večja nagnjenost k podplutbam, dolgotrajnejše krvavitve kot po navadi, kakršne koli krvavitve (npr. krvavitev iz dlesni), vijoličaste pege na koži ali večja nagnjenost k okužbam kot po navadi, vnetje žrela in povišana telesna temperatura, utrujenost, omedlevica, omotica ali bledica. To so lahko znaki težav s krvjo ali kostnim mozgom;
- huda bolečina v želodcu, ki lahko sega v hrbet. To je lahko znak pankreatitisa (vnetja trebušne slinavke);
- povišana telesna temperatura, mrzlica, utrujenost, izguba apetita, bolečine v želodcu, siljenje na bruhanje, porumenelost kože ali očesnih beločnic (zlatenica). To so lahko znaki težav z jetri, npr. hepatitisa (vnetja jeter) ali okvare jeter.

Med drugimi neželenimi učinki so:

Zdravniku morate povedati, če kateri od teh neželenih učinkov postane resen ali traja dlje kot nekaj dni.

Pogosti: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov

- glavobol ali utrujenost;
- omotica. Verjetnost, da se bo pojavila, je večja, ko začnete jemati zdravilo Ramipril Teva ali ko začnete jemati večji odmerek;
- omedlevica, hipotenzija (nenormalno nizek krvni tlak), zlasti če hitro vstanete ali sedete;
- suh dražeč kašelj, vnetje obnosnih votlin (sinuzitis) ali bronhitis, težko dihanje;
- bolečine v želodcu ali črevesu, driska, prebavne težave, siljenje na bruhanje ali bruhanje;
- kožni izpuščaji, z dvignjenim predelom ali brez njega;
- bolečine v prsih;
- krči ali bolečine v mišicah;
- preiskave krvi, ki kažejo več kalija v krvi kot po navadi.

Občasni: pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov

- težave z ravnotežjem (vrtoглаvica);
- srbenje in neobičajne zaznave na koži, npr. odrevenelost, mravljinčenje, zbadanje, pekoč ali gomazeč občutek na koži (parestezije);
- izguba okušanja ali spremenjeno zaznavanje okusov;
- težave s spanjem;
- potrto, tesnoba, izrazitejša živčnost kot po navadi ali nemir;
- zamašen nos, težko dihanje ali poslabšanje astme;
- oteklost črevesa, ki jo imenujemo intestinalni angioedem. Njeni simptomi so npr. bolečine v trebuhu, bruhanje in driska;
- zgaga, zaprtost ali suha usta;
- odvajanje več vode (urina) čez dan kot po navadi;
- močnejše znojenje kot po navadi;
- izguba ali zmanjšanje apetita (anoreksija);

- hitrejše ali neredno bitje srca;
- oteklost rok ali nog. To je lahko znak, da se v telesu zadržuje več vode kot po navadi;
- rdečica;
- zamegljen vid;
- bolečine v sklepih;
- povišana telesna temperatura;
- impotenca pri moških, zmanjšano spolno poželenje pri moških ali ženskah;
- večje število nekaterih belih krvnih celic (eozinofilija) v preiskavah krvi;
- preiskave krvi, ki kažejo spremembe v delovanju jeter, trebušne slinavke ali ledvic.

Redki: pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov

- občutek tresenja ali zmedenosti;
- rdeč in otekel jezik;
- hudo luščenje ali lupljenje kože, srbeč in bulast izpuščaj;
- težave z nohti (npr. zrahljanje ali odstopanje nohtov z nohtne posteljice);
- kožni izpuščaj ali podplutbe;
- pege na koži in hladne okončine;
- rdeče, srbeče, otekle ali solzeče se oči;
- motnje sluha ali zvonjenje v ušesih;
- občutek šibkosti;
- preiskave krvi, ki kažejo zmanjšanje števila rdečih in belih krvnih celic ter krvnih ploščic ali zmanjšanje količine hemoglobina.

Zelo redki: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov

- večja občutljivost za sončno svetlobo kot po navadi.

Neznana: ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov

Zdravniku morate povedati, če kateri od teh neželenih učinkov postane resen ali traja dlje kot nekaj dni:

- težave s koncentracijo;
- oteklost ust;
- preiskave krvi, ki kažejo premalo krvnih celic v krvi;
- preiskave krvi, ki kažejo manj natrija v krvi, kot po navadi;
- prsti na rokah in nogah spremenijo barvo, kadar ste na hladu, ko se ogrejejo, pa postanejo mravljinčasti ali bolijo (Raynaudov fenomen);
- povečanje prsi pri moških;
- počasno ali prizadeto reagiranje;
- pekoč občutek;
- spremembe vonja stvari;
- izpadanje las;
- koncentriran urin (temne barve), slabost ali bruhanje, mišični krči, zmedenost in epileptični krči, ki lahko nastanejo zaradi neustreznega izločanja antidiuretičnega hormona. Če imate katerega od naštetih simptomov, takoj stopite v stik z zdravnikom.

Dodatni neželeni učinki pri otrocih

V kliničnih študijah so bili opaženi naslednji neželeni učinki pri otrocih, starih od 2-16 let:

Pogosti: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov

- zamašen nos;
- hitro bitje srca;
- rdeče, srbeče, otekle ali solzne oči.

Občasni: pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov

- tresenje;
- koprivnica, izpuščaji.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Center za zastrupitve, Zaloška cesta 2, SI-1000 Ljubljana, faks: + 386 (0)1 434 76 46, e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si. S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Ramipril Teva

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte v originalni ovojnini, za zagotovitev zaščite pred vlago.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na zunanji ovojnini. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca. Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije**Kaj vsebuje zdravilo Ramipril Teva**

- Zdravilna učinkovina je ramipril. Ena tableta vsebuje 5 ali 10 mg ramiprila.
- Pomožne snovi so mikrokristalna celuloza, natrijev stearilfumarat in magnezijev hidroksid. 5 mg tablete vsebujejo tudi barvilo železov oksid (E172).

Izgled zdravila Ramipril Teva in vsebina pakiranja

- Ramipril Teva 5 mg tablete so rožnate, okrogle tablete z zarezo na obeh straneh ter vtisnjenim napisom »5« na eni strani in »RL« na drugi strani zareze. Tableto se lahko deli na enaka odmerka.
- Ramipril Teva 10 mg tablete so bele do skoraj bele, okrogle tablete z zarezo na obeh straneh ter vtisnjenim napisom »10« na eni strani in »RL« na drugi strani zareze. Tableto se lahko deli na enaka odmerka.
- 5 mg tablete so na voljo v pakiranjih po 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 200 in 500 tablet. Bolnišnična pakiranja vsebujejo 50, 300 (10 x 30) ali 500 tablet.
- 10 mg tablete so na voljo v pakiranjih po 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 200 in 500 tablet. Bolnišnična pakiranja vsebujejo 50, 300 (10 x 30) ali 500 tablet.
- Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila Ramipril Teva

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec**Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom**

Teva Pharma B.V.
Swensweg 5

2031 GA Haarlem
Nizozemska

Izdellovalci

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Madžarska

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllő, Madžarska

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Nizozemska

TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Velika Britanija

Za zdravilo je izdano dovoljenje za promet v državah članicah EGP pod naslednjimi imeni:

Avstrija	Ramipril Teva 5 mg Tabletten Ramipril Teva 10 mg Tabletten
Belgija	Ramipril Teva 5 mg tabletten Ramipril Teva 10 mg tabletten
Ciper	Ramipril Teva 5 mg Tablets Ramipril Teva 10 mg Tablets
Danska	Ramipril Teva (5 & 10 mg)
Finska	Ramipril Teva 5 mg tabletti Ramipril Teva 10 mg tabletti
Irska	Ramipril Teva 5 mg Tablets Ramipril Teva 10 mg Tablets
Italija	Ramipril Teva Italia 5 mg compresse Ramipril Teva Italia 10 mg compresse
Luksemburg	Ramipril Teva 5 mg comprimés Ramipril Teva 10 mg comprimés
Malta	Ramipril Teva 5 mg Tablets Ramipril Teva 10 mg Tablets
Nemčija	Ramipril Teva 5 mg Tabletten Ramipril Teva 10 mg Tabletten
Nizozemska	Ramipril 5 mg Pharmachemie, tabletten Ramipril 10 mg Pharmachemie, tabletten
Norveška	Ramipril Teva 5 mg tabletter Ramipril Teva 10 mg tabletter
Poljska	5 mg: Ramipril Teva 10 mg: Ramiprilum 123ratio
Portugalska	Ramipril Teva (5 & 10 mg)
Romunija	Tensil 5 mg comprimate Tensil 10 mg comprimate
Slovaška	Ramipril Teva 5 mg Ramipril Teva 10 mg
Slovenija	Ramipril Teva 5 mg tablete Ramipril Teva 10 mg tablete
Španija	Ramipril Teva 5 mg comprimidos EFG Ramipril Teva 10 mg comprimidos EFG
Švedska	Ramipril Teva 5 mg tabletter Ramipril Teva 10 mg tabletter

Velika Britanija Ramipril 5 mg Tablets
 Ramipril 10 mg Tablets

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 09.08.2016.