

## NAVODILO ZA UPORABO

**Valsartan Pfizer 80 mg filmsko obložene tablete**  
**Valsartan Pfizer 160 mg filmsko obložene tablete**  
**Valsartan Pfizer 320 mg filmsko obložene tablete**  
valsartan

### **Pred začetkom jemanja natančno preberete navodilo!**

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujete z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

### **Navodilo vsebuje:**

1. Kaj je zdravilo Valsartan Pfizer in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Valsartan Pfizer
3. Kako jemati zdravilo Valsartan Pfizer
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Valsartan Pfizer
6. Dodatne informacije

## **1. KAJ JE ZDRAVILO VALSARTAN PFIZER IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO**

Valsartan sodi v skupino zdravil, imenovanih antagonisti receptorjev angiotenzina II, ki pomagajo nadzorovati visok krvni tlak. Angiotenzin II je snov v telesu, ki povzroči, da se krvne žile stisnejo, kar povzroči zvišanje krvnega tlaka. Valsartan deluje tako, da zavira delovanje angiotenzina II. Zato se krvne žile sprostijo in krvni tlak se zniža.

Valsartan Pfizer 80 mg filmsko obložene tablete **se lahko uporabljajo za zdravljenje treh različnih stanj:**

- **zdravljenje visokega krvnega tlaka pri odraslih ter pri otrocih in mladostnikih, ki so stari od 6 do 18 let.** Visok krvni tlak povečuje obremenitev srca in arterij. Če ga ne zdravimo, lahko poškoduje krvne žile v možganih, srcu in ledvicah, kar lahko povzroči možgansko kap, srčno popuščanje ali odpoved ledvic. Visok krvni tlak povečuje tveganje za srčni napad. Z znižanjem krvnega tlaka na normalne vrednosti se zmanjša tveganje za razvoj teh bolezni.
- **zdravljenje odraslih bolnikov po nedavnem srčnem napadu** (miokardni infarkt). "Nedavni" pomeni pred 12 urami do 10 dnevi.
- **zdravljenje simptomatskega srčnega popuščanja pri odraslih bolnikih.** Zdravilo Valsartan Pfizer uporabimo takrat, kadar ne moremo uporabiti zdravil iz skupine, ki se imenujejo zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACE) (zdravila pri zdravljenju srčnega popuščanja), lahko pa ga uporabimo poleg zaviralca ACE, kadar ne moremo uporabiti antagonistov adrenergičnih receptorjev beta (druga vrsta zdravil pri zdravljenju srčnega popuščanja). Simptomi srčnega popuščanja vključujejo zadihanost ter otekanje stopal in nog zaradi zastajanja tekočine. Do tega pride takrat, ko srčna mišica ne more dovolj močno črpati krvi, da bi s krvjo oskrbela celotno telo.

Valsartan Pfizer 160 mg filmsko obložene tablete **se lahko uporabljajo za zdravljenje treh različnih stanj:**

- **zdravljenje visokega krvnega tlaka pri odraslih ter pri otrocih in mladostnikih, ki so stari od 6 do 18 let.** Visok krvni tlak povečuje obremenitev srca in arterij. Če ga ne zdravimo, lahko poškoduje krvne žile v možganih, srcu in ledvicah, kar lahko povzroči možgansko kap, srčno popuščanje ali odpoved ledvic. Visok krvni tlak povečuje tveganje za srčni napad. Z znižanjem krvnega tlaka na normalne vrednosti se zmanjša tveganje za razvoj teh bolezni.

- **zdravljenje odraslih bolnikov po nedavnem srčnem napadu** (miokardni infarkt). "Nedavni" pomeni pred 12 urami do 10 dnevi.
- **zdravljenje simptomatskega srčnega popuščenja pri odraslih bolnikih**. Zdravilo Valsartan Pfizer uporabimo takrat, kadar ne moremo uporabiti zdravil iz skupine, ki se imenujejo zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACE) (zdravila pri zdravljenju srčnega popuščenja), lahko pa ga uporabimo poleg zaviralca ACE, kadar ne moremo uporabiti antagonistov adrenergičnih receptorjev beta (druga vrsta zdravil pri zdravljenju srčnega popuščenja). Simptomi srčnega popuščenja vključujejo zadihanost ter otekanje stopal in nog zaradi zastajanja tekočine. Do tega pride takrat, ko srčna mišica ne more dovolj močno črpati krvi, da bi s krvjo oskrbela celotno telo.

Valsartan Pfizer 320 mg filmsko obložene tablete **se lahko uporabljajo za:**

- **zdravljenje visokega krvnega tlaka pri odraslih ter pri otrocih in mladostnikih, ki so stari od 6 do 18 let**. Visok krvni tlak povečuje obremenitev srca in arterij. Če ga ne zdravimo, lahko poškoduje krvne žile v možganih, srcu in ledvicah, kar lahko povzroči možgansko kap, srčno popuščenje ali odpoved ledvic. Visok krvni tlak povečuje tveganje za srčni napad. Z znižanjem krvnega tlaka na normalne vrednosti se zmanjša tveganje za razvoj teh bolezni.

## 2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO VALSARTAN PFIZER

**Ne jemljite zdravila Valsartan Pfizer:**

- če ste **alergični** (preobčutljivi) na valsartan ali katerekoli sestavino zdravila Valsartan Pfizer, ki so navedene na koncu tega navodila,
- če imate **hudo bolezen jeter**,
- če ste noseči **več kot 3 mesece** (tudi v zgodnji nosečnosti se je bolje izogniti jemanju zdravila Valsartan Pfizer) - glejte poglavje "Nosečnost in dojenje".

**Če karkoli od zgoraj navedenega velja za vas, ne jemljite zdravila Valsartan Pfizer.**

**Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Valsartan Pfizer:**

- če imate bolezen jeter,
- če imate hudo bolezen ledvic ali če se zdravite z dializo,
- če imate zožanje ledvične arterije,
- če so vam pred kratkim presadili ledvico (ste prejeli novo ledvico),
- če se zdravite po srčnem napadu ali zaradi srčnega popuščenja; zdravnik bo morda preveril delovanje vaših ledvic,
- če imate hudo bolezen srca, razen srčnega popuščenja in srčnega napada,
- če jemljete zdravila, ki povečujejo količino kalija v krvi. To vključuje kalijeve dodatke ali nadomestke soli, ki vsebujejo kalij, zdravila, ki varčujejo s kalijem in heparin. Morda bo treba v rednih intervalih preverjati količino kalija v vaši krvi;
- če ste mlajši od 18 let in jemljete zdravilo Valsartan Pfizer v kombinaciji z drugimi zdravili, ki zavirajo sistem renin-angiotenzin-aldosteron (zdravila, ki znižujejo krvni tlak), bo zdravnik morda v rednih intervalih preverjal delovanje vaših ledvic in količino kalija v vaši krvi,
- če imate aldosteronizem. To je bolezen, pri kateri vaše nadledvične žleze tvorijo preveč hormona aldosterona. Če to velja za vas, uporaba zdravila Valsartan Pfizer ni priporočljiva;
- če ste izgubili veliko tekočine (dehidracija) zaradi driske, bruhanja ali velikih odmerkov tablet za odvajanje vode (diuretikov),
- zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči, ali **če bi lahko zanosili**. Uporaba zdravila Valsartan Pfizer ni priporočljiva v zgodnjem obdobju nosečnosti, po tretjem mesecu nosečnosti pa se tega zdravila ne sme uporabljati, saj lahko povzroči resno škodo vašemu otroku (glejte poglavje "Nosečnost in dojenje").

**Če karkoli od naštetega velja za vas, obvestite svojega zdravnika, preden začnete jemati zdravilo Valsartan Pfizer.**

## Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Sočasno jemanje nekaterih drugih zdravil lahko vpliva na učinek zdravljenja z zdravilom Valsartan Pfizer. V nekaterih primerih bo treba spremeniti odmerek, izvesti druge ukrepe ali celo prekiniti jemanje katerega od teh zdravil. To velja tako za zdravila na recept kot za tista brez recepta, še zlasti za:

- **druga zdravila za znižanje krvnega tlaka**, posebno **tablete za odvajanje vode** (diuretike),
- **zdravila, ki lahko povečajo količino kalija v vaši krvi**. To vključuje kalijeve dodatke, nadomestke soli, ki vsebujejo kalij, zdravila, ki varčujejo s kalijem in heparin;
- **nekatero vrsto zdravil za lajšanje bolečin**, ki se imenujejo nesteroidna protivnetna zdravila,
- **litij**, zdravilo za zdravljenje nekaterih vrst psihiatričnih bolezni.

## Poleg tega:

- Če se **zdravite po srčnem napadu**, ni priporočljiva uporaba kombinacije z **zaviralci ACE** (zdravila za zdravljenje srčnega napada).
- Če se **zdravite zaradi srčnega popuščanja**, ni priporočljiva uporaba trojne kombinacije z **zaviralci ACE in antagonisti adrenergičnih receptorjev beta** (zdravila za zdravljenje srčnega popuščanja).

## Jemanje zdravila Valsartan Pfizer skupaj s hrano in pijačo

Zdravilo Valsartan Pfizer lahko jemljete s hrano ali brez nje.

## Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

- **Svojemu zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči, ali če bi lahko zanosili.** Zdravnik vam bo običajno svetoval, da prenehate jemati zdravilo Valsartan Pfizer, preden zanosite ali takoj ko izveste, da ste zanosili. Priporočil vam bo jemanje drugega zdravila namesto zdravila Valsartan Pfizer. Jemanje zdravila Valsartan Pfizer v zgodnjem obdobju nosečnosti ni priporočljivo, po tretjem mesecu nosečnosti pa se tega zdravila ne sme jemati, saj lahko povzroči resno škodo vašemu otroku.
- **Povejte svojemu zdravniku, če dojite ali nameravate začeti dojit.** Uporaba zdravila Valsartan Pfizer ni priporočljiva za matere, ki dojijo, zato lahko vaš zdravnik izbere drugo zdravljenje, če želite dojit (še zlasti, če gre za novorojenčka ali nedonošenčka).

## Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Predn začnete voziti, uporabljati orodje, upravljati stroje ali izvajati druge dejavnosti, ki zahtevajo zbranost, morate zagotovo vedeti, kako zdravilo Valsartan Pfizer deluje na vas. Kot številna druga zdravila za zdravljenje visokega krvnega tlaka lahko zdravilo Valsartan Pfizer v redkih primerih povzroči omotico in vpliva na sposobnost koncentracije.

## Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Valsartan Pfizer

To zdravilo vsebuje vsebuje laktozo monohidrat. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

## 3. KAKO JEMATI ZDRAVILO VALSARTAN PFIZER

Pri jemanju zdravila Valsartan Pfizer natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Tako bodo rezultati najboljši in tveganje za pojav neželenih učinkov najmanjše. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Ljudje z visokim krvnim tlakom pogosto ne opazijo nobenih težav, povezanih s tem. Veliko se jih lahko počuti povsem normalno. Zato je zelo pomembno, da hodite na preglede k zdravniku, tudi če se počutite dobro.

**Odrasli bolniki z visokim krvnim tlakom:** Običajni odmerek je 80 mg na dan. V nekaterih primerih lahko zdravnik predpiše višje odmerke (npr. 160 mg ali 320 mg). Zdravilo Valsartan Pfizer lahko doda tudi druga zdravila (npr. diuretike).

**Otroci in mladostniki (stari od 6 do 18 let) z visokim krvnim tlakom:**

Za bolnike s telesno maso pod 35 kg je običajni odmerek 40 mg valsartana enkrat na dan.

Za bolnike s telesno maso 35 kg ali več je običajni začetni odmerek 80 mg valsartana enkrat na dan.

V nekaterih primerih lahko zdravnik predpiše višje odmerke (odmerke lahko zviša na 160 mg oziroma na največ 320 mg).

**Odrasli bolniki po nedavnem srčnem napadu:** Po srčnem napadu zdravljenje večinoma začnemo že 12 ur po napadu z nizkimi odmerki 20 mg dvakrat na dan. Zdravnik bo odmerek v obdobju več tednov postopoma zviševal do največ 160 mg dvakrat na dan. Končni odmerek je odvisen od tega, kako prenašate zdravilo.

Zdravilo Valsartan Pfizer je mogoče jemati skupaj z drugimi zdravili za zdravljenje srčnega napada. O tem, katero zdravljenje je primerno za vas, bo odločil vaš zdravnik.

**Odrasli bolniki s srčnim popuščanjem:** Zdravljenje običajno začnemo s 40 mg dvakrat na dan.

Zdravnik bo odmerek v obdobju več tednov postopoma zviševal do največ 160 mg dvakrat na dan.

Končni odmerek je odvisen od tega, kako prenašate zdravilo.

Zdravilo Valsartan Pfizer je mogoče jemati skupaj z drugimi zdravili za zdravljenje srčnega popuščanja. O tem, katero zdravljenje je primerno za vas, bo odločil vaš zdravnik.

Zdravilo Valsartan Pfizer lahko jemljete s hrano ali brez nje. Tablete zdravila Valsartan Pfizer vzemite s kozarcem vode.

Zdravilo Valsartan Pfizer vzemite vsak dan ob približno istem času.

**Če ste vzeli večji odmerek zdravila Valsartan Pfizer, kot bi smeli**

Če se pojavi huda omotica in/ali omedlevica, nemudoma obvestite svojega zdravnika in se ulezite. Če pomotoma vzamete preveč tablet, pokličite svojega zdravnika, farmacevta ali v bolnišnico.

**Če ste pozabili vzeti zdravilo Valsartan Pfizer**

Če pozabite vzeti odmerek, ga vzemite takoj, ko se spomnite. Če je že skoraj čas za naslednji odmerek, preskočite odmerek, ki ste ga pozabili vzeti.

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

**Če ste prenehali jemati zdravilo Valsartan Pfizer**

Prenehanje zdravljenja z zdravilom Valsartan Pfizer lahko povzroči poslabšanje vaše bolezni. Ne prenehajte jemati zdravila, razen če vam je tako naročil zdravnik.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

#### **4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI**

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Valsartan Pfizer neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Neželeni učinki se pojavljajo s pogostnostjo, ki je opredeljena na naslednji način:

- zelo pogosti: pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov
- pogosti: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov
- občasni: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov
- redki: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov
- zelo redki: pojavijo se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov
- neznan pogostnost: pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

**Nekateri simptomi zahtevajo takojšnjo zdravstveno oskrbo:**

Pojavijo se lahko simptomi angioedema (to je posebna vrsta alergijske reakcije), kot so:

- otekanje obraza, ustnic, jezika ali grla
- težave pri dihanju ali požiranju
- koprivnica, srbenje

**Če se pojavi karkoli od naštetega, pojdite nemudoma k zdravniku.**

**Neželeni učinki vključujejo:****Pogosti:**

- omotica
- nizek krvni tlak s simptomi, kot sta omotica in izguba zavesti pri vstajanju, ali brez teh simptomov
- zmanjšano delovanje ledvic (znaki okvare ledvic)

**Občasni:**

- angioedem (glejte poglavje "Nekateri simptomi zahtevajo takojšnjo zdravstveno oskrbo")
- nenadna izguba zavesti (sinkopa)
- občutek vrtenja (vrtoglavica)
- hudo zmanjšano delovanje ledvic (znaki akutne odpovedi ledvic)
- mišični krči, nenormalen srčni ritem (znaki hiperkaliemije, povečane ravni kalija v krvi)
- zadihanost, težave z dihanjem v ležečem položaju, otekanje stopal in nog (znaki srčnega popuščanja)
- glavobol
- kašelj
- bolečine v trebuhu
- slabost s siljenjem na bruhanje
- driska
- utrujenost
- šibkost

**Neznana pogostnost:**

- lahko pride do alergijskih reakcij z izpuščajem, s srbenjem in koprivnico; vročine, otekanja sklepov in bolečin v sklepih, bolečin v mišicah, otekanja bezgavk in/ali simptomov, podobnih gripi (znaki serumske bolezni)
- škrlatno-rdeči madeži, vročina, srbenje (znaki vnetja krvnih žil, imenovanega vaskulitis)
- nenavadne krvavitve ali modrice (znaki zmanjšane števila krvnih ploščic, imenovanega trombocitopenija)
- bolečine v mišicah (mialgija)
- vročina, vneto grlo ali razjede v ustih zaradi okužbe (simptomi zmanjšanja ravni belih krvnih celic, imenovanega tudi nevtropenija)
- znižana raven hemoglobina in zmanjšan delež rdečih krvnih celic v krvi (ki lahko v hudih primerih povzroči anemijo)
- zvišana raven kalija v krvi (ki lahko v hudih primerih sproži mišične krče in nenormalen srčni ritem)
- zvišane vrednosti pri preiskavah delovanja jeter (kar lahko kaže na poškodbo jeter), vključno z zvišano ravni bilirubina v krvi (ki lahko v hudih primerih povzroči porumenelost kože in oči)
- zvišana raven sečninskega dušika v krvi in zvišana raven kreatinina v serumu (kar lahko kaže na nenormalno delovanje ledvic)
- znižana raven natrija v krvi (kar lahko povzroča utrujenost, zmedenost in v hujših primerih trzanje mišic in/ali napad mišičnih krčev)

Pogostnost nekaterih neželenih učinkov lahko niha glede na vaše stanje. Tako so na primer neželeni učinki, kot sta omotica ali zmanjšano delovanje ledvic, manj pogosta pri odraslih bolnikih, ki se zdravijo zaradi visokega krvnega tlaka, kot pri odraslih bolnikih, ki se zdravijo zaradi srčnega popuščanja ali po nedavnem srčnem napadu.

Pri otrocih in mladostnikih so neželeni učinki podobni kot pri odraslih.

**Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.**

## 5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA VALSARTAN PFIZER

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Valsartan Pfizer ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 30° C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

## 6. DODATNE INFORMACIJE

### **Kaj vsebuje zdravilo Valsartan Pfizer**

- Zdravilna učinkovina je valsartan. Ena filmsko obložena tableta vsebuje 80 mg, 160 mg ali 320 mg valsartana.
- Pomožne snovi so:

*Jedro tablete:* mikrokristalna celuloza (E460), laktoza monohidrat, brezvodni koloidni silicijev dioksid (E551), krospovidon (tip B), hipromeloza (E464), natrijev lavrilsulfat, smukec (E553b), magnezijev stearat (E572).

*Obloga tablete:* hipromeloza (E464), titanov dioksid (E171), makrogol 8000, rumeni železov oksid (E172), rdeči železov oksid (E172), črni železov oksid (E172) (le za 320 mg tablete).

### **Izgled zdravila Valsartan Pfizer in vsebina pakiranja**

#### Valsartan Pfizer 80 mg filmsko obložene tablete

Bledo rdeče, okrogle, bikonveksne filmsko obložene tablete s prirezanimi robovi, z vtisnjeno oznako "I" na eni strani in "74" na drugi strani, z razdelilno zarezo, ki loči 7 in 4.

Tableta se lahko deli na enaki polovici.

#### Valsartan Pfizer 160 mg filmsko obložene tablete

Sivo-oranžne, ovalne, bikonveksne filmsko obložene tablete s prirezanimi robovi, z vtisnjeno oznako "I" na eni strani in "75" na drugi strani, z razdelilno zarezo, ki loči 7 in 5.

Tableta se lahko deli na enaki polovici.

#### Valsartan Pfizer 320 mg filmsko obložene tablete

Temno sivo-vijolične, ovalne, bikonveksne filmsko obložene tablete s prirezanimi robovi, z vtisnjeno oznako "I" na eni strani in "18" na drugi strani, z razdelilno zarezo ki loči 1 in 8.

Tableta se lahko deli na enaki polovici.

#### Prozoren PVC/Aclar/aluminijast pretisni omot

80 in 160 mg: 14, 28, 30, 56, 90 ali 98 tablet

320 mg: 28, 30, 56 ali 98 tablet

#### HDPE vsebnik s PP zaporko

80 in 160 mg: 90 ali 1.000 tablet

320 mg: 90 ali 500 tablet

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

### Način in režim izdaje zdravila Valsartan Pfizer

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

### Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luksemburg

### Izdelovalci

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgija

Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29, route des Industries, 37530 Pocé-Sur-Cisse, Francija

Pfizer Italia S.r.l, Località Marino del Tronto, 63100 - Ascoli Piceno (AP), Italija

### To zdravilo je odobreno v državah članicah EGP z naslednjimi imeni:

Avstrija	Valsartan Pfizer 40 mg Filmtabletten Valsartan Pfizer 80 mg Filmtabletten Valsartan Pfizer 160 mg Filmtabletten Valsartan Pfizer 320 mg Filmtabletten
Belgija	Valsartan Pfizer 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg comprimés pelliculés Valsartan Pfizer 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg filmomhulde tabletten Valsartan Pfizer 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg Filmtabletten
Češka	Valsartan Pfizer
Danska	Valsartan Pfizer
Estonija	Valsartan Pfizer
Finska	Valsartan Pfizer
Francija	VALSARTAN PFIZER 40 mg, comprimé pelliculé sécable VALSARTAN PFIZER 80 mg, comprimé pelliculé sécable VALSARTAN PFIZER 160 mg, comprimé pelliculé sécable
Nemčija	Valsartan Pfizer 40 mg/80 mg/160 mg/320 mg Filmtabletten
Grčija	Valsartan Pfizer
Madžarska	Valsartan Pfizer 40 mg/80 mg/160 mg/320 mg filmtabletta
Irska	Valsartan 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg film-coated tablets
Italija	Valsartan Pfizer
Latvija	Valsartan Pfizer
Litva	Valsartan Pfizer 80mg plėvele dengtos tabletės Valsartan Pfizer 160mg plėvele dengtos tabletės Valsartan Pfizer 320mg plėvele dengtos tabletės
Luksemburg	Valsartan Pfizer 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg comprimés pelliculés
Nizozemska	Valsartan Pfizer 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg filmomhulde tabletten
Norveška	Valsartan Pfizer
Poljska	Valsartan Pfizer
Portugalska	Valsartan Parke-Davis
Romunija	Valsartan Pfizer
Slovaška	Valsartan Pfizer
Slovenija	Valsartan Pfizer 80 mg, 160 mg, 320 mg filmsko obložene tablete
Španija	Valsartan Pharmacia 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Švedska	Valsartan Pfizer
Velika Britanija	Valsartan 40 mg, 80 mg, 160 mg & 320 mg film-coated tablets

Navodilo je bilo odobreno: 6.10.2011