

NAVODILO ZA UPORABO

Canesten 10 mg/g dermalni prašek klotrimazol

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 4 tednih, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Canesten dermalni prašek in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Canesten dermalni prašek
3. Kako uporabljati zdravilo Canesten dermalni prašek
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Canesten dermalni prašek
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO CANESTEN DERMALNI PRAŠEK IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Canesten dermalni prašek je protiglivično zdravilo za lokalno zdravljenje. Vsebuje zdravilno učinkovino **klotrimazol**, ki deluje proti glivicam in tudi proti nekaterim drugim mikroorganizmom.

Zdravilo Canesten dermalni prašek uporabljamo za nadaljnje zdravljenje (po končanem zdravljenju z zdravilom Canesten krema, Canesten dermalna raztopina ali Canesten dermalno pršilo, raztopina):

- glivične okužbe stopal (tinea pedum ali »atletsko stopalo«) in rok (tinea manuum), ki se kaže kot pojav mehurčkov in luščenja kože na stopalih oziroma dlaneh ter tudi med prsti. Na prizadetih delih koža razpoka, lahko se pojavi srbenje, vnetje in oteklina;
- glivične okužbe kože na trupu, udih, kožnih pregibih (tinea corporis) in dimljah (tinea inguinalis), ki se kaže kot ovalne, rdeče, obročaste lise, ki se širijo in so na sredini svetlejše;
- glivične okužbe kože, imenovane pityriasis versicolor, ki se kaže kot pojav lis različnih barv npr. rumenorjave, rožnate ali svetlejše od barve kože. Lise se lahko drobno luščijo in redko srbijo;
- bakterijske okužbe kože, imenovane eritrazma, ki se kaže kot rdečerjave ali rožnate lise in se običajno pojavi v pregibih kože (pod pazduho, pod prsmi ali v dimljah) in je dolgotrajna (kronična) okužba.

Zdravilo Canesten dermalni prašek absorbira vlago in suši površino kože. Tako je vlaga, ki je potrebna za rast glivic, odstranjena. Zdravilo Canesten dermalni prašek ne vsebuje smukca in je brez vonja.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO CANESTEN DERMALNI PRAŠEK

Ne uporabljajte zdravila Canesten dermalni prašek

- če ste alergični (preobčutljivi) na klotrimazol ali katerikoli sestavino zdravila Canesten dermalni prašek.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Canesten dermalni prašek

- izogibajte se stiku zdravila z očmi. Zdravila ne pogoltnite.

Uporaba drugih zdravil

Ni znano, ali bi lahko prišlo do medsebojnega delovanja med zdravilom Canesten dermalni prašek in drugimi zdravili.

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Nosečnost

V prvih treh mesecih nosečnosti je uporaba zdravila Canesten dermalni prašek dovoljena le, če vam je tako svetoval zdravnik.

Dojenje

Zaradi majhne resorpcije po dermalni uporabi se domneva, da uporaba zdravila med dojenjem ne vpliva na dojenčka. Če dojite, zdravila Canesten dermalni prašek ne smete nanašati na dojke.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Vpliva zdravila Canesten dermalni prašek na sposobnost vožnje ali upravljanja s stroji niso opazili.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO CANESTEN DERMALNI PRAŠEK

Pri uporabi zdravila Canesten dermalni prašek natančno upoštevajte navodila, ki so navedena v nadaljevanju, razen, če vam je zdravnik svetoval drugače. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Če navodil ne boste natančno upoštevali, zdravilo ne bo pravilno delovalo.

Zdravilo Canesten dermalni prašek je namenjeno samo za uporabo na koži (za dermalno uporabo). Če je potrebno, se zdravilo Canesten dermalni prašek lahko uporablja izmenično z drugimi oblikami zdravila Canesten, npr. s kremo ali z raztopino. Prizadeto mesto pred uporabo praška umijte in posušite. Pri glivicah na nogah je treba noge po vsakem umivanju skrbno obrisati (tudi prostor med prsti) in zdravilo ponovno nanesti.

Odmerjanje

Prizadete dele kože posipajte s praškom 2- do 3-krat na dan.

Trajanje zdravljenja

Trajanje zdravljenja je odvisno od vrste okužbe in od časa, v katerem izginejo simptomi okužbe. Simptomi običajno izginejo, če traja zdravljenje:

- | | |
|---|--------------|
| • glivične okužbe rok, nog, kože na trupu, pregibov | 3 do 4 tedne |
| • okužbe, imenovane eritrazma | 2 do 4 tedne |
| • okužbe, imenovane pityriasis versicolor | 1 do 3 tedne |

Zdravljenje z zdravilom Canesten dermalni prašek naj ne traja dlje od 4 tednov.

Če po 4 tednih zdravljenja ne opazite izboljšanja simptomov, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Kaj še lahko naredite za zdravljenje okužbe?

Perilo, oblačila in brisače, ki pridejo v stik s prizadetim delom, je treba zamenjati vsak dan. To bo pomagalo pri zdravljenju in preprečilo okužbo drugih delov telesa in drugih ljudi.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Canesten dermalni prašek, kot bi smeli

Podatkov, da bi uporaba prevelike količine zdravila Canesten dermalni prašek povzročila neželene učinke, ni.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Canesten dermalni prašek ga uporabite takoj, ko se spomnite. Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Če ste prenehali uporabljati zdravilo Canesten dermalni prašek

Če želite okužbo popolnoma pozdraviti in preprečiti njeno ponovitev, zdravljenja ne smete končati predčasno ali takoj, ko izginejo simptomi okužbe. Če se za to vseeno odločite, tvegate, da se bo bolezen ponovila.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Canesten dermalni prašek neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Poročila o neželenih učinkih temeljijo na spontanih poročilih po začetku trženja zdravila, zato razvrstitev po pogostosti ni mogoča. Poročali so o naslednjih neželenih učinkih:

- alergijska reakcija, ki se kaže kot srbeč kožni izpuščaj (koprivnica), oteženo dihanje, znižan krvni tlak, omedlevica,
- kožne reakcije, kot so pojav mehurjev na koži, nelagodje/bolečina, oteklina, draženje kože, lupljenje/luščenje kože, izpuščaj, zbadanje/pekoč občutek na koži.

Če se naštetih neželenih učinkov pojavijo prvič ali če se stanje poslabša, prenehajte uporabljati zdravilo Canesten dermalni prašek in se posvetujte z zdravnikom.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA CANESTEN DERMALNI PRAŠEK

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila Canesten dermalni prašek ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Canesten dermalni prašek

- Zdravilna učinkovina je klotrimazol. 1 g dermalnega praška vsebuje 10 mg klotrimazola.
- Pomožna snov je rižev škrob.

Izgled zdravila Canesten dermalni prašek in vsebina pakiranja

Dermalni prašek je bel in brez vonja. Pakiran je v škatle s plastičnim vsebnikom s 30 g dermalnega praška z zaporko s posipnikom in navojno zaporko.

Način izdaje zdravila Canesten dermalni prašek

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Bayer d. o. o., Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana

Izdelovalec

Bayer Healthcare Manufacturing S.r.l., Via delle Groane 126, 20024 Garbagnate Milanese,
Italija

Navodilo je bilo odobreno

08.10.2010