

Navodilo za uporabo

Symbicort 160 mikrogramov/4,5 mikrograma na vdih inhalacijska suspenzija pod tlakom budezonid/formoterolijev fumarat dihidrat

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Symbicort in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Symbicort
3. Kako uporabljati zdravilo Symbicort
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Symbicort
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Symbicort in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Symbicort v inhalatorju se uporablja za zdravljenje simptomov kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) pri odraslih, starih 18 let in starejših. KOPB je dolgotrajna bolezen dihal in pljuč, ki jo pogosto povzroča kajenje. Zdravilo Symbicort vsebuje dve različni zdravili: budezonid in formoterolijev fumarat dihidrat.

- Budezonid spada v skupino zdravil, imenovanih "kortikosteroidi". Deluje tako, da zmanjša in prepreči otekanje in vnetje v pljučih.
- Formoterolijev fumarat dihidrat spada v skupino zdravil, imenovanih "dolgodelujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β_2 " ali "bronhodilatatorji". Deluje tako, da sprošča mišice v dihalih. Tako pomaga olajšati dihanje.

Tega zdravila ne uporabljajte kot »inhalator z olajševalcem« (zdravilo s hitrim nastopom delovanja, ki zmanjšuje občutek težkega dihanja).

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Symbicort

Ne uporabljajte zdravila Symbicort:

- če ste alergični na budezonid, formoterol ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Symbicort se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom:

- če imate sladkorno bolezen;
- če imate kakšno okužbo pljuč;
- če imate visok krvni tlak ali ste kdaj imeli težave s srcem (vključno z neenakomernim bitjem srca, zelo hitrim srčnim utripom, zožitvijo arterij ali srčnim popuščanjem);
- če imate težave s ščitnico ali nadledvičnimi žlezami;
- če imate nizke vrednosti kalija v krvi;

- če imate hude težave z jetri.
- Obvestite zdravnika, če se pojavijo zamegljen vid ali druge motnje vida.

Otroci in mladostniki

Zdravilo Symbicort ni priporočljivo za otroke in mladostnike, mlajše od 18 let.

Druga zdravila in zdravilo Symbicort

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Še zlasti morate zdravniku ali farmacevtu povedati, če uporabljate katero od naslednjih zdravil:

- beta blokatorje oz. zaviralce (npr. atenolol ali propranolol za zdravljenje visokega krvnega tlaka), tudi če so v kapljicah za oči (npr. timolol za glavkom).
- zdravila za zdravljenje hitrega ali neenakomernega bitja srca (npr. kinidin).
- zdravila, kot je digoksin, ki se pogosto uporabljajo za zdravljenje srčnega popuščanja.
- diuretike, imenujemo jih tudi "tablete za odvajanje vode" (npr. furosemid). Uporabljajo se za zdravljenje visokega krvnega tlaka.
- steroidna zdravila za peroralno uporabo (npr. prednizolon).
- ksantinska zdravila (npr. teofilin ali aminofilin). Pogosto se uporabljajo za zdravljenje KOPB ali astme.
- druge bronhodilatatorje (npr. salbutamol).
- triciklične antidepresive (npr. amitriptilin) in antidepresiv nefazodon.
- fenotiazinska zdravila (npr. klorpromazin in proklorperazin).
- zdravila, imenovana "zaviralci proteaz HIV" (npr. ritonavir), za zdravljenje okužbe s HIV.
- zdravila za zdravljenje okužb (npr. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromicin in telitromicin).
- zdravila za zdravljenje Parkinsonove bolezni (npr. levodopa).
- zdravila za zdravljenje težav s ščitnico (npr. levotiroksin).

Če kaj od naštetega velja za vas, ali če niste prepričani, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden uporabite zdravilo Symbicort.

Zdravniku ali farmacevtu morate tudi povedati, če imate zaradi kakšne operacije ali zobozdravstvenega posega predvideno splošno anestezijo.

Nosečnost, dojenje in plodnost

- Če ste noseči ali načrtujete zanositev, se pred uporabo zdravila Symbicort posvetujte z zdravnikom – ne uporabljajte zdravila Symbicort, če vam tega izrecno ne naroči zdravnik.
- Če med zdravljenjem z zdravilom Symbicort zanosite, zdravila Symbicort ne nehajte uporabljati, se pa takoj posvetujte z zdravnikom.
- Če dojite, se posvetujte z zdravnikom, preden uporabite zdravilo Symbicort.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Symbicort nima ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje, uporabe orodij in upravljanja strojev.

3. Kako uporabljati zdravilo Symbicort

- Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Pomembno je, da zdravilo Symbicort uporabite vsak dan, tudi če trenutno nimate simptomov KOPB.

Običajen odmerek sta 2 vdihava dvakrat na dan. Zdravilo Symbicort ni priporočljivo za otroke in mladostnike, mlajše od 18 let.

Če zaradi KOPB jemljete tablete, ki vsebujejo steroide, vam bo zdravnik morda zmanjšal število tablet, ki jih jemljete, ko boste začeli uporabljati zdravilo Symbicort. Če tablete, ki vsebujejo steroide jemljete že dolgo, vas bo zdravnik morda od časa do časa napotil na preiskave krvi. Po zmanjšanju tablet, ki vsebujejo steroide se vam lahko pojavi splošno slabo počutje, čeprav se pljučni simptomi izboljšajo. Pojavijo se vam lahko simptomi, kot so zamašenost nosu ali izcedek iz nosu, šibkost, bolečine v sklepih ali mišicah ali izpuščaj (ekcem). Če je kateri od teh simptomov moteč, ali če se vam pojavijo simptomi, kot so glavobol, utrujenost, občutek slabosti s siljenjem na bruhanje ali bruhanje, se morate nemudoma posvetovati z zdravnikom. Če se vam pojavijo simptomi alergije ali artritisa, boste morda morali jemati drugo zdravilo. Če vas skrbi, ali naj še naprej uporabljate zdravilo Symbicort, se posvetujte z zdravnikom.

Med obdobji stresa (npr. če imate kakšno pljučno okužbo ali pred operacijo) vam bo zdravnik morda poleg vašega običajnega zdravljenja predpisal še tablete, ki vsebujejo steroide.

Pomembne informacije o simptomih KOPB

Če se vam med zdravljenjem z zdravilom Symbicort zdi, da dihanje postaja težje ali piskajoče, zdravilo Symbicort uporabljajte še naprej, vendar pa čim prej obiščite zdravnika, kajti morda boste potrebovali dodatno zdravljenje.

Nemudoma se posvetujte z zdravnikom:

- če se vam dihanje slabša ali se ponoči pogosto zbudite zaradi težkega dihanja.
- če se vam začne zjutraj pojavljati občutek stiskanja v prsih ali takšno stiskanje traja dalj časa kot po navadi.
- ti znaki lahko pomenijo, da KOPB ni dobro obvladana in morda boste morali takoj dobiti drugačna ali dodatna zdravila.

Zdravnik vam lahko za KOPB predpiše tudi druge bronhodilatatorje, npr. antiholinergike (npr. tiotropijev ali ipratropijev bromid).

Informacije o zdravilu Symbicort

- Preden začnete uporabljati zdravilo Symbicort, ga odstranite iz folije in jo zavržite. Zavržite tudi sušilno sredstvo, ki je v foliji. Če se sušilno sredstvo nahaja zunaj svojega zavojčka, inhalatorja ne uporabite.
- Potem ko inhalator vzamete iz njegove folije, ga morate porabiti v 3 mesecih. Zapišite si datum izteka roka uporabnosti (3 mesece od odprtja folije) na nalepko inhalatorja, da se boste spomnili, kdaj morate inhalator prenehati uporabljati.
- Deli inhalatorja so prikazani na sliki. Ko boste inhalator dobili, bo že sestavljen. Ne razstavljajte ga. Če se kovinski vsebnik sprosti, ga dajte nazaj v inhalator in inhalator uporabljate še naprej.




Priprava zdravila Symbicort

Inhalator morate pripraviti za uporabo v naslednjih primerih:

- Ko prvič uporabite nov inhalator Symbicort.
- Če inhalatorja niste uporabljali več kot 7 dni.
- Če vam je inhalator padel iz rok.

Da boste inhalator pripravili za uporabo, upoštevajte spodnja navodila:

1. Inhalator dobro pretresite (vsaj 5 sekund), da boste premešali vsebino kovinskega vsebnika z aerosolom.
2. Z rahlim pritiskom na izboklini ob straneh odstranite pokrovček ustnika. Trak na pokrovčku ustnika bo ostal pritrjen na inhalator.
3. Držite inhalator pokonci. Nato pritisnite števec (na vrhu inhalatorja), da boste razpršek sprožili v zrak. Uporabite lahko eno ali obe roki, kot prikazujeta sliki.



4. Odmaknite prst(e) s števca.
5. Počakajte 10 sekund, dobro pretresite in nato ponovite 3. in 4. korak.
6. Inhalator je zdaj pripravljen za uporabo.

Kako vdihniti

Pri vsakem vdihovanju zdravila upoštevajte spodnja navodila:

1. Inhalator dobro pretresite (vsaj 5 sekund), da boste premešali vsebino kovinskega vsebnika z aerosolom.
2. Z rahlim pritiskom na izboklini ob straneh odstranite pokrovček ustnika. Preverite, da ustnik ni zamašen.
3. Držite inhalator pokonci (z eno ali obema rokama). Počasi izdihnite.
4. Previdno namestite ustnik med zobe. Zaprite ustnice.
5. Začnite počasi in globoko vdihovati skozi usta. Trdno pritisnite števec (na vrhu inhalatorja), da boste sprostili vdih. Po pritisku na števec kratek čas še naprej vdihujte. Vdih in hkrati pritisk na števec, zagotavlja da zdravilo doseže pljuča.
6. Zadržite dih za 10 sekund oz. kolikor dolgo lahko, da vam ni neprijetno.
7. Preden izdihnete, odmaknite prst s števca in vzemite inhalator iz ust. Inhalator držite pokonci.
8. Potem počasi izdihnite. Za ponovno vdihavanje inhalator dobro pretresite (vsaj 5 sekund) in ponovite korake od 3. do 7.
9. Znova namestite pokrovček ustnika.
10. Po jutranjem in večernem odmerku si usta splaknite z vodo in jo izpljunite.



Uporaba nastavka


Zdravnik, medicinska sestra ali farmacevt vam lahko predlagajo, da uporabljate poseben nastavek (npr. **AeroChamber Plus Flow Vu ali AeroChamber Plus**). Upoštevajte navodila, ki so priložena nastavku.

Čiščenje inhalatorja Symbicort


- Notranjost in zunanost ustnika vsaj enkrat na teden obrišite s suho krpico.
- Ne uporabljajte vode ali drugih tekočin in ne jemljite kovinskega vsebnika iz inhalatorja.

Kako naj vem, kdaj zamenjati inhalator Symbicort?

- Števec na vrhu inhalatorja kaže, koliko vdihov (sprožitvev) je še v inhalatorju Symbicort. Začne se s 120 vdih, ko je poln.



- Pri vsakem vdihavanju ali sprožitvi razprška v zrak, se puščica pomakne navzdol in se pomika proti ničli ("0").
- Ko puščica preide v rumeno območje, to pomeni, da ostaja še približno 20 vdihov.



- Ko puščica doseže "0", morate inhalator Symbicort nehati uporabljati. Morda se vam bo zdelo, da inhalator še ni prazen in da še deluje. Toda če ga boste uporabljali še naprej, ne boste dobili prave količine zdravila.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Symbicort, kot bi smeli

Če ste uporabili več zdravila Symbicort, kot bi smeli, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Pojavijo se vam lahko tresenje, glavobol ali hitro bitje srca.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Symbicort

- Če ste pozabili uporabiti odmerek, ga uporabite, takoj ko se spomnite. Če pa je že skoraj čas za naslednji odmerek, izpustite pozabljeni odmerek.
- **Ne vzemite dvojnega odmerka**, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če ste prenehali uporabljati zdravilo Symbicort

Preden prenehate uporabljati zdravilo Symbicort, se morate posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom. Če ste prenehali uporabljati zdravilo Symbicort, se vam lahko znaki in simptomi KOPB poslabšajo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če se vam pojavi kaj od naslednjega, prenehajte uporabljati zdravilo Symbicort in se nemudoma posvetujte z zdravnikom:

- oteklost obraza, zlasti okrog ust (jezik in/ali žrelo in/ali težave s požiranjem), izpuščaj ali koprivnica, skupaj s težkim dihanjem (angioedem) in/ali nenadnim občutkom omedlevice. To lahko pomeni, da imate alergijsko reakcijo. To se zgodi redko, pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov.
- nenadno akutno piskajoče dihanje ali težko dihanje nemudoma po uporabi inhalatorja. Če se pojavi kateri od teh simptomov, takoj nehajte uporabljati zdravilo Symbicort in uporabite

"inhalator z olajševalcem". Nemudoma se posvetujte z zdravnikom, kajti morda boste potrebovali spremembo zdravljenja. To se zgodi zelo redko, pojavi se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov.

Drugi možni neželeni učinki:

Pogosti (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov)

- neprijeten občutek ob močnem in hitrem bitju srca (palpitacije), drhtenje ali tresenje. Če se ti učinki pojavijo, so po navadi blagi in po navadi izginejo med nadaljevanjem zdravljenja z zdravilom Symbicort.
- glivična okužba ("gobice") v ustih. Pojav tega je manj verjeten, če si po uporabi zdravila Symbicort usta splaknete z vodo, ki jo nato izpljunete.
- blago vnetje žrela, kašelj in hripavost
- glavobol
- pljučnica (okužba pljuč) pri bolnikih s KOPB

Svojemu zdravniku morate povedati, če imate med jemanjem zdravila Symbicort kar koli od naštetega, ker so to lahko simptomi okužbe pljuč:

- zvišano telesno temperaturo ali mrzlico
- obilnejše nastajanje sluzi, spremenjeno barvo sluzi
- močnejši kašelj ali več težav z dihanjem

Občasni (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov)

- nemir, živčnost ali vznemirjenost
- motnje spanja
- omotica
- občutek slabosti s siljenjem na bruhanje (navzea)
- hitro bitje srca
- podplutbe na koži
- mišični krči
- zamegljen vid

Redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov)

- izpuščaj, srbenje
- bronhospazem (krči mišic dihalnih poti, ki povzročijo piskajoče dihanje). Če se piskajoče dihanje pojavi nenadoma po uporabi zdravila Symbicort, prenehajte uporabljati zdravilo Symbicort in se takoj posvetujte z zdravnikom.
- nizke vrednosti kalija v krvi
- neenakomerno bitje srca

Zelo redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov)

- depresija
- spremembe vedenja, zlasti pri otrocih
- bolečina ali tiščanje v prsih (angina pektoris)
- zvečana koncentracija sladkorja (glukoze) v krvi
- spremembe okusa, npr. neprijeten okus v ustih
- spremembe krvnega tlaka

Inhalacijski kortikosteroidi lahko vplivajo na normalno nastajanje steroidnih hormonov v telesu, zlasti če dolgo časa uporabljate velike odmerke. Med učinki so:

- spremembe mineralne gostote kosti (redčenje kosti)
- katarakta (motnost očesne leče)
- glavkom (zvišan tlak v očesu)
- upočasnjena rast pri otrocih in mladostnikih
- vpliv na nadledvični žlezi (majhni žlezi, ki ležita nad ledvicami)

Ti učinki so med uporabo inhalacijskih kortikosteroidov mnogo manj verjetni kot med uporabo kortikosteroidov v obliki tablet.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks: +386 (0)8 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Symbicort

- Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
- Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki, škatli ali foliji poleg oznake »EXP«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.
- Kot pri večini zdravil za vdihavanje v vsebnikih pod tlakom se tudi učinek tega zdravila lahko zmanjša, če je vsebnik mrzel. Za najboljši učinek mora biti zdravilo pred uporabo na sobni temperaturi. Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzujte. Zaščitite pred mrazom in neposredno sončno svetlobo.
- Potem ko inhalator vzamete iz folije, ga morate porabiti v 3 mesecih. Zapišite si datum izteka roka uporabnosti (3 mesece od odprtja folije) na nalepko inhalatorja, da se boste spomnili, kdaj morate inhalator prenehati uporabljati.
- Po uporabi inhalatorja na ustnik vedno dobro namestite njegov pokrovček, da se s tleskom zaskoči.
- Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

Opozorilo: Kovinski vsebnik vsebuje tekočino pod tlakom. Ne izpostavljajte je temperaturam nad 50 °C. Kovinskega vsebnika ne smete lomiti, prebadati ali sežigati niti tedaj, ko se zdi prazen.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Symbicort

Učinkovini sta budezonid in formoterolijev fumarat dihidrat. En vdih (sprožitev) vsebuje 160 mikrogramov budezonida in 4,5 mikrograma formoterolijevega fumarat dihidrata.

Druge sestavine zdravila so apafluran (HFA 227), povidon in makrogol. To je inhalator brez CFC.

Izgled zdravila Symbicort in vsebina pakiranja

Zdravilo Symbicort je inhalator, ki vsebuje vaše zdravilo. Kovinski tlačni vsebnik, z nameščenim števcem odmerkov, vsebuje belo suspenzijo za inhaliranje. Kovinski vsebnik je nameščen v rdeč

plastičen sprožilnik, opremljen z belim plastičnem ustnikom in sivim plastičnim zaščitnim pokrovčkom. Potem, ko je pripravljen za uporabo, vsebuje en inhalator 120 odmerkov (vdihov). Vsak inhalator je posamezno pakiran v folijo, ki vsebuje sušilno sredstvo.

Zdravilo Symbicort 160 mikrogramov/4,5 mikrograma na vdih inhalacijska suspenzija pod tlakom (budezonid/formoterolijev fumarat dihidrat) je na voljo v pakiranjih z enim inhalatorjem.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Symbicort

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Švedska

Proizvajalec:

AstraZeneca Dunkerque Production
224 avenue de la Dordogne
59640 Dunkerque
Francija

Zdravilo je v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora in Združenem kraljestvu (Severnem Irskem) pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Država	Ime zdravila in jakost
Avstrija	Symbicort 160 Mikrogramm /4,5 Mikrogramm/Inhalation Druckgasinhalation, Suspension
Belgija	Symbicort 160 microgram /4,5 microgram/inhalatie, aérosol, suspensie Symbicort 160 microgrammes /4,5 microgrammes/inhalation, suspension pour inhalation en flacon pressurisé Symbicort 160 Mikrogramm /4,5 Mikrogramm/Inhalation, Druckgasinhalation, Suspension
Bolgarija	Симбикорт 160 микрограма /4,5 микрограма/впръскване Суспензия под налягане за инхалация
Hrvaška	Symbicort 160 mikrograma /4,5 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija
Ciper	Symbicort 160 μικρογραμμάρια /4,5 μικρογραμμάρια/ψεκασμό
Češka	Symbicort 160 mikrogramů /4,5 mikrogramů
Danska	Symbicort 160 mikrogram /4.5 mikrogram/inhalation
Estonija	Symbicort
Finska	Symbicort 160 mikrog /4.5 mikrog/inhalaatio
Francija	Symbicort 200 microgrammes /6 micro grammes par inhalation, suspension pour inhalation en flacon pressurisé
Nemčija	Symbicort 160 Mikrogramm /4,5 Mikrogramm/ pro Inhalation Druckgasinhalation, Suspension
Grčija	Symbicort 160 μικρογραμμάρια /4,5 μικρογραμμάρια/ψεκασμό
Madžarska	Symbicort 4,5 mikrogramm /160 mikrogramm/ adag túlnyomásos inhalációs szuszpenzió
Islandija	Symbicort 160 mikrógrömm /4,5 mikrógrömm/ inhalation
Irška	Symbicort 200 micrograms /6 micrograms/inhalation
Italija	Symbicort
Latvija	Symbicort 160 mikrogrami /4.5 mikrogrami/ inhalācijā, izsmidzinājumā, aerosols inhalācijām zem spiediena
Litva	Symbicort 160 mikrogramų/4,5 mikrogramo/išpurškime suslętoji įkvepiamoji suspensija

Luksemburg	Symbicort 160 microgrammes /4,5 microgrammes/inhalation, suspension pour inhalation en flacon pressurisé
Malta	Symbicort 200 micrograms /6 micrograms/inhalation
Nizozemska	Symbicort 200/6, 200 microgram /6 microgram/inhalatie
Norveška	Symbicort 160 mikrogram /4.5 mikrogram/ inhalasjon
Poljska	Symbicort
Portugalska	Symbicort 160 microgramas /4,5 microgramas/inalação Suspensão pressurizada para inalação
Romunija	Symbicort 160 micrograme /4.5 micrograme/inhalatie, suspensie de inhalat presurizată
Slovaška	Symbicort 160 mikrogramov /4,5 mikrogramov/inhalačná dávka, inhalačná suspenzia v tlakovom obale
Slovenija	Symbicort 160 mikrogramov/4,5 mikrograma na vdih inhalacijska suspenzija pod tlakom
Španija	Symbicort 160 microgramos /4,5 microgramos/inhalación suspensión para inhalación en envase a presión
Švedska	Symbicort 160 mikrogram /4.5 mikrogram/inhalation
Združeno kraljestvo (Severna Irska)	Symbicort 200 micrograms/6 micrograms per actuation pressurised inhalation, suspension

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 20. 01. 2021.