

NAVODILO ZA UPORABO

Naslednje navodilo za uporabo temelji na priporočenem besedilu s strani CHMP v skladu s členom 29(4) arbitražnega postopka (CHMP/338591/07 in CHMP/331678/07) za transdermalne obliže, ki vsebujejo fentanil. V besedilo so vključene le manjše spremembe.

NAVODILO ZA UPORABO

Fentanil HELM 25 mikrogramov/uro transdermalni obliži
Fentanil HELM 50 mikrogramov/uro transdermalni obliži
Fentanil HELM 75 mikrogramov/uro transdermalni obliži
Fentanil HELM 100 mikrogramov/uro transdermalni obliži

fentanil

Pred uporabo natančno preberite navodilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

- 1 Kaj je zdravilo Fentanil HELM in za kaj ga uporabljamo
- 2 Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Fentanil HELM
- 3 Kako uporabljati zdravilo Fentanil HELM
- 4 Možni neželeni učinki
- 5 Shranjevanje zdravila Fentanil HELM
- 6 Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO FENTANIL HELM IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Fentanil spada v skupino močnih zdravil proti bolečinam, imenovana opioidi. Fentanil, učinkovina, ki deluje proti bolečinam, se počasi sprošča iz obliža skozi kožo v telo.

Obliži Fentanil HELM se uporabljajo pri hudih in dolgotrajnih bolečinah, ki jih je mogoče ustrezno obvladati le z močnimi zdravili proti bolečinam.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO FENTANIL HELM

Ne uporabljajte zdravila Fentanil HELM:

- če ste alergični (preobčutljivi) na fentanil ali katerikoli sestavino zdravila.
- za lajšanje bolečine, ki traja le kratek čas, npr. po kirurškem posegu.
- če imate hudo okvarjeno osrednje živčevje, npr. zaradi poškodbe možganov.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Fentanil HELM

OPOZORILO:

Fentanil HELM je zdravilo, ki v primeru zaužitja lahko ogrozi življenje otrok.

To velja tudi za že uporabljene transdermalne obliže.

Zavedati se morate, da je lahko oblika tega zdravila za otroke privlačna.

Za osebe, ki se ne zdravijo redno s predpisanimi opioidi, so neželeni učinki zdravila Fentanil HELM lahko življenjsko nevarni.

Preden boste vzeli zdravilo Fentanil HELM, obvestite svojega zdravnika, če imate katerikoli od spodaj navedenih bolezni. Tveganje za pojav neželenih učinkov je večje in vam bo vaš zdravnik mogoče zmanjšal odmerek fentanila:

- astma, depresija dihanja ali katerakoli bolezen pljuč,
- nizek krvni tlak,
- okvarjeno delovanje jeter,
- okvarjeno delovanje ledvic,
- če ste imeli poškodovano glavo, možganski tumor ali znake povišanega znotrajlobanjskega tlaka (npr. glavobol, motnje vida), motnje stanja zavesti ali izgubo zavesti ali komo,
- počasen in nepravilen utrip srca (bradiaritmije),
- miastenija gravis (bolezen, ki povzroča utrujenost in šibkost mišic).

Svojega zdravnika obvestite, če se med zdravljenjem pri vas pojavi vročina, ker lahko povišana telesna temperatura povzroči pospešeno prehajanje zdravila skozi kožo. Zato se morate tudi izogibati izpostavljanju obliža na koži izvorom direktne toplote kot npr. električnim odejam, termoforjem, savni, solariju ali vroči kopeli. Lahko ste zunaj na soncu, vendar je potrebno v vročih poletnih dneh obliž pred soncem zavarovati s kosom obleke.

Pri dolgotrajni uporabi obližev Fentanil HELM se lahko pojavi telesna ali psihična odvisnost, vendar pa se pri zdravljenju bolečine zaradi raka to redko zgodi.

Če ste starejši bolnik ali ste v zelo slabi telesni kondiciji (slabotni) vas mora vaš zdravnik skrbno nadzorovati saj bo morda potrebno odmerek zdravila zmanjšati.

Transdermalnih obližev ne smete razrezati na manjše kose, ker podatkov o kakovosti, učinkovitosti in varnosti tako deljenih obližev ni.

Otroci

Obližev Fentanil HELM se na splošno pri otrocih, mlajših od 12 let, ne sme uporabljati, ker so izkušnje z uporabo pri otrocih omejene. Izjema je le, če je zdravnik izrecno predpisal uporabo obližev Fentanil HELM.

Uporaba drugih zdravil

Če jemljete barbiturate (zdravila za zdravljenje motenj spanja), buprenorfin, nalbufin ali pentazocin (druga močna protibolečinska zdravila) o tem obvestite svojega zdravnika. Uporaba teh zdravil skupaj z obliži Fentanil HELM ni priporočljiva.

Če sočasno uporabljate zdravila, ki vplivajo na delovanje možganov, je verjetneje, da se bodo pri vas pojavili neželeni učinki, predvsem težave z dihanjem. Med ta zdravila sodijo:

- zdravila za zdravljenje tesnobe (pomirjevala),
- zdravila za zdravljenje depresije (antidepresivi),
- zdravila za zdravljenje psihoz (nevroleptiki),
- anestetiki, če boste podvrženi posegu za katerega bo potrebna anestezija, svojemu zdravniku ali zobozdravniku povejte, da uporabljate obliže Fentanil HELM,
- zdravila proti nespečnosti (hipnotiki, pomirjevala),
- zdravila proti alergijam ali potovalni bolezni (antihistaminiki/antiemetiki),
- druga močna zdravila proti bolečinam (opioidi),
- alkoholne pijače.

Med zdravljenjem z obliži Fentanil HELM ne smete jemati spodaj naštetih zdravil, razen, če ste pod strogim nadzorom zdravnika.

Ta zdravila lahko zvišajo učinkovitost in neželene učinke obližev Fentanil HELM. To velja za:

- ritonavir (zdravilo za zdravljenje AIDS-a),
- ketokonazol, itraconazol (zdravila za zdravljenje glivičnih okužb),
- diltiazem (zdravilo za zdravljenje bolezni srca),
- makrolidni antibiotiki (zdravila za zdravljenje okužb).

Prosimo obvestite svojega zdravnika, če jemljete ali ste v zadnjih 14 dneh jemali zaviralce monoamino oksidaze (npr. moklobemid proti depresiji ali selegilin proti Parkinsonovi bolezni). Sočasna

uporaba teh zdravil lahko poveča njihove toksične učinke.

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo tudi, če ste ga dobili brez recepta.

Uporaba zdravila Fentanil HELM skupaj s hrano in pijačo

Sočasno uživanje alkohola in uporaba obližev Fentanil HELM poveča tveganje za hude neželene učinke, ki lahko povzročijo težave s dihanjem, padec krvnega tlaka, globoko sedacijo in komo.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Uporaba obližev Fentanil HELM med popadki in porodom (vključno s carskim rezom) ni priporočljiva, ker fentanil lahko pri plodu/novorojenčku povzroči težave z dihanjem. Če med uporabo obližev Fentanil HELM zanosite, se o tem posvetujte s svojim zdravnikom. Obliži Fentanil HELM se med nosečnostjo in dojenjem ne smejo uporabljati, razen, če je to nujno potrebno. Varnost uporabe v nosečnosti ni bila potrjena. Fentanil prehaja v materino mleko, kar lahko pri dojenčku povzroči neželene učinke kot npr. pomiritev in depresijo dihanja. Vse materino mleko, ki nastane med zdravljenjem ali v 72-ih urah po zadnji odstranitvi transdermalnih obližev, je potrebno zavreči.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Obliži Fentanil HELM imajo močan učinek na sposobnost vožnje in upravljanje strojev. Ta učinek je treba pričakovati predvsem na začetku zdravljenja, ob vsaki spremembi odmerka kot tudi ob uživanju alkohola in jemanju uspaval. Če uporabljate transdermalne obliže Fentanil HELM v istem odmerku že dlje časa, vam vaš zdravnik lahko dovoli vožnjo ali upravljanje strojev. Med uporabo transdermalnih obližev Fentanil HELM ne vozite in ne upravljajte z nevarnimi stroji, če vam tega vaš zdravnik ni izrecno dovolil.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO FENTANIL HELM

Pri uporabi zdravila Fentanil HELM natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Vaš zdravnik bo odločil, kateri odmerek zdravila Fentanil HELM je za vas najustreznejši. Njegova odločitev bo temeljila na jakosti bolečine, vašem splošnem stanju in načinu zdravljenja bolečine, ki ste ga do sedaj prejemali.

Glede na vaš odziv na zdravljenje bo prilagodil odmerek ali število obližev. Učinek se doseže v roku 24 ur po namestitvi prvega obliža, po odstranitvi pa postopoma izzveni. Ne prekinite zdravljenja ne da bi se posvetovali s svojim zdravnikom.

Vaš prvi obliž bo začel delovati počasi. To lahko traja tudi cel dan, tako, da vam bo vaš zdravnik morda predpisal dodatna zdravila proti bolečinam dokler transdermalni obliž fentanila na začne popolnoma delovati. Po tem vam bo transdermalni obliž Fentanil HELM neprenehoma pomagal blažiti bolečino in ostala dodatna zdravila proti bolečinam boste lahko prenehali jemati. V določenih primerih pa boste morda dodatna protibolečinska zdravila še vedno potrebovali.

Kako uporabiti obliž Fentanil HELM

- Poiščite ravno mesto na zgornjem delu telesa (trup) ali roki, kjer je koža neporaščena, brez ureznin, lis ali drugih kožnih sprememb. Izbrano mesto ne sme biti predhodno obsevano (zdravljeno z obsevanjem).
- Če je izbrano mesto na koži poraščeno, morate dlake na mestu uporabe postriči s škarjami. Ne smete jih obriti, ker britje razdraži kožo. Če je potrebno, pred uporabo obliža kožo umijte s čisto vodo. Ne uporabite mila, olja, losjona, alkohola ali drugih čistilnih sredstev, ki bi lahko razdražila kožo. Pred namestitvijo obliža kožo popolnoma posušite.
- Čim odstranite ovojnino, morate transdermalni obliž namestiti na izbrano mesto. Po odstranitvi zaščitne plasti obliž namestite tako, da ga z dlanjo trdno pritisnete in držite približno 30 sekund,

da se bo dobro prilepil na kožo. Posebej bodite pozorni na robove obliža, ki morajo biti dobro prilepljeni.

- Transdermalni obliž se ponavadi uporablja 72 ur (tri dni). Na zunanjo ovojnino lahko zapišete datum in uro namestitve. To vam lahko pomaga, da si zapomnite, kdaj je potrebno obliž zamenjati.
- Mesta namestitve obliža ne smete izpostavljati izvoru zunanje toplote (glejte poglavje "Posebna opozorila za uporabo obližev Fentanil HELM").
- Transdermalni obliž je na zunanji strani zaščiten z vodotesno folijo, zato ga lahko nosite tudi med prhanjem.

Kako zamenjati transdermalni obliž

- Obliž odstranite po obdobju, ki ga je določil zdravnik. To je pri večini po 72 urah (3 dneh), pri nekaterih bolnikih pa po 48 urah (2 dneh). Ponavadi se obliž sam ne odlepi. Po odstranitvi lahko ostanke obliža na koži očistite s pomočjo večje količine vode in mila.
- Uporabljene transdermalne obliže prepognite na pol tako, da se lepljivi površini stikata, shranite jih v zunanjo ovojnino ter zavržite; če je mogoče, jih vrnite vašemu farmacevtu.
- Nov obliž namestite, kot je opisano zgoraj, vendar na drugo izbrano mesto. Preden znova uporabite isti predel kože, mora miniti vsaj 7 dni.

Če ste uporabili večji odmerek obližev Fentanil HELM, kot bi smeli

Če ste uporabili več obližev kot je predpisano, obliže odstranite in se posvetujte z zdravnikom ali bolnišnico glede tveganja.

Najpogostejši znak prevelikega odmerjanja je oteženo dihanje. Simptomi so, da bolnik diha neobičajno počasi ali plitvo. V tem primeru je treba obliž takoj odstraniti in o tem obvestiti zdravnika. Medtem ko čakate na zdravnika, poskusite obdržati bolnika v budnem stanju tako, da se z njim pogovarjate ali ga občasno stresite.

Drugi znaki in simptomi prevelikega odmerjanja so dremavost, nizka telesna temperatura, počasen utrip srca, zmanjšan tonus mišic, globoka sedacija, nekoordiniranost mišic, zoženje zenic in krči.

Če ste pozabili uporabiti obliž Fentanil HELM

V nobenem primeru ne uporabite dvojnega odmerka.

Obliž zamenjajte ob istem času vsake tri dni (vsakih 72 ur), če vaš zdravnik ne določi drugače. Če ste pozabili zamenjati obliž, to storite takoj, ko se na to spomnite. Če ste se spomnili in zamenjali obliž veliko pozneje kot bi morali, se posvetujte s svojim zdravnikom, ker boste morda potrebovali dodatna zdravila proti bolečinam.

Če ste prenehali uporabljati obliže Fentanil HELM

Če želite zdravljenje prekiniti ali ustaviti, se o razlogih za prenehanje in o nadaljevanju zdravljenja vedno posvetujte s svojim zdravnikom.

Pri dolgotrajni uporabi obližev Fentanil HELM se lahko pojavi telesna odvisnost. Če prenehate uporabljati obliže, se boste morda slabo počutili.

Uporabe obližev Fentanil HELM ne smete nikoli prekiniti sami, vedno se prej posvetujte s svojim zdravnikom, saj je tveganje za pojav odtegnitvenih znakov (slabost, bruhanje, driska, tesnoba in drgetanje mišic) večje, če z uporabo obližev prekinete nenadoma.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Fentanil HELM neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Pri vrednotenju neželenih učinkov so uporabljena naslednja merila za njihovo pogostnost:

zelo pogosti: se pojavijo pri več kot 1 bolniku od 10,
pogosti: se pojavijo pri 1 do 10 bolnikov od 100,
občasni: se pojavijo pri 1 do 10 bolnikov od 1.000,
redki: se pojavijo pri 1 do 10 bolnikov od 10.000,
zelo redki: se pojavijo pri manj kot 1 bolnika od 10.000,
neznana pogostnost: ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov.

Če opazite katerikoli od naštetih resnih, zelo redkih neželenih učinkov, takoj prenehajte z zdravljenjem in o tem nemudoma obvestite svojega zdravnika ali nemudoma obiščite najbližjo bolnišnico: huda depresija dihanja (močna zasoplost, hropenje) ali popolno zaporo prebavnega trakta (bolečine zaradi krčev, bruhanje, plini).

Drugi neželeni učinki:

Zelo pogosti: zaspanost, glavobol, omotica, slabost, bruhanje, zaprtost, potenje, srbenje.
Srbenje ponavadi preneha dan po odstranitvi obliža.

Pogosti: občutek neobičajne dremavosti ali utrujenosti (zaviralni učinek na delovanje možganov), živčnost, depresija, izguba apetita, suha usta, bolečine v želodcu, prebavne motnje, kožne reakcije na mestu aplikacije obliža.

Občasni: občutek nenavadne vznemirjenosti, izguba spomina, težave s spanjem, prividi, razdraženost, tresenje, motnje zaznavanja, motnje govora, padec ali dvig krvnega tlaka in utripa srca, težave z dihanjem, driska, težave pri odvajanju vode, kožni izpuščaji, rdečica kože (eritem).
Kožni izpuščaji in rdečica kože ponavadi izgineta dan po odstranitvi obliža.

Redki: neredno bitje srca, razširjene krvne žile, kolcanje, zadrževanje vode v tkivih, občutek mraza.

Zelo redki: nenadna, po vsem telesu razširjena alergična reakcija s padcem krvnega tlaka in/ali težko dihanje (anafilaktične reakcije), blodnje, stanje vznemirjenosti, izguba fizične moči, depresija, tesnoba, zmedenost, motnje spolnih funkcij, odtegnitveni znaki, motnje koordinacije, napadi (vključno s kloničnimi in grand mal napadi), zmanjšana ostrina vida, motnje dihanja (depresija dihanja), zastoj dihanja (apnea), boleče napenjanje, zapora prebavnega trakta, bolečine v mehurju, izločanje manj urina kot običajno (zmanjšano nastajanje urina).

Pri dolgotrajni uporabi obližev Fentanil HELM se lahko zgodi, da bodo obliži Fentanil HELM postali manj učinkoviti. Zato bo potrebno prilagoditi odmerek (razvoj tolerance).

Lahko se pojavi tudi fizična odvisnost in odtegnitveni simptomi, če nenadoma prenehate uporabljati obliže. Odtegnitveni simptomi so lahko slabost, bruhanje, driska, tesnoba in trzanje mišic.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA FENTANIL HELM

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom, tudi po uporabi. Velike količine zdravilne učinkovine ostajajo v transdermalnih obližih tudi po uporabi.

Zdravila Fentanil HELM ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Zaradi okoljevarstvenih razlogov in zaradi varnosti morate uporabljene ali neuporabljene transdermalne obliže ter transdermalne obliže s pretečenim rokom uporabnosti zavreči ali vrniti v lekarno v skladu z lokalnimi predpisi. Uporabljene transdermalne obliže prepognite na pol z lepljivima površinama skupaj. Shranite jih v zunanjo ovojnino in jih odstranite ali, če je le mogoče, vrnite svojemu farmacevtu v skladu z lokalnimi predpisi.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Fentanil HELM

- Zdravilna učinkovina je: fentanil

Fentanil HELM 25 mikrogramov/uro: En transdermalni obliž (s 15 cm² aktivne površine) vsebuje 4,8 mg fentanila, kar ustreza hitrosti sproščanja 25 mikrogramov fentanila na uro.

Fentanil HELM 50 mikrogramov/uro: En transdermalni obliž (s 30 cm² aktivne površine) vsebuje 9,6 mg fentanila, kar ustreza hitrosti sproščanja 50 mikrogramov fentanila na uro.

Fentanil HELM 75 mikrogramov/uro: En transdermalni obliž (s 45 cm² aktivne površine) vsebuje 14,4 mg fentanila, kar ustreza hitrosti sproščanja 75 mikrogramov fentanila na uro.

Fentanil HELM 100 mikrogramov/uro: En transdermalni obliž (s 60 cm² aktivne površine) vsebuje 19,2 mg fentanila, kar ustreza hitrosti sproščanja 100 mikrogramov fentanila na uro.

- Pomožne snovi so:

Adhezivna plast: poli(2-etilheksilakrilat, vinilacetat) (50:50)

poli[2-etilheksil)akrilat-ko-metilakrilat-ko-akrilna kislina-ko(2,3-epoksi)propil)metakrilat] (61.5:33:5.5:0.02), dodekan-1-ol

Zaščitna plast: silikonizirana poliesterska folija

Krovna plast: poliestere/etilenvinilacetatna folija
tiskarsko črnilo

Izgled zdravila Fentanil HELM in vsebina pakiranja

Fentanil HELM 25/50/75 ali 100 mikrogramov/uro je tanek prosojen in brezbarven obliž z okroglimi robovi in naslednjim odtisom:

Fentanyil 25 µg/h

Fentanyil 50 µg/h

Fentanyil 75 µg/h

Fentanyil 100 µg/h

Fentanil HELM 25/50/75 in 100 mikrogramov/uro je na voljo v pakiranjih s 3, 5, 10 ali 20 transdermalnimi obliži.

Na voljo so naslednje jakosti zdravila: *Fentanil HELM 25 mikrogramov/uro*, *Fentanil HELM 50 mikrogramov/uro*, *Fentanil HELM 75 mikrogramov/uro* in *Fentanil HELM 100 mikrogramov/uro*.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Ime in naslov imetnika dovoljenja za promet in izdelovalca

Imetnik dovoljenja za promet:

Helm Pharmaceuticals GmbH
Nordkanalstr. 28, 20097 Hamburg
Nemčija

Izdelovalec:

Helm Pharmaceuticals GmbH

Nordkanalstrasse 28
20097 Hamburg
Nemčija

Režim izdajanja zdravila:

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Avstrija:	Fentanyl Helm 25 µg/h Transdermales Pflaster Fentanyl Helm 50 µg/h Transdermales Pflaster Fentanyl Helm 75 µg/h Transdermales Pflaster Fentanyl Helm 100 µg/h Transdermales Pflaster
Belgija:	Fentanyl Helm Pharmaceuticals 25µg/h Pleister voor transdermaal gebruik/Dispositif transdermique/transdermales Pflaster Fentanyl Helm Pharmaceuticals 50µg/h Pleister voor transdermaal gebruik/Dispositif transdermique/transdermales Pflaster Fentanyl Helm Pharmaceuticals 75µg/h Pleister voor transdermaal gebruik/Dispositif transdermique/transdermales Pflaster Fentanyl Helm Pharmaceuticals 100µg/h Pleister voor transdermaal gebruik/Dispositif transdermique/transdermales Pflaster
Italija:	Fentanyl Helm Fentanyl Helm 25 µg/h cerotto transdermico Fentanyl Helm Fentanyl Helm 50 µg/h cerotto transdermico Fentanyl Helm Fentanyl Helm 75 µg/h cerotto transdermico Fentanyl Helm Fentanyl Helm 100 µg/h cerotto transdermico
Nemčija:	Fentrix 25 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster Fentrix 50 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster Fentrix 75 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster Fentrix 100 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster
Nizozemska:	Fentrix 25 µg/h Pleister voor transderaal gebruik Fentrix 50 µg/h Pleister voor transderaal gebruik Fentrix 75 µg/h Pleister voor transderaal gebruik Fentrix 100 µg/h Pleister voor transderaal gebruik
Portugalska:	Fentanilo Helm 25 microgramas/hora Sistema transdérmico Fentanilo Helm 50 microgramas/hora Sistema transdérmico Fentanilo Helm 75 microgramas/hora Sistema transdérmico Fentanilo Helm 100 microgramas/hora Sistema transdérmico
Slovenija:	Fentanil Helm 25 mikrogramov/uro transdermalni obliži Fentanil Helm 50 mikrogramov/uro transdermalni obliži Fentanil Helm 75 mikrogramov/uro transdermalni obliži Fentanil Helm 100 mikrogramov/uro transdermalni obliži
Španija:	Fentanilo Matrix Helm 25 microgramos/hora parches transdérmicos EFG Fentanilo Matrix Helm 50 microgramos/hora parches transdérmicos EFG Fentanilo Matrix Helm 75 microgramos/hora parches transdérmicos EFG Fentanilo Matrix Helm 100 microgramos/hora parches transdérmicos EFG

Navodilo je bilo odobreno:

12.10.2009