

NAVODILO ZA UPORABO

Vaposirup 200 mg/15 ml sirup gvaifenezin

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke.

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najboljše koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 3 do 5 dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Vaposirup in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Vaposirup
3. Kako jemati zdravilo Vaposirup
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Vaposirup
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO VAPOSIRUP IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Vaposirup deluje tako, da zmechča sluz v bronhijih in omogoči lažje izkašljevanje.

Zdravilo Vaposirup se priporoča za mehčanje sluzi v bronhijih in za lajšanje izkašljevanja pri:

- prehladu in gripi
- vnetju sapnic (bronhitisu).

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO VAPOSIRUP

Ne uporabljajte zdravila Vaposirup

- če ste alergični (preobčutljivi) na gvaifenezin ali katerokoli sestavino zdravila
- če imate bolezen prebavil
- če ste mlajši od 14 let

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Vaposirup

- če imate zmanjšano delovanje ledvic
- pri miasteniji gravis (bolezni obrambnega sistema telesa, ki povzroči predčasno mišično slabost)
- če imate dolgotrajen ali kronični kašelj, ki se pojavi pri kajenju, astmi, kroničnem bronhitisu ali emfizemu (stanje trajne razširitve dihalnih poti in izgube elastičnosti pljučnega tkiva), se morate pred uporabo zdravila Vaposirup posvetovati z zdravnikom.
- če simptomi trajajo dlje časa se morate posvetovati z zdravnikom.

O vseh teh stanjih se posvetujte z zdravnikom, tudi če so se nanašala na vas kadarkoli v preteklosti.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Zdravilo Vaposirup lahko okrepi delovanje zdravil za pomirjanje (sedativi) in zdravil, ki sproščajo mišice (mišični relaksanti).

Jemanje zdravila Vaposirup skupaj s hrano in pijačo

Vpliv hrane ali pijače na zdravilo ni znan.

Plodnost, nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Plodnost

Ni podatkov o negativnem vplivu na plodnost.

Nosečnost

Zdravniku morate povedati, če ste noseči, mislite, da ste noseči ali če nameravate zanositi.

Zdravila Vaposirup se ne sme uporabljati med nosečnostjo, ker ni dovolj podatkov o njegovi varnosti v tem obdobju.

Dojenje

Podatkov o tem, ali se zdravilo Vaposirup sirup izloča v materino mleko ni, zato se ga med dojenjem ne sme uporabljati.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Vaposirup nima ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Vaposirup

Zdravilo vsebuje 5,55 g saharoze na odmerek.

To morajo upoštevati sladkorni bolniki. Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

To zdravilo vsebuje 5 vol % etanola (alkohola), to je do 630 mg na odmerek, kar ustreza 16 ml piva oziroma 7 ml vina na odmerek.

Škodljivo je za tiste, ki trpijo za alkoholizmom.

Na vsebnost etanola (alkohola) morajo biti pozorne nosečnice in doječe matere, otroci in skupine z velikim tveganjem, kot so bolniki z jetrnimi obolenji ali epileksijo.

Zdravilo vsebuje barvilo rdeče 4R. Lahko povzroči alergijske reakcije.

To zdravilo vsebuje 1,24 mmol (ali 28,24 mg) natrija na odmerek. To morajo upoštevati bolniki, ki so na dieti z nadzorovanim vnosom natrija.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO VAPOSIRUP

Pri jemanju zdravila Vaposirup sirup natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Odmerjanje in način uporabe

Odrasli in mladostniki, stari več kot 14 let, jemljite 15 ml sirupa (en merilni lonček napolnjen do oznake 15 ml) na vsake 4 ure, dokler ne greste spat. Sirup lahko vzamete največ šestkrat na dan. Med jemanjem zdravila Vaposirup je potrebno piti velike količine tekočine.

Zdravilo Vaposirup lahko jemljete 3 do 5 dni. Če se po tem času stanje še ne izboljša (zvečano

izkašljevanje sluzi) ali če kašelj še traja, zaradi možnosti druge bolezni obiščite zdravnika.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom

Steklenico odprete tako, da za otroke varno zaporko pritisnete navzdol in jo sočasno obrnete v smeri puščice.

Pred uporabo steklenico dobro pretresite.

Zdravila Vaposirup ne dajajte otrokom mlajšim od 14 let.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Vaposirup, kot bi smeli

Takoj se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Po zaužitju prevelike količine zdravila se lahko pojavijo omotica, vrtoglavica in prebavne motnje. Zelo velika količina zdravila lahko povzroči simptome, kot so vzbujenost, zmedenost in motnje dihanja. V takem primeru prosite za pomoč najbližjega zdravnika.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Vaposirup

Vzemite ga takoj, ko se spomnite. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Nato jemljite zdravilo spet kot ponavadi.

Če ste prenehali jemati zdravilo Vaposirup

Če ste zdravilo prenehali jemati zaradi pojava neželenih učinkov, se o ukrepih v tem primeru pogovorite s svojim zdravnikom. Če želite zdravilo prenehati jemati, ker ni bilo učinkovito, vprašajte svojega zdravnika o drugih primernih zdravilih.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Vaposirup neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Neželeni učinki so lahko:

zelo pogosti: pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov

pogosti: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov

občasni: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov

redki: pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov

zelo redki: pojavijo se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov

neznana pogostnost: pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

redki (pojavijo se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov)

prebavne težave, ki lahko vključujejo simptome kot so občutek siljenja na bruhanje, bruhanje in driska, vrtoglavica in glavobol, kožni izpuščaji, srbenje in koprivnica

zelo redki (pojavijo se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov)

Znani so posamezni primeri alergijskih reakcij (tudi anafilaktičnega šoka), globoka nezavest (koma), bradikardija (upočasnjeno bitje srca), bronhospazem (spontani krč mišičja, ki povzroči zoženje dihalnih poti), dispneja (oteženo dihanje), zmedenost in granulocitopenija (zmanjšanje števila belih krvnih teles – granulocitov). Lahko se pojavi tudi občutek toplote.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA VAPOSIRUP

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Shranjujte pri temperaturi do 25 ° C.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »EXP«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode in med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Vaposirup

- Zdravilna učinkovina je gvaifenezin. 15 ml sirupa (en merilni lonček napolnjen do oznake 15 ml) vsebuje 200 mg gvaifenezina.
- Pomožne snovi so prečiščena voda, saharoza, propilenglikol, etanol, 96 odstotni, natrijev citrat dihidrat, brezvodna citronska kislina, natrijev karmezolat, makrogol, makrogol 2000 stearat, natrijev benzoat, natrijev saharinat, aroma David Michael Heat (RF 9512), aroma pozne čremse, levomentol, mentoksipropilenglikol, barvilo rdeče 4R (E 124)

Izgled zdravila Vaposirup in vsebina pakiranja

Rdeča, bistra, viskozna tekočina.

Zdravilo je na voljo v dveh pakiranjih:

škafila s steklenico po 120 ml sirupa z za otroke varno zaporko in merilnim lončkom.

škafila s steklenico po 180 ml sirupa z za otroke varno zaporko in merilnim lončkom.

Način in režim izdaje zdravila Vaposirup

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

Pliva Ljubljana d.o.o.

Pot k sejmišču 35

1231 Ljubljana – Črnuče

Slovenija

Izdelovalec:

Procter&Gamble Manufacturing GmbH

Gross-Gerau Plant

Procter & Gamble Str. 1

64521 Gross-Gerau, Nemčija

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne

10.04.2013