

Navodilo za uporabo

Augmentin 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno suspenzijo z okusom mešanega sadja

amoksicilin/klavulanska kislina

Praden začnete dajati to zdravilo vašemu otroku natančno preberite navodilo, ker vsebuje zanj pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.
- To zdravilo je ponavadi predpisano dojenčku ali otroku in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne otrokovim.
- Če pri vašem otroku opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Augmentin in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste dali zdravilo Augmentin
3. Kako dati zdravilo Augmentin
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Augmentin
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Augmentin in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Augmentin je antibiotik, ki deluje tako, da ubija bakterije, ki pozročajo okužbe. Vsebuje dve različni učinkovini, ki se imenujeta amoksicilin in klavulanska kislina. Amoksicilin spada v skupino zdravil, imenovanih "penicilini", katerih delovanje je lahko včasih onemogočeno (inaktivirano). Druga zdravilna učinkovina (klavulanska kislina) prepreči, da bi se to zgodilo.

Zdravilo Augmentin se uporablja za zdravljenje naslednjih bakterijskih okužb pri dojenčkih in otrocih:

- okužbe srednjega ušesa in sinusov,
- okužbe dihalnih poti,
- okužbe sečil,
- okužbe kože in mehkih tkiv, vključno z okužbami obzobnih tkiv,
- okužbe kosti in sklepov.

2. Kaj morate vedeti, preden boste dali zdravilo Augmentin

Ne dajajte zdravila Augmentin vašemu otroku:

- če je alergičen na amoksicilin, klavulansko kislino ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- če je imel kdaj resno alergijsko reakcijo na kakšen drug antibiotik. Ta lahko obsega izpuščaj na koži ali oteklost obraza ali žrela.
- če je imel kdaj težave z jetri ali zlatenico (porumenelost kože) med jemanjem kakšnega antibiotika.

➔ **Ne dajajte zdravila Augmentin vašemu otroku, če zanj velja kaj od naštetega.** Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden boste dali zdravilo Augmentin.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Posvetujte se z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro, preden boste dali to zdravilo vašemu otroku:

- če ima infekcijsko mononukleozo,
- če se zdravi zaradi težav z jetri ali ledvicami,
- če urina ne odvaja redno.

Če niste prepričani, ali kaj od naštetega velja za vašega otroka, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden mu boste dali zdravilo Augmentin.

V nekaterih primerih bo zdravnik morda opravil preiskave za ugotovitev, katera vrsta bakterije vašemu otroku povzroča okužbo. Odvisno od rezultatov bo morda vaš otrok dobil drugačno jakost zdravila Augmentin ali drugo zdravilo.

Stanja, na katera morate biti pozorni

Zdravilo Augmentin lahko poslabša nekatera obstoječa stanja oz. bolezni ali povzroči resne neželene učinke. Med takšnimi so alergijske reakcije, konvulzije (napadi krčev) in vnetje debelega črevesa. Kadar vaš otrok jemlje zdravilo Augmentin, bodite pozorni na določene simptome, da boste zmanjšali tveganje za težave. Glejte "*Stanja, na katera morate biti pozorni*" v **poglavju 4**.

Preiskave krvi in urina

Če mora vaš otrok opraviti preiskavo krvi (npr. testi stanja rdečih krvnih celic ali testi jetrne funkcije) ali preiskavo urina (za glukozo), morate zdravniku ali medicinski sestri povedati, da jemlje zdravilo Augmentin. Zdravilo Augmentin namreč lahko vpliva na izvide takšnih preiskav.

Druga zdravila in zdravilo Augmentin

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če vaš otrok jemlje, je pred kratkim jemal ali pa bo morda začel jemati katerokoli drugo zdravilo.

Če obenem z zdravilom Augmentin vaš otrok jemlje alopurinol (uporablja se pri protinu (putiki)), obstaja večja možnost za alergijsko kožno reakcijo.

Če vaš otrok jemlje probenecid (uporablja se pri protinu), se bo zdravnik morda odločil za prilagoditev odmerka zdravila Augmentin.

Če otrok hkrati z zdravilom Augmentin jemlje zdravila za preprečevanje krvnih strdkov (npr. varfarin), so lahko potrebne dodatne preiskave krvi.

Zdravilo Augmentin lahko vpliva na delovanje metotreksata (to je zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje raka ali revmatskih bolezni).

Zdravilo Augmentin lahko vpliva na delovanje mofetilmikofenolata (zdravila, ki se uporablja za preprečevanje zavrnitve presajenih organov).

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če je vaš otrok, ki bo vzel to zdravilo, noseč ali doji, menite, da bi lahko bil noseč ali načrtuje zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzame to zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Augmentin lahko povzroči neželene učinke in ti simptomi lahko povzročijo, da niste sposobni upravljati vozil.

Ne vozite in ne upravljajte strojev, če se ne počutite dobro.

Zdravilo Augmentin vsebuje aspartam in maltodekstrin

- Zdravilo Augmentin vsebuje aspartam (E951), ki je vir fenilalanina. To lahko škodljivo vpliva na otroke s fenilketonurijo.

- Zdravilo Augmentin vsebuje maltodekstrin (glukozo). Če vam je zdravnik povedal, da vaš otrok ne prenaša nekaterih sladkorjev, se posvetujte z njim, preden mu date to zdravilo.

3. Kako dati zdravilo Augmentin

Ko dajete to zdravilo, vedno natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Odrasli in otroci, težki 40 kg ali več

- Suspenzija po navadi ni priporočljiva za odrasle in otroke, težke 40 kg ali več. Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom.

Otroci, lažji od 40 kg

Vsi odmerki so izračunani na osnovi otrokove telesne mase v kilogramih.

- Zdravnik vam bo povedal, koliko zdravila Augmentin morate dati vašemu dojenčku ali otroku.
- Priložena je plastična merilna žlička ali odmerna brizga. Navodila o uporabi odmerne brizge so na voljo na koncu tega navodila. To uporabite, da boste svojemu dojenčku ali otroku dali pravi odmerek.
- Priporočeni odmerek – od 25 mg/3,6 mg do 45 mg/6,4 mg na posamezni kilogram telesne mase na dan, razdeljeno na dva odmerka.
- Višji odmerek – do 70 mg/10 mg na posamezni kilogram telesne mase na dan, razdeljeno na dva odmerka.

Bolniki, ki imajo težave z ledvicami in jetri

- Če ima vaš otrok težave z ledvicami, morda potrebuje manjši odmerek. Zdravnik bo morda izbral drugo jakost ali drugo zdravilo.
- Če ima vaš otrok težave z jetri, bo morda potreboval pogostejše preiskave krvi za kontrolo delovanja jeter.

Kako dati zdravilo Augmentin

- Steklenico pred vsako uporabo dobro pretresite.
- Zdravilo dajte otroku na začetku obroka ali malo pred obrokom.
- Odmerke razvrstite enakomerno čez dan s presledkom vsaj 4 ure. Ne vzemite 2 odmerkov v 1 uri.
- Zdravila Augmentin naj otrok ne jemlje več kot 2 tedna. Če se še vedno ne počuti dobro, mora znova obiskati zdravnika.

Če ste otroku dali več zdravila Augmentin, kot bi smeli

Če ste otroku dali preveč zdravila Augmentin, so med znaki lahko prebavne motnje (siljenje na bruhanje, bruhanje ali driska) ali konvulzije. Čim prej se posvetujte z zdravnikom. S seboj vzemite steklenico zdravila, da jo boste pokazali zdravniku.

Če ste otroku pozabili dati zdravilo Augmentin

Če ste otroku pozabili dati zdravilo Augmentin, mu ga dajte čim se spomnite. Naslednjega odmerka mu ne smete dati prezgodaj, temveč počakajte približno 4 ure, preden mu date naslednji odmerek. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če vaš otrok preneha jemati zdravilo Augmentin

Zdravilo Augmentin naj vaš otrok jemlje, dokler zdravljenje ni dokončano, tudi če se počuti bolje. Za premaganje okužbe mora vaš otrok uporabiti vse odmerke. Če nekatere bakterije preživijo, lahko povzročijo ponovitev okužbe.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Spodaj so naštetih neželeni učinki, ki se lahko pojavijo pri uporabi tega zdravila.

Stanja, na katera morate biti pozorni

Alergijske reakcije:

- izpuščaj na koži,
 - vnetje žil (*vaskulitis*), ki se lahko kaže kot rdeče ali vijolične dvignjene lise na koži, a lahko prizadene tudi katerikoli drug del telesa,
 - zvišana telesna temperatura, bolečine v sklepih, oteklost vratnih, pazdušnih ali dimeljskih bezgavk,
 - oteklost, včasih obraza ali žrela (*angioedem*), ki povzroči težave z dihanjem,
 - kolaps.
- ➔ Če se vašemu otroku pojavi kateri od teh simptomov, se **nemudoma posvetujte z zdravnikom. Otrok naj neha jemati zdravilo Augmentin.**

Vnetje debelega črevesa

Vnetje debelega črevesa, ki povzroči vodeno drisko, po navadi s krvjo in sluzjo, bolečine v trebuhu in/ali zvišano telesno temperaturo.

- ➔ Če se vašemu otroku pojavi kateri od teh simptomov, se **čim prej posvetujte z zdravnikom.**

Pogosti neželeni učinki

Pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov.

- glivična okužba (*kandidoza* – glivična okužba nožnice, ust ali kožnih gub),
 - slabost (navzea), zlasti med jemanjem velikih odmerkov.
- ➔ Če se vam pojavi, vzemite zdravilo Augmentin pred jedjo.
- bruhanje,
 - driska (pri otrocih).

Občasni neželeni učinki

Pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov.

- izpuščaj na koži, srbenje,
- dvignjen, srbeč izpuščaj (*koprivnica*),
- prebavne motnje,
- omotica,
- glavobol.

Občasni neželeni učinki, ki se lahko pokažejo na preiskavah krvi:

- zvišanje nekaterih snovi (*encimov*), ki nastajajo v jetrih.

Redki neželeni učinki

Pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov.

- izpuščaj na koži, ki je lahko mehurjast in na pogled podoben majhnim tarčam (temne osrednje pike, obdane z bledim kolobarjem in temnim obročem ob robu – *multiformni eritem*).
- ➔ če opazite katerega od teh simptomov, se morate nujno posvetovati z zdravnikom.

Redki neželeni učinki, ki se lahko pokažejo na preiskavah krvi:

- majhno število celic, udeleženih pri strjevanju krvi,
- majhno število belih krvnih celic.

Neznana pogostnost

Pogostnosti ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov:

- alergijske reakcije (glejte zgoraj),
- vnetje debelega črevesa (glejte zgoraj),
- vnetje možganskih ovojnic (*aseptični meningitis*),
- resne kožne reakcije:
 - razširjen izpuščaj z mehurji in lupljenjem kože, zlasti okrog ust, nosu, oči in spolovil (*Stevens-Johnsonov sindrom*) ter hujša oblika, ki povzroči obsežno lupljenje kože (več kot 30 % telesne površine – *toksična epidermalna nekroliza*),
 - razširjen rdeč izpuščaj na koži z majhnimi gnojnimi mehurčki (*bulozni eksfoliativni dermatitis*),
 - rdeč, luskast izpuščaj z izboklinami pod kožo in z mehurji (*eksentematozna pustuloza*),
 - gripi podobni simptomi z izpuščajem, zvišana telesna temperatura, otekle žleze in nenormalni rezultati krvnih preiskav (vključno z zvišanimi vrednostimi belih krvnih celic (*eozinofilija*) in jetrnih encimov) (*z zdravilom povzročeni kožni izpuščaj z eozinofilijo in sistemskimi simptomi (DRESS)*).

➔ Če se otroku pojavi kateri od teh simptomov, se nemudoma posvetujte z zdravnikom.

- vnetje jeter (*hepatitis*),
- zlatenica, ki jo povzroči zvišanje bilirubina (snovi, ki nastaja v jetrih) v krvi; otrokova koža in očesne beločnice zato lahko porumenijo,
- vnetje cevke v ledvicah,
- podaljšan čas strjevanja krvi,
- hiperaktivnost,
- napadi krčev (konvulzije; pri bolnikih, ki jemljejo velike odmerke zdravila Augmentin ali imajo težave z ledvicami),
- črn jezik, ki se na pogled zdi, kot bi bil dlakast,
- obarvanje zob (pri otrocih), ki ga je po navadi mogoče odstraniti s ščetkanjem.

Neželeni učinki, ki se lahko pokažejo na preiskavah krvi ali urina:

- hudo zmanjšanje števila belih krvnih celic,
- majhno število rdečih krvnih celic (*hemolitična anemija*),
- kristali v urinu.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Augmentin

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Suh prašek

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake »EXP«. Rok uporabnosti zdravila izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Pripravljena suspenzija

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

Ne zamrzujte.

Pripravljena suspenzija je uporabna 7 dni.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Augmentin

- Učinkovini sta amoksicilin in klavulanska kislina. 1 ml suspenzije vsebuje 80 mg amoksicilina v obliki amoksicilin trihidrata, ter 11,4 mg klavulanske kisline v obliki kalijevega klavulanata.
- Druge sestavine zdravila so aspartam (E951), ksantanski gumi, silicijev dioksid, koloidni brezvodni silicijev dioksid, sukcininska kislina, hipromeloza, aroma pomaranče 1* in 2*, aroma maline* in aroma *golden syrup** (*vsebuje maltodekstrin).
- Glejte tudi “Zdravilo Augmentin vsebuje aspartam in maltodekstrin” v poglavju 2.

Izgled zdravila Augmentin in vsebina pakiranja

Zdravilo Augmentin 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno suspenzijo z okusom mešanega sadja je bel do sivobel prašek, pakiran v steklenicah iz prozornega stekla. Po pripravi steklenica vsebuje 35 ml, 70 ml ali 140 ml tekoče sivobelega zmesi, imenovane suspenzija.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Augmentin

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

GSK d.o.o, Ljubljana, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija

Izdelovalca:

SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Clarendon Road, Worthing, West Sussex, BN14 8QH, Velika Britanija in

Glaxo Wellcome Production, ZI de la Peyenniere, 53100 Mayenne Cedex, Francija

To zdravilo je odobreno v državah članicah EGP pod naslednjimi imeni:

Avstrija – Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen Multifruktgeschmack

Bolgarija – Аугментин 400 mg/57 mg/5 ml прах за перорална суспензия

Hrvaška – Augmentin 400 mg + 57 mg/5 ml prašek za oralnu suspenziju s okusom voća
Ciper – Augmentin Mixed Fruit
Češka – Augmentin
Estonija – Augmentin Fruit
Finska – Augmentin Fruit
Francija – Augmentin 80 mg - 11.4 mg par ml Poudre pour suspension buvable
Nemčija – Augmentan Kindersaft
Madžarska – Augmentin DUO
Islandija – Augmentin
Irska – Augmentin Duo Mixed Fruit
Italija – Augmentin
Latvija – Augmentin Fruit 400 mg/57 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai
Litva – Augmentin
Malta – Augmentin Duo Mixed Fruit
Norveška – Augmentin
Poljska – Augmentin MFF
Portugalska – Augmentin Duo
Romunija – Augmentin FP
Slovenija – Augmentin 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroralno suspenzijo z okusom mešanega sadja
Slovaška – Augmentin DUO s príchut'ou miešaného ovocia
Velika Britanija – Augmentin Duo

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 18. 12. 2019.

Nasvet/zdravstvena vzgoja

Antibiotiki se uporabljajo za zdravljenje okužb, ki jih povzročajo bakterije. Nobenega učinka nimajo proti okužbam, ki jih povzročajo virusi.

Včasih se okužba, ki jo povzročajo bakterije, ne odzove na zdravljenje z antibiotikom. Eden najpogostejših razlogov za to je odpornost bakterij, ki povzročajo okužbo, proti uporabljenemu antibiotiku. To pomeni, da lahko bakterije kljub antibiotiku preživijo in se celo razmnožujejo.

Bakterija lahko postane odporna proti antibiotikom zaradi številnih razlogov. Skrbna uporaba antibiotikov lahko pomaga zmanjšati možnost, da bi bakterija postala odporna proti njim.


Ko vam zdravnik predpiše antibiotik, je ta namenjen le za zdravljenje vaše trenutne bolezni. Upoštevajte naslednje nasvete, to bo pomagalo preprečiti pojav odpornih bakterij, ki lahko onemogočijo delovanje antibiotika.

1. Zelo pomembno je, da antibiotik jemljete v pravem odmerku, ob pravem času in pravo število dni. Preberite navodila na lekarniški signaturi in če česa ne razumete, prosite zdravnika ali farmacevta za pojasnilo.
2. Antibiotika ne smete jemati, če ni bil predpisan posebej za vas. Antibiotik morate uporabiti le za zdravljenje okužbe, za katero je bil predpisan.
3. Ne jemljite antibiotikov, ki so bili predpisani drugim ljudem, tudi če so imeli okužbo, podobno vaši.
4. Antibiotikov, ki so bili predpisani vam, ne smete dajati drugim.
5. Če vam potem, ko ste dokončali zdravljenje z antibiotikom tako, kot vam je naročil zdravnik, ostane kaj antibiotika, morate preostanek vrniti v lekarno za ustrezno odstranitev.


Navodila za pripravo

Odstranite zaporko steklenice. Pred uporabo preverite, da je s folijo prekrit pečat nepoškodovan. Ponovno namestite zaporko na steklenico.

1. Pretresite steklenico, da boste zrahljali prašek.



2. Odstranite zaporko steklenice.



3. Potegnite stran, da odstranite s folijo prekrit pečat.



4. Dodajte količino vode (kot je prikazano spodaj). Ponovno namestite zaporko na steklenico, obrnite in dobro pretresite.

<u>Velikost pakiranja (ml)</u>	<u>Količina vode, ki jo je treba dodati pri pripravi (ml)</u>
35	31
70	62
140	124

Dodatno besedilo za trge, ki imajo na steklenici ali nalepki oznako za polnilno črto:
Napolnite steklenico z vodo tik pod črto na steklenici ali nalepki. Ponovno namestite zaporko na steklenico, obrnite in dobro pretresite, nato napolnite z vodo točno do črte. Ponovno namestite zaporko na steklenico, obrnite in zopet dobro pretresite.

5. Zdravilo hranite v hladilniku in ga pred vsako uporabo dobro pretresite.
Suspenzijo je treba porabiti v 7 dneh po pripravi.

Dodatno besedilo za države, ki tržijo zdravilo skupaj z odmerno brizgo.

Navodila o uporabi brizge


Priložena je brizga, s pomočjo katere lahko vzamete zdravilo Augmentin

Ta brizga je namenjena samo za dajanje zdravila Augmentin in se je ne sme uporabljati za katerakoli druga zdravila, saj so oznake odmerkov specifične za to zdravilo. K brizgi je priložen še vmesnik, ki omogoča pritrditev brizge na steklenico.


Odmerek je označen na odmerni brizgi za peroralno dajanje in je v mililitrih (mL). Svojemu otroku dajte odmerek, kot ga je predpisal zdravnik.

Pred uporabo preverite, ali sta brizga in vmesnik čista. Po potrebi ju izperite z vodo.


1. Pred vsakim dajanjem odmerkov steklenico s suspenzijo dobro pretresite.
2. Odstranite vmesnik z brizge. Trdno držite steklenico in vmesnik potisnite v vrat steklenice (vmesnik se ne sme premikati).




3. Brizgo vstavite v vmesnik in se prepričajte, da je varno pritrjena.




4. Steklenico obrnite s pritrjeno brizgo navzdol in povlecite bat do oznake odmerka, ki ga je predpisal vaš zdravnik.




5. Steklenico postavite v pokončni položaj in izvlecite brizgo.




6. Pri dajanju odmerka previdno vstavite konico brizge v usta in izbrizgajte vsebino s počasnim potiskom bata brizge navzdol (ponovite korake 3, 4, 5 in 6, če je potrebna več kot ena brizga za dajanje ustreznega odmerka).



7. Brizgo temeljito sperite v čisti vodi. Pred naslednjo uporabo pustite, da se brizga popolnoma posuši.



8. Zaprite steklenico s pokrovčkom.



9. Zdravilo hranite v hladilniku in ga pred vsako uporabo dobro pretresite. Suspenzijo je treba porabiti v 7 dneh po pripravi.