

## NAVODILO ZA UPORABO

### CELEBREX 100 mg trde kapsule CELEBREX 200 mg trde kapsule (celekoksib)

#### **Pred uporabo natančno preberite navodilo!**

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate kakršnokoli dodatno vprašanje, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- To zdravilo je bilo predpisano vam in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

#### **Navodilo vsebuje:**

1. Kaj je zdravilo Celebrex in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Celebrex
3. Kako jemati zdravilo Celebrex
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Celebrex
6. Dodatne informacije

## **1. KAJ JE ZDRAVILO CELEBREX IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO**

Zdravilo Celebrex se uporablja za lajšanje znakov in simptomov **osteoartrize, revmatoidnega artritisa in ankilozirajočega spondilitisa**.

Zdravilo Celebrex sodi v skupino nesteroidnih protivnetnih in protirevmatičnih zdravil, in sicer v podskupino znano kot zaviralci encima ciklooksigenaze-2 (COX-2). Vaše telo tvori prostaglandine, ki lahko povzročajo bolečino in vnetje. Pri boleznih, kot sta npr. revmatoidni artritis in osteoartriza, jih vaše telo tvori v večji meri. Zdravilo Celebrex deluje tako, da zmanjša nastajanje prostaglandinov ter tako zmanjša bolečino in vnetje.

## **2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO CELEBREX**

Vaš zdravnik vam je predpisal zdravilo Celebrex. Naslednje informacije vam bodo v pomoč pri doseganju čim boljših rezultatov zdravljenja z zdravilom Celebrex. Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

#### **Ne jemljite zdravila Celebrex**

**Povejte svojemu zdravniku, če karkoli od spodaj navedenega velja za vas, kajti bolniki s takšnimi stanji ne smejo jemati zdravila Celebrex:**

- če ste alergični (preobčutljivi) na celekoksib ali katerokoli sestavino zdravila Celebrex
- če ste imeli v preteklosti kdaj alergijsko reakcijo na katerega od zdravil, ki se imenujejo “sulfonamidi” (med ta zdravila sodijo nekateri antibiotiki, ki jih uporabljamo za zdravljenje okužb)
- če imate **trenutno** razjedo na želodcu ali črevesu ali krvavitev v želodcu ali črevesu
- če ste imeli v preteklosti kdaj astmo, nosne polipe ali hudo otekanje nosne sluznice, ali pa katero od alergijskih reakcij kot posledico jemanja acetilsalicilne kisline ali drugih nesteroidnih protivnetnih in

protibolečinskih zdravil, npr. srbeč kožni izpuščaj, otekanje obraza, ustnic, jezika ali grla, težave z dihanjem ali piskanje v pljučih

- če ste noseči; če obstaja možnost zanositve med zdravljenjem, se morate o ustrezni kontracepciji posvetovati z zdravnikom
- če dojite
- če imate hudo bolezen jeter
- če imate hudo bolezen ledvic
- če imate vnetno bolezen črevesja, kot je ulcerozni kolitis ali Crohnova bolezen
- če imate srčno popuščanje, potrjeno ishemično srčno bolezen ali možganskožilno bolezen, npr. ste imeli potrjen srčni infarkt, možgansko kap ali prehodni ishemični napad (začasno zmanjšan pretok krvi v možgane; znano tudi kot »mini možganska kap«), angino pectoris ali zamašitev krvnih žil, ki vodijo do srca ali možganov
- če imate ali ste imeli težave s krvnim obtokom (bolezen perifernih arterij) ali operacijo na arterijah nog

### **Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Celebrex**

#### **Posvetujte se z zdravnikom, če kaj od naštetega velja za vas:**

- če ste v **preteklosti** imeli razjedo na želodcu ali črevesu ali krvavitev v želodcu ali črevesu (**ne jemljite** zdravila Celebrex, če imate **trenutno** razjedo na želodcu ali krvavitve v želodcu ali črevesu);
- če jemljete acetilsalicilno kislino (tudi v nizkih odmerkih za preprečevanje srčnih obolenj);
- če jemljete zdravila za preprečevanje strjevanja krvi (npr. varfarin);
- če jemljete zdravilo Celebrex sočasno z drugimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, kot je ibuprofen ali diklofenak. Izogibajte se sočasni uporabi teh zdravil;
- če kadite, imate sladkorno bolezen, povišan krvni tlak ali povišano raven holesterola v krvi;
- če imate srčno, jetrno ali ledvično bolezen; v tem primeru vas bo vaš zdravnik med zdravljenjem pazljivo spremljal;
- če vam v telesu zastaja tekočina (imate npr. otekle gležnje in stopala);
- če bi lahko bili dehidrirani, npr. zaradi bruhanja ali driske, ali če jemljete diuretike (zdravila za odvajanje vode);
- če ste kdaj imeli hudo alergijsko reakcijo ali hudo kožno reakcijo na katerokoli zdravilo;
- če se počutite bolni zaradi morebitne okužbe ali mislite, da ste zboleli, saj lahko zdravilo Celebrex prikrije simptome zvišane telesne temperature, ki je znak okužbe in vnetja;
- če ste stari več kot 65 let, vas bo morda želel vaš zdravnik redno nadzorovati.

Tako kot druga nesteroidna protivnetna zdravila (npr. ibuprofen ali diklofenak) lahko tudi to zdravilo povzroči zvišanje krvnega tlaka, zato lahko vaš zdravnik uvede reden nadzor vašega krvnega tlaka.

Pri uporabi celekoksiba so poročali o nekaterih primerih hudih jetrnih reakcij, vključno s hudim vnetjem jeter, poškodbami jeter, odpovedjo jeter (v nekaterih primerih s smrtnim izidom ali presaditvijo jeter). Izmed primerov, pri katerih so poročali tudi o času do nastopa reakcije, je do najbolj hudih jetrnih reakcij prišlo v prvem mesecu po začetku zdravljenja.

Možnost zanositve je lahko zaradi zdravila Celebrex zmanjšana. Svojega zdravnika morate obvestiti, če nameravate zanositi ali če imate probleme z zanositvijo (glejte Nosečnost in dojenje).

### **Jemanje drugih zdravil**

Zdravila lahko včasih vplivajo na delovanje drugih zdravil. Povejte svojemu zdravniku ali farmacevtu, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta:

- dekstrometorfan (uporablja se kot sredstvo proti kašlju)
- zaviralci angiotenzinske konvertaze (zaviralci ACE) ali antagonisti receptorjev angiotenzina II (uporabljajo se za zdravljenje visokega krvnega tlaka in srčnega popuščanja)
- diuretiki (uporabljajo se za odvajanje vode iz telesa)
- flukonazol in rifampicin (uporabljata se za zdravljenje glivičnih in bakterijskih okužb)
- varfarin ali druga peroralna zdravila proti strjevanju krvi (sredstvo za 'redčenje krvi', ki zmanjša strjevanje krvi)
- litij (uporablja se za zdravljenje nekaterih vrst depresije)
- druga zdravila za zdravljenje depresije, nespečnosti, visokega krvnega tlaka ali nerednega srčnega utripa
- nevroleptiki (uporabljajo se za zdravljenje nekaterih psihiatričnih bolezni)
- metotreksat (uporablja se za zdravljenje revmatoidnega artritisa, luskavice ter levkemije)
- karbamazepin (uporablja se za zdravljenje epilepsije ter nekaterih oblik bolečine ali depresije)
- barbiturati (uporabljajo se za zdravljenje epilepsije ter nespečnosti)
- ciklosporin in takrolimus (uporabljata se za zaviranje imunskega sistema, npr. po presaditvah organov)

Zdravilo Celebrex lahko jemljete hkrati z majhnimi odmerki acetilsalicilne kisline (75 mg na dan ali manj). Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete obe zdravili hkrati.

### **Plodnost, nosečnost in dojenje**

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom preden vzamete katerokoli zdravilo.

Zdravila Celebrex ne smejo jemati nosečnice ali ženske, ki lahko zanosijo med zdravljenjem (npr. ženske v rodni dobi, ki ne uporabljajo ustrezne kontracepcije). Če med jemanjem zdravila Celebrex zanosite, morate z zdravljenjem prekiniti in obiskati zdravnika zaradi nadomestne oblike zdravljenja.

Zdravila Celebrex ne smete jemati med dojenjem.

### **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Pred upravljanjem vozil ali strojev morate vedeti, kako se odzivite na zdravljenje z zdravilom Celebrex. Če ste po jemanju zdravila Celebrex omotični ali utrujeni, ne vozite in ne upravljajte strojev, dokler se ne boste spet počutili dobro.

### **Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Celebrex**

Zdravilo Celebrex vsebuje **laktozo** (vrsto sladkorja). Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

## **3. KAKO JEMATI ZDRAVILO CELEBREX**

Pri jemanju zdravila Celebrex natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Če mislite ali občutite, da je učinek zdravila Celebrex premočan ali prešibak, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom.

Zdravnik vas bo seznanil z odmerjanjem zdravila. Ker se tveganje za neželene učinke, ki so povezani z delovanjem srca, lahko poveča z odmerkom in trajanjem uporabe, je pomembno, da uporabljate najnižji odmerek, ki nadzira vašo bolečino. Prav tako zdravila Celebrex ne smete jemati dlje, kot je potrebno za nadzor simptomov vaše bolezni.

**Kapsule zdravila Celebrex morate pogoltniti cele, z nekaj vode.** Kapsule lahko vzamete kadarkoli tekom dneva, z ali brez hrane. Vseeno skušajte vsak odmerek zdravila Celebrex jemati vsak dan ob približno enakem času.

V kolikor po dveh tednih zdravljenja ni izboljšanja, se posvetujte z zdravnikom.

**Za osteoartrozo** je običajni odmerek 200 mg na dan. Če je potrebno, vam bo zdravnik kasneje povečal odmerek na 400 mg.

Začetni odmerek običajno znaša:

- 200 mg kapsula, enkrat na dan; ali
- 100 mg kapsula, dvakrat na dan.

**Za revmatoidni artritis** je običajni odmerek 200 mg na dan. Če je potrebno, vam bo zdravnik kasneje povečal odmerek na 400 mg.

Začetni odmerek običajno znaša:

- 100 mg kapsula, dvakrat na dan.

**Za ankilozirajoči spondilitis** je običajni odmerek 200 mg na dan. Če je potrebno, vam bo zdravnik kasneje povečal odmerek na 400 mg na dan.

Začetni odmerek običajno znaša:

- 200 mg kapsula, enkrat na dan; ali
- 100 mg kapsula, dvakrat na dan.

**Težave z ledvicami ali jetri:** če imate težave z delovanjem jeter ali ledvic, obvestite o tem svojega zdravnika, ker boste lahko potrebovali nižji odmerek.

**Starejši, zlasti tisti s telesno maso, manjšo od 50 kg:** če ste starejši od 65 let, zlasti če tehtate manj kot 50 kg, vas bo vaš zdravnik morda bolj strogo nadzoroval.

**Otroci:** zdravilo Celebrex je namenjeno odraslim in se ne uporablja pri otrocih.

Dnevno ne smete preseči odmerka 400 mg.

### **Če ste vzeli večji odmerek zdravila Celebrex, kot bi smeli**

Ne vzemite več kapsul, kot vam je predpisal zdravnik. Če pomotoma zaužijete preveč kapsul zdravila Celebrex, takoj pokličite svojega zdravnika, farmacevta ali obiščite najbližjo bolnišnico, pri tem pa s seboj vzemite zdravilo.

### **Če ste pozabili vzeti zdravilo Celebrex**

Če pozabite vzeti kapsulo zdravila, jo vzemite čimprej, t.j. takoj, ko se spomnite. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

### **Če ste prenehali jemati zdravilo Celebrex**

Če zdravljenje z zdravilom Celebrex prekinete nenadoma, to lahko vodi do poslabšanja vaših simptomov. Ne prenehajte jemati zdravila Celebrex, razen če vam to naroči vaš zdravnik. Morda vam bo zdravnik naročil, da pred popolno prekinitvijo zdravljenja odmerek zdravila nekaj dni postopoma zmanjšujete.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

#### 4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Celebrex neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

**Spodaj navedene neželene učinke so opazili pri bolnikih z artritidom, ki so jemali zdravilo Celebrex. Neželeni učinki, označeni z zvezdico (\*), so navedeni po večji pogostnosti, ki se je pojavila pri bolnikih, ki so jemali zdravilo Celebrex za preprečevanje polipov debelega črevesa. Pri teh študijah so bolniki jemali višje odmerke zdravila Celebrex skozi daljše obdobje.**

**Če se pojavi kaj od naslednjega, nehajte jemati zdravilo Celebrex in nemudoma obvestite svojega zdravnika:**

**Če imate:**

- alergijsko reakcijo, npr. kožni izpuščaj, otekel obraz, piskajoče dihanje ali imate težave z dihanjem.
- težave z delovanjem srca, kot je bolečina v prsih.
- hude bolečine v želodcu ali kakšne znake krvavitve v želodec ali črevo, npr. odvajanje črnega ali krvavega blata ali bruhanje krvi.
- kožno reakcijo, npr. izpuščaj, mehurje ali lupljenje kože.
- odpoved jeter (simptomi vključujejo slabost s siljenjem na bruhanje (slabo počutje), drisko, zlatenico (porumenijo vam koža ali očne beločnice)).

**Zelo pogosti neželeni učinki (pojavi se pri več kot 1 od 10 bolnikov):**

- visok krvni tlak\*

**Pogosti neželeni učinki (pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov):**

- srčni infarkt\*
- zastajanje tekočine v telesu, ki lahko povzroči otekanje gležnjev, nog in/ali rok
- okužbe sečil
- kratka sapa\*, sinuzitis (vnetje sinusov, okužba sinusov, zamašene ali boleče obnosne votline), zamašen nos ali izcedek iz nosu, vneto žrelo, kašelj, prehlad, gripozni simptomi
- omotica, težave s spanjem
- bruhanje\*, bolečine v želodcu, driska, prebavne motnje, vetrovi
- izpuščaj, srbenje
- zvečana napetost mišic
- težave s požiranjem\*
- poslabšanje obstoječih alergij

**Občasni neželeni učinki (pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov):**

- možganska kap\*
- srčno popuščanje, palpitanje (občutek razbijanja srca), hiter srčni utrip
- poslabšanje že prej visokega krvnega tlaka
- nenormalni izvidi jetrnih laboratorijskih preiskav
- nenormalni izvidi ledvičnih laboratorijskih preiskav
- anemija (sprememba v številu rdečih krvnih celic, ki se kaže kot utrujenost in zadihanost)
- tesnoba, depresija, izčrpanost, dremavost, občutek mravljinčenja (zbadanje v koži)
- povečana koncentracija kalija v izvidih krvnih preiskav (lahko se kaže kot slabost v želodcu, utrujenost, mišična šibkost ali razbijanje srca)
- poslabšan ali zamegljen vid, zvonjenje v ušesih, bolečine v ustih in vnetja, težave s sluhom\*

- zaprtje, spahovanje, vnetje želodčne sluznice (prebavne težave, bolečine v želodcu ali bruhanje), poslabšanje vnetja želodčne ali črevesne sluznice
- krči v nogah
- srbeč izpuščaj (koprivnica)

**Redki neželeni učinki (pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov):**

- razjede (krvavitve) v želodcu, požiralniku ali prebavilih; predrtje črevesja (lahko povzroči bolečine v trebuhu, zvišano telesno temperaturo, slabost, bruhanje, zaprtje črevesja), črno ali temno blato, vnetje požiralnika (lahko povzroči težave pri požiranju), vnetje trebušne slinavke (povzroči lahko bolečine v trebuhu)
- zmanjšano število belih krvnih celic (ki pomagajo ščititi telo pred okužbami) in krvnih ploščic (večje tveganje krvavitvev in modric)
- težave pri koordinaciji mišičnih gibov
- občutek zmedenosti, spremenjeno zaznavanje okusov
- večja občutljivost za svetlobo
- izpadanje las

**Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):**

- notranje krvavitve možganov, ki povzročijo smrt
- resna alergijska reakcija (vključno z anafilaktičnim šokom; lahko s smrtnim izidom), ki lahko povzroči izpuščaj na koži, otekanje obraza, ustnic, ustne votline, jezika ali požiralnika, piskajoče dihanje ali težko dihanje; oteženo požiranje
- krvavitve v želodcu ali črevesu (povzročijo lahko krvavo blato ali bruhanje), vnetje tankega ali debelega črevesa, slabost s siljenjem na bruhanje (slabo počutje)
- resne kožne spremembe, npr. Stevens-Johnsonov sindrom, ekfoliativni dermatitis in toksična epidermalna nekroliza (povzroči lahko izpuščaj, mehurje ali lupljenje kože) in akutna generalizirana eksantematična pustuloza (rdeča in otekla površina kože s številnimi majhnimi mehurji)
- krvni strdek v žilah v pljučih; simptomi lahko vključujejo nenadno zasoplost, ostro bolečino med dihanjem ali nenadno izgubo zavesti
- odpoved jeter, poškodba jeter in hudo vnetje jeter (včasih je lahko smrtno ali pa je potrebna presaditev jeter); simptomi lahko vključujejo slabost s siljenjem na bruhanje (slabo počutje), drisko, zlatenico (rumeno obarvanje kože ali očesnih beločnic), temen urin, svetlo blato, nagnjenost h krvavitvam, srbenje ali mrzlico
- težave z ledvicami (možna odpoved ledvic, vnetje ledvic)
- nereden srčni utrip
- meningitis (vnetje ovojnic možganov in hrbtenjače)
- halucinacije
- poslabšanje epilepsije (možni so pogostejši in/ali hujši napadi krčev)
- vnetje žil (povzroči lahko zvišano telesno temperaturo, bolečine, vijoličaste pege na koži)
- zamašitev arterij ali ven v očesu, kar vodi do delne ali popolne izgube vida, vnetje očesne veznice, krvavitve v očesu
- zmanjšano število rdečih in belih krvnih celic ter trombocitov (povzroči lahko utrujenost, nagnjenost k pojavu modric, pogosto krvavenje iz nosu in povečano tveganje za infekcije)
- bolečina v prsih
- poslabšano zaznavanje vonja
- obarvanje kože (modrice), boleče in šibke mišice, boleči sklepi
- menstruacijske motnje
- glavobol, rdečica

- nizka koncentracija natrija v izvidih krvnih preiskav (povzroči lahko izgubo apetita, glavobol, slabost s siljenjem na bruhanje (slabo počutje), mišične krče in šibkost)

**V kliničnih študijah, nepovezanih z artritidom ali drugimi artritičnimi boleznimi, v kateri so bolniki jemali zdravilo Celebrex v odmerkih 400 mg na dan do 3 leta, so zabeležili naslednje dodatne neželene učinke:**

**Pogosti neželeni učinki (pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov):**

- težave s srcem: angina pectoris (bolečina v prsih)
- težave z želodcem: sindrom razdraženega črevesa (povzroči lahko bolečine v želodcu, drisko, prebavne težave, vetrove)
- ledvični kamni (povzročijo lahko bolečine v trebuhu ali hrbtu, prisotnost krvi v urinu), oteženo izločanje urina
- zvečanje telesne mase

**Občasni neželeni učinki (pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov):**

- globoka venska tromboza (pojav krvnih strdkov, običajno v nogah, kar lahko povzroči bolečino, oteklino ali rdečino v mečih ali težave z dihanjem)
- težave s prebavili: okužba želodca (lahko povzroči razdraženost in razjedo na želodcu in črevesju)
- zlom spodnjih okončin
- pasasti izpuščaj, okužba kože, ekcem (suh, srbeč izpuščaj), pljučnica (vnetje pljuč (lahko s kašljem, zvišano temperaturo, težkim dihanjem))
- motnje vida, ki povzročijo zamegljen ali poslabšan vid, vrtoglavica zaradi težav z notranjim ušesom, občutljive, vnete ali krvaveče dlesni, vnetje v ustih
- čezmerno uriniranje ponoči, krvavitev iz hemoroidov, pogosto odvajanje blata
- maščobne bule v koži ali drugje, ganglijske ciste (neškodljive oteklina na ali okoli sklepov in kit na dlaneh ali stopalih), otežen govor, nenormalna ali zelo močna krvavitev iz nožnice, boleče dojke
- visoka koncentracija natrija v izvidih krvnih preiskav

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

## **5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA CELEBREX**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Zdravila **Celebrex** ne smete jemati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete vreči v odpadno vodo ali gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

## 6. DODATNE INFORMACIJE

### Kaj vsebuje zdravilo Celebrex

– Zdravilna učinkovina je celekoksib. Ena trda kapsula vsebuje 100 mg oziroma 200 mg celekoksiba.

– Pomožne snovi so:

Telo kapsule:

- laktoza monohidrat,
- natrijev lavrilsulfat,
- povidon K30 (E1201),
- premreženi natrijev karmelozat (E468) in
- magnezijev stearat (E572).

Pokrovček kapsule:

- želatina in
- titanov dioksid (E171).

Tiskarsko črnilo (črnilo za tisk):

- šelak (E904),
- propilenglikol (E1520) in
- indigotin (E132) - le v 100 mg kapsulah
- rumeni železov oksid (E172) - le v 200 mg kapsulah

### Izgled zdravila Celebrex in vsebina pakiranja

Celebrex 100 mg trde kapsule so bele do skoraj bele, trde želatinske kapsule z modro črto na zgornjem in spodnjem delu kapsule ter belima oznakama »7767« na zgornjem delu in »100« na spodnjem delu kapsule.

Pakiranje: škatla s 30 trdimi kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu).

Celebrex 200 mg trde kapsule so bele do skoraj bele, trde želatinske kapsule z zlato črto na zgornjem in spodnjem delu kapsule ter belima oznakama »7767« na zgornjem delu in »200« na spodnjem delu kapsule.

Pakiranje: škatla z 20 trdimi kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu) ali škatla s 30 trdimi kapsulami (3 x 10 kapsul v pretisnem omotu).

### Način izdaje zdravila Celebrex

Rp – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

### Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Pfizer Luxembourg SARL, 51, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luksemburg

### Izdelovalec

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Heinrich-Mack-Str. 35, D-89257 Illertissen, Nemčija



Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet:

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Letališka cesta 3c

1000 Ljubljana

**Navodilo je bilo odobreno: 5.5.2011**