

Navodilo za uporabo

Forosa Combo 70 mg in 1000 mg/880 i.e. filmsko obložene tablete in šumeče tablete

alendronska kislina in kalcij/holekalciferol

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katerekoli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo:

1. Kaj je zdravilo Forosa Combo in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Forosa Combo
3. Kako jemati zdravilo Forosa Combo
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Forosa Combo
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Forosa Combo in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Forosa Combo uporabljamo za zdravljenje osteoporoze pri ženskah v obdobju po menopavzi, ki vsakodnevno potrebujejo tudi dodatke kalcija in vitamina D₃. To kombinirano zdravilo zmanjšuje tveganje za to, da bi prišlo do zlomov hrbtenice in kolkov.

a) Alendronat (alendronska kislina) spada v skupino zdravil, imenovanih difosfonati. Preprečuje izgubljanje kostne mase, do katerega prihaja pri ženskah v obdobju po menopavzi, in pomaga pri ponovni izgradnji kosti.

b) Kalcij/vitamin D₃ zagotavlja kalcij in vitamin D₃ (holekalciferol), ki bi ju vaše telo utegnilo potrebovati za utrditev novo nastale kosti.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Forosa Combo

Ne jemljite zdravila Forosa Combo, če ste/imate

- **alergični** na natrijev alendronat trihidrat, kalcijev karbonat, vitamin D₃, sojo, arašide ali na katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6)
- določene **težave s požiralnikom**, kot je na primer zožitev ali težave pri požiranju
- **ne morete stati ali vzravnano sedeti** najmanj 30 minut
- **ravni kalcija v krvi**, ki so **pod ali nad normalno vrednostjo**
- **ravni kalcija v urinu**, ki so **nad normalno vrednostjo**
- **ravni vitamina D v krvi**, ki so **nad normalno vrednostjo**
- **povečano raven kalcija v ledvicah, ledvične kamne**

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja tega zdravila se posvetujte s svojim zdravnikom, če se karkoli od spodaj navedenega nanaša na vas:

- imate težave z ledvicami,
- imate kakršnekoli težave s požiranjem ali prebavne težave,
- vam je vaš zdravnik povedal, da imate Barrettov požiralnik (bolezen, povezana s spremembami celic, s katerimi je obložen spodnji del požiralnika),
- če so vam povedali, da so ravni kalcija v vaši krvi nizke,
- imate sarkoidozo, bolezen, ki večinoma prizadene pljuča in povzroča kratko sapo ter kašelj,
- že jemljete vitamin D,
- ste imeli ali imate bolečo, oteklo ali odrevenelo čeljust, "občutek težke čeljusti" ali majav zob,
- je zdravstveno stanje vaših zob slabo, imate bolezen dlesni ali za svoje zobe ne skrbite redno (ne hodite redno k zobozdravniku). Lahko vam bodo priporočili, da greste pred začetkom zdravljenja k zobozdravniku na pregled.
- se pri vas izvajajo posegi na zobovju, ali pa bo pri vas opravljen kirurški poseg na zobeh. Svojemu zobozdravniku povejte, da jemljete zdravilo Forosa Combo.
- imate raka,
- prejimate kemoterapijo ali vas zdravijo z obsevanjem,
- jemljete kortikosteroide (kot sta prednizon ali deksametazon),
- kadite ali ste bili kadilec (saj to lahko poveča tveganje za pojav težav z zobmi).

Med zdravljenjem z zdravilom Forosa Combo je pomembno, da vzdržujete dobro ustno higieno. Med zdravljenjem morate redno hoditi k zobozdravniku na pregled zobovja. V primeru, da pri vas pride do kakršnihkoli težav v ustih ali z zobmi, kot so na primer majavi zobje, bolečine ali otekline, pa se morate posvetovati s svojim zdravnikom ali zobozdravnikom.

Lahko pride do draženja, vnetja ali pojava razjed v požiralniku, pogosto s simptomi, kot so bolečine v prsnem košu, zgaga ali težave oziroma bolečine pri požiranju. To še posebej velja za bolnice, ki ne popijejo polnega kozarca vode in/ali se uležijo preden mine 30 minut po zaužitju filmsko obloženih tablet zdravila Forosa Combo. Ti neželeni učinki se lahko poslabšajo, če bolnice po pojavu teh simptomov nadaljujejo z jemanjem zdravila Forosa Combo.

Otroci in mladostniki

Zdravila Forosa Combo ne smete dajati otrokom in mladostnikom.

Druga zdravila in zdravilo Forosa Combo

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katerokoli drugo zdravilo.

a) Zdravila, ki vsebujejo karkoli od spodaj navedenega, zmanjšujejo učinek **alendronata**, če se jih jemlje sočasno:

- kalcij
- antacidi, zdravila za zdravljenje zgage
- nekatera peroralna zdravila, kot so na primer zdravila za zdravljenje bolečin, vnetja ali revmatizma

Ta zdravila vzemite po preteku najmanj 30 minut po tem, ko ste vzeli filmsko obloženo tableto z alendronatom.

b) Za kalcij in vitamin D₃ je znano, da vplivata na delovanje spodaj navedenih zdravil, oziroma ta zdravila lahko vplivajo na delovanje kalcija ali vitamina D₃:

- digitalis: zdravilo za zdravljenje težav s srcem
- antibiotiki z zdravilno učinkovino katere ime se konča na "ciklin"
- zdravila za zmanjševanje vnetja ali za preprečevanje zavrnitve presajenega organa, kot je na primer kortizon
- natrijev fluorid: uporablja se za okrepitev zobne sklenine ali za zdravljenje osteoporoze
- zdravila za povečanje izločanja vode skozi ledvice, ki vsebujejo zdravilne učinkovine, katerih ime se konča na "zid"
- holestiramin: zdravilo za zniževanje ravni maščob v krvi
- odvajala, kot je parafinsko olje

V primeru, da jemljete katero od zgoraj navedenih zdravil, vam bo vaš zdravnik dal nadaljnja navodila.

Zdravilo Forosa Combo skupaj s hrano in pijačo

a) Ne jemljite tablet, ki vsebujejo **alendronat, skupaj s hrano in pijačo**, razen z vodo brez dodatkov. S tem boste zagotovili ustrezno delovanje zdravila. To se še zlasti nanaša na mlečne izdelke, kot je na primer mleko, saj vsebujejo kalcij. Hrano in pijačo, z izjemo same vode, smete zaužiti šele po tem, ko preteče 30 minut po jemanju tablete, ki vsebuje alendronat.

b) Ne jemljite raztopljenih šumečih tablet, ki vsebujejo **kalcij/vitamin D₃** obenem s hrano, ki vsebuje velike količine

- oksalne kisline, kot sta špinača in rabarbara, ali
- fitinske kisline, kot so neoluščene žitarice

Raztopljene tablete jemljite po preteku najmanj dveh ur po uživanju tovrstne hrane.

Nosečnost in dojenje

Zdravilo Forosa Combo je namenjeno le uporabi pri ženskah po menopavzi.

Ne jemljite zdravila Forosa Combo če ste noseči ali dojite, mislite, da bi lahko bili noseči, ali nosečnost načrtujete.

Posvetujte se s svojim zdravnikom ali s farmacevtom preden vzamete to zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Poročali so o neželenih učinkih (vključno z zamegljenim vidom, omotico in hudimi bolečinami v kosteh, mišicah ali sklepah), ki so spremljali jemanje zdravila Forosa Combo, in lahko vplivajo na vašo sposobnost za vožnjo ali upravljanje s stroji. Odzivi posameznikov na zdravilo Forosa Combo se lahko razlikujejo (glejte poglavje "4. Možni neželeni učinki").

Zdravilo Forosa Combo vsebuje natrij, laktozo monohidrat, saharozo in hidrogenirano sojino olje.

Šumeče tablete s kalcijem/vitaminom D₃ vsebujejo laktozo monohidrat in saharozo. Če vam je vaš zdravnik povedal, da nekaterih sladkorjev ne prenašate, se pred začetkom jemanja tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

Šumeče tablete s kalcijem/vitaminom D₃ vsebujejo sojino olje. Če ste alergični na arašide ali sojo, tega zdravila ne jemljite.

Šumeče tablete s kalcijem/vitaminom D₃ vsebujejo 4,2 mmola (96 mg) natrija na eno tableto. To morajo upoštevati bolnice, ki so na dieti z nadzorovanim vnosom natrija.

3. Kako uporabljati zdravilo Forosa Combo

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila svojega zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom.

Zdravilo Forosa Combo predstavlja **tedensko zdravljenje** z/s:

- a) 1 filmsko obloženo tableto, ki vsebuje alendronsko kislino in
- b) 6 šumečimi tabletami, ki vsebujejo kalcij/vitamin D₃

Običajen odmerek za tedenski cikel:

- 1. dan

1 filmsko obložena tableta z alendronsko kislino

Izberite en dan v tednu, ki vam najbolj ustreza. To bo "1. dan" vašega tedenskega ciklusa. Vsak teden na svoj izbrani "1. dan" vzemite eno tableto z alendronsko kislino.

- Dnevi od 2. do 7.

1 šumeča tableta s kalcijem/vitaminom D₃ na dan, naslednjih 6 dni.

Z jemanjem kalcija/vitamina D₃ začnite naslednji dan po dnevu, v katerem ste vzeli tableto z alendronsko kislino.

Nikoli **ne smete v istem dnevu** vzeti tablete z alendronsko kislino in šumeče tablete s kalcijem/vitaminom D₃.

Vsaki 7 dni začnite nov tedenski cikel, tako da na svoj izbrani "1. dan" vzamete tableto z alendronsko kislino.

Način uporabe

a) Tableto z **alendronsko kislino** vzemite celo:

Zelo pomembno je, da upoštevate ta navodila, saj s tem pripomorete, da filmsko obložena tableta z alendronsko kislino hitro pride v želodec, s čimer se zmanjša možnost, da bi prišlo do draženja požiralnika.

- Po tem, ko zjutraj vstanete, in preden zaužijete prvi obrok hrane ali pijače ali kakšno drugo zdravilo, pogoltnite tableto, ki vsebuje alendronsko kislino, s **polnim kozarcem vode** in ničemer drugim (ne manj kot 200 ml).
 - Zdravila ne jemljite z mineralno vodo (niti negazirano niti gazirano).
 - Zdravila ne jemljite s kavo ali čajem.
 - Zdravila ne jemljite s sokom ali z mlekom.
- Tablete ne žvečite niti ne dopustite, da bi se v ustih raztopila.
- Po zaužitju tablete se ne smete uleči - **ostanite popolnoma vzravnani** (bodisi da sedite, stojite ali hodite) - **najmanj 30 minut**. Nato pa se lahko uležete šele po zaužitju prvega obroka hrane v tistem dnevu.
- Tablete ne smete vzeti zvečer pred spanjem ali preden zjutraj vstanete.
- Če pride do težav ali bolečin pri požiranju, bolečin v prsnem košu, ali če se na novo pojavi ali poslabša zgaga, prenehajte jemati zdravilo Forosa Combo in se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Po zaužitju filmsko obloženih tablet zdravila Forosa Combo **počakajte najmanj 30 minut, preden zaužijete svoj prvi obrok hrane, pijače ali vzamete kakšno drugo**

zdravilo tisti dan, vključno z antacidi, kalcijevimi dodatki in vitamini. Filmsko obložene tablete z alendronsko kislino so učinkovite le, če jih vzamete na prazen želodec.

b) Šumečo tableto s **kalcijem/vitaminom D₃** vzemite raztopljeno v kozarcu vode.

Trajanje zdravljenja

O tem bo **odločil** vaš zdravnik.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Forosa Combo, kot bi smeli

a) Popijte **en kozarec mleka** in povejte svojemu zdravniku, da ste vzeli več tablet z **alendronsko kislino**, kot je predpisano. Ne poskušajte izzvati bruhanja. Prav tako se ne smete uleči.

b) Če ste vzeli več šumečih tablet s **kalcijem/vitaminom D₃**, kot bi smeli, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Forosa Combo

a) Če ste pozabili vzeti tableto z alendronsko kislino na dan, ki ste ga izbrali "1. dan":

1. Tableto vzemite na tisti dan, ko se spomnite. Ne vzemite dveh tablet z alendronsko kislino v enem dnevu, da bi nadomestili tableto, ki ste jo pozabili vzeti.
2. Naslednji dan vzemite šumečo tableto s kalcijem/vitaminom D₃. Tablete z alendronsko kislino in šumeče tablete ne smete vzeti na isti dan.
3. Z jemanjem ene šumeče tablete s kalcijem/vitaminom D₃ nadaljujte vsak dan do zaključka tedenskega ciklusa.

Nato začnite z novim tedenskim ciklusom: vzemite eno tableto z alendronsko kislino na svoj izbrani "1. dan".

b) Če ste pozabili vzeti šumečo tableto, ki vsebuje **kalcij/vitamin D₃**:

1. Vzemite jo na dan, ko se spomnite, vendar pa ne vzemite dveh šumečih tablet v istem dnevu. Šumeče tablete in tablete z alendronsko kislino ne smete vzeti na isti dan.
2. Z jemanjem ene šumeče tablete na dan nadaljujte do zaključka tedenskega ciklusa.
3. Tablete, ki ste jih pozabili vzeti, zavržite.

Če ste prenehali jemati zdravilo Forosa Combo

Če z zdravljenjem prenehate, se lahko osteoporoza pri vas poslabša. Preden se odločite za prenehanje zdravljenja, se posvetujte s svojim zdravnikom.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh ljudeh.

a) Možni neželeni učinki, ki jih povzročča alendronat

Zelo pogosti: pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov

- bolečine v kosteh, mišicah in/ali sklepah, ki so včasih hude

Pogosti: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov

- glavobol
- omotica
- bolečine v trebuhu, nelagodni občutek v trebuhu ali kolcanje po jedi

- zaprtje; občutek napolnjenosti ali napihnjenosti v trebuhu
- driska, napenjanje
- zgaga
- težave pri požiranju; bolečine pri požiranju
- razjede v požiralniku, ki lahko povzročijo bolečine v prsnem košu, zgago ali težave ali bolečine pri požiranju
- otekanje sklepov
- izpadanje las
- srbenje
- občutek šibkosti
- otekanje rok ali nog

Občasni: pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov

- motnje v zaznavanju okusa
- siljenje na bruhanje
- bruhanje
- draženje ali vnetje požiralnika ali želodca
- črno ali katranu podobno blato
- kožni izpuščaji, pordelost kože
- prehodni gripi podobni simptomi, kot so na primer boleče mišice, splošno slabo počutje in včasih povišana telesna temperatura, običajno na začetku zdravljenja
- zamegljen vid, bolečine v očeh ali pordelost oči

Redki: pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov

- alergijske reakcije kot na primer koprivnica; otekanje obraza, ustnic, jezika in/ali grla, kar lahko povzroči težave pri dihanju ali požiranju
- zožitev požiralnika
- bolečine v ustih in/ali čeljusti, otekanje ali ranice v ustih, odrevenelost ali občutek teže v čeljusti ali majav zob. To bi lahko bili znaki poškodbe kosti v čeljusti (osteonekroza), ki je na splošno povezana z zapoznelim celjenjem in okužbo, pogosto po izdrtju zoba. V primeru, da pri vas pride do pojava takih simptomov, se posvetujte s svojim zdravnikom ali zobozdravnikom.
- razjede v ustih kadar bolnice tablete žvečijo ali sesajo
- razjede v želodcu ali črevesju (včasih zelo izrazite ali s krvavitvami)
- hude bolečine v kosteh, mišicah in/ali sklepih
- hude kožne reakcije zaradi alergijske reakcije (toksična epidermalna nekroliza, multiformni eritem), simptomi vključujejo povišano telesno temperaturo, splošno neugodno počutje, srbenje kože, bolečine v sklepih, številne spremembe na koži ali pojav mehurjev na koži, ki se lahko pojavijo tudi na obrazu ali ustnicah
- kožni izpuščaji, ki jih sončna svetloba poslabša
- simptomi nizkih ravni kalcija v krvi, vključno s krči ali spazmi v mišicah in/ali občutkom ščemenja v prstih rok ali okrog ust
- redko lahko pride do neobičajnih zlomov stegenice, še zlasti pri bolnicah, ki so se dolgo časa zdravile zaradi osteoporoze

Posvetujte se s svojim zdravnikom, če pri vas pride do bolečine, šibkosti ali nelagodja v stegnu, kolku ali dimljah, saj je to lahko zgodnji znak možnega zloma stegenice.

b) Možni neželeni učinki, ki jih povzročata kalcij/vitamin D₃

Občasni: pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov

- ravni kalcija v krvi so nad normalnimi vrednostmi

Simptomi so prekomerna žeja, izguba teka, utrujenost, v hudih primerih pa nereden srčni utrip.

- ravni kalcija v urinu so nad normalnimi vrednostmi

Redki: pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov

- alergijske reakcije
- zaprtje, vetrovi, siljenje na bruhanje, bruhanje, bolečine v trebuhu, driska
- kožne reakcije, kot so srbenje, kožni izpuščaji in koprivnica

Zelo redki, pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov

- resne alergijske reakcije, ki povzročajo težave pri dihanju ali vrtoglavici, otekanje obraza ali žrela

Posebna skupina bolnikov

Če imate težave z ledvicami, se pri vas lahko pojavijo visoke koncentracije fosfata v krvi, ledvični kamni ali povišane vrednosti kalcija v ledvicah.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika

Center za zastrupitve

Zaloška cesta 2

SI-1000 Ljubljana

Faks: + 386 (0)1 434 76 46

e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

5. Shranjevanje zdravila Forosa Combo

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake "Exp.:". Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Forosa Combo

a) filmsko obložene tablete z alendronsko kislino
Zdravilna učinkovina je natrijev alendronat trihidrat.

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 70 mg alendronske kisline (v obliki 91,35 mg natrijevega alendronata trihidrata).

Druge sestavine tablet z alendronsko kislino so:

- Jedro tablete: mikrokristalna celuloza, brezvodni koloidni silicijev dioksid, premreženi natrijev karmelozat, magnezijev stearat.
- Filmska obloga tablete: mikrokristalna celuloza, karagenan, makrogol 8000.

b) šumeče tablete s kalcijem/vitaminom D₃
Zdravilni učinkovini sta kalcijev karbonat in holekalciferol (vitamin D₃).

Ena šumeča tableta vsebuje:

- 2500 mg kalcijevega karbonata, kar ustreza 1000 mg kalcija.
- 22 mikrogramov (880 internacionalnih enot [i.e.]) holekalciferola (vitamin D₃).

Druge sestavine šumečih tablet so: brezvodna citronska kislina, simetikon, želatina, laktoza monohidrat, makrogol 6000, koruzni škrob, metilceluloza, natrijev ciklamat, natrijev hidrogenkarbonat, povidon K25, natrijev saharinat, hidrogenirano sojino olje, saharoza, vseracemni-alfa-tokoferol, aroma pomarančnega soka (PHS-133147).

Izgled zdravila Forosa Combo in vsebina pakiranja

a) filmsko obložene tablete z alendronsko kislino: Bele, okrogle, filmsko obložene tablete, zaobljene na zgornji in spodnji strani (premer 10 mm), z vtisnjeno oznako "ALN 70" na eni strani. Tablete so pakirane v pretisni omot iz plastike/aluminija.

b) šumeče tablete s kalcijem/vitaminom D₃: Bele, okrogle, šumeče tablete, ravne na obeh straneh (premer 30 mm). Tablete so pakirane v vsebnik.

Zdravilo Forosa Combo je na voljo v pakiranjih, ki vsebujejo:

- 1 filmsko obloženo tableto z alendronsko kislino + 6 šumečih tablet s kalcijem/vitaminom D₃ ali
- 2 filmsko obloženi tableti z alendronsko kislino + 12 šumečih tablet s kalcijem/vitaminom D₃ ali
- 4 filmsko obložene tablete z alendronsko kislino + 24 (2 x 12) šumečih tablet s kalcijem/vitaminom D₃ ali
- 3 x [4 filmsko obložene tablete z alendronsko kislino + 24 (2 x 12) šumečih tablet s kalcijem/vitaminom D₃] ali
- 4 x [4 filmsko obložene tablete z alendronsko kislino + 24 (2 x 12) šumečih tablet s kalcijem/vitaminom D₃] ali
- 6 x [4 filmsko obložene tablete z alendronsko kislino + 24 (2 x 12) šumečih tablet s kalcijem/vitaminom D₃].

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila Forosa Combo

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija

Izdelovalec

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Nemčija

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Belgija: Alendronaat + Calcium/Vitamine D Sandoz 70 mg + 2500 mg/880 IE
filmomhulde tabletten + bruistabletten Combi

Danska: Alendron-Sandoz plus Calcium D 70 mg + 1000 mg/880 I.E.

Luksemburg: Alendronaat + Calcium/Vitamine D Sandoz 70 mg + 2500 mg/880 IE
comprimés pelliculés + comprimés effervescents Combi

Romunija : Bonaterol 70 mg comprimate filmate și Calciu/Vitamina D3 1000 mg/880 UI
comprimate efervescente

Slovenija: Forosa® Combo 70 mg in 1000 mg/880 i.e. filmsko obložene tablete in
šumeče tablete

Velika Britanija: Alendronic Acid 70 mg Tablets plus Calcium/Vitamin D 1000mg/880 IU
Effervescent Tablets

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 14.4.2015