

Navodilo za uporabo

Piramil 2,5 mg tablete Piramil 5 mg tablete Piramil 10 mg tablete

ramipril

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Piramil in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Piramil
3. Kako jemati zdravilo Piramil
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Piramil
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Piramil in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Piramil vsebuje učinkovino ramipril. Zdravilo Piramil sodi v skupino zdravil, ki se imenujejo zaviralci ACE (encima angiotenzinske konvertaze).

Zdravilo Piramil deluje tako, da:

- v telesu zmanjša nastajanje snovi, ki lahko zvišajo krvni tlak,
- sprosti in razširi žile,
- srcu olajša črpanje krvi po telesu.

Zdravilo Piramil se lahko uporablja za:

- zdravljenje visokega krvnega tlaka (hipertenzije),
- zmanjšanje tveganja za srčni infarkt ali možgansko kap,
- zmanjšanje tveganja ali upočasnitev poslabšanja težav z ledvicami (ne glede na to ali imate sladkorno bolezen ali ne),
- za zdravljenje stanja, pri katerem srce ne more prečrpati dovolj krvi po telesu (to stanje imenujemo srčno popuščanje),
- zdravljenje po srčnem infarktu (miokardnem infarktu), pri katerem se kot zaplet pojavi srčno popuščanje.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Piramil

Ne jemljite zdravila Piramil,

- če ste alergični na ramipril, kateri koli drug zaviralec ACE ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
Med znaki alergijske reakcije so lahko izpuščaji, težave s požiranjem ali dihanjem, oteklost ustnic, obraza, žrela ali jezika.
- če ste kdajkoli imeli resno preobčutljivostno reakcijo imenovano »angioedem«. Znaki vključujejo srbenje, koprivnico (urtikarijo), rdeče spremembe na rokah, stopalih in žrelu, oteklost žrela in jezika, oteklost okrog oči in ustnic, težko dihanje in težko požiranje.
- če se zdravite z dializo ali kakšno drugo vrsto filtracije krvi.
Odvisno od za to uporabljene naprave, je mogoče, da zdravilo Piramil ni primerno za vas.
- če imate ledvične težave, zaradi katerih pride do zmanjšane oskrbe s krvjo (zaradi zožitve ledvičnih arterij).
- v zadnjih **6 mesecih nosečnosti** (glejte poglavje spodaj Nosečnost in dojenje).
- če imate nenormalno nizek ali nestabilen krvni tlak. To mora oceniti zdravnik.
- če imate sladkorno bolezen ali okvarjeno delovanje ledvic in se zdravite z zdravilom za znižanje krvnega tlaka, ki vsebuje aliskiren.
- če ste vzeli ali trenutno jemljete sakubitril/valsartan, zdravilo, ki se uporablja pri zdravljenju vrste dolgotrajnega (kroničnega) srčnega popuščanja pri odraslih, zaradi povečanega tveganja za angioedem (hitro otekanje pod kožo na predelu, kot je žrelo).

Če karkoli od zgoraj naštetega velja za vas, ne vzemite zdravila Piramil. Če ste negotovi se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom preden vzamete zdravilo Piramil.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Piramil se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom,

- če imate težave s srcem, jetri ali ledvicami.
- če ste izgubili veliko količino telesnih soli ali tekočin (zaradi bolezni (bruhanja), driske, prekomernega potenja, diete z malo soli, dolgotrajnega jemanja diuretikov (tablete za odvajanje vode) ali dialize).
- če imate predvideno zdravljenje za odpravljanje alergije na pike čebel ali os (desenzibilizacija).
- če boste prejeli anestetik. Dobite ga lahko za operacijo ali kakšen zobozdravstveni poseg. Morda boste morali en dan pred tem prenehati z jemanjem zdravila Piramil; posvetujte se z zdravnikom.
- če imate visoke vrednosti kalija v krvi (ugotovljeno s krvnimi preiskavami).
- če jemljete zdravila ali imate stanja, ki lahko znižajo raven natrija v krvi. Vaš zdravnik bo morda opravljal redne krvne preiskave, zlasti za preverjanje ravni natrija v krvi, še posebej če ste starejši.
- če jemljete katero koli od naslednjih zdravil, se lahko poveča tveganje angioedema:
 - racekadotril, zdravilo za zdravljenje driske;
 - zdravila za preprečevanje zavrnitve presajenih organov in za zdravljenje raka (zaviralci mTOR, npr. temsirolimus, sirolimus, everolimus);

- vildagliptin in druga zdravila, ki spadajo v razred zaviralcev dipeptidil-peptidaze 4, zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje sladkorne bolezni.
- če imate kolagensko žilno bolezen, kot je skleroderma ali sistemski eritematozni lupus.
- če jemljete katero od naslednjih zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje visokega krvnega tlaka:
 - blokator receptorjev angiotenzina II (ARB) (ta zdravila imenujemo tudi "sartani" – mednje spadajo na primer valsartan, telmisartan in irbesartan), še zlasti če imate kakšne težave z ledvicami, ki so povezane s sladkorno boleznijo.
 - aliskiren.

Zdravnik vam bo morda v rednih presledkih kontroliral delovanje ledvic, krvni tlak in količino elektrolitov (npr. kalija) v krvi.

Glejte tudi informacije pod naslovom "Ne jemljite zdravila Piramil".

- Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali bi lahko zanosili). Uporaba zdravila Piramil ni priporočljiva v prvem trimesečju nosečnosti, po tretjem mesecu nosečnosti tega zdravila ne smete jemati, ker lahko povzroči resno škodo vašemu otroku (glejte poglavje spodaj Nosečnost in dojenje).

Otroci in mladostniki

Zdravila Piramil ni priporočljivo uporabljati pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let, ker za to populacijo varnosti in učinkovitosti ramiprila niso dokazali.

Če karkoli od naštetega velja za vas (ali niste prepričani), se posvetujete z zdravnikom, preden vzamete zdravilo Piramil.

Druga zdravila in zdravilo Piramil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo. Zdravilo Piramil lahko vpliva na delovanje drugih zdravil, prav tako pa lahko tudi nekatera druga zdravila vplivajo na delovanje zdravila Piramil.

Povejte zdravniku, če jemljete katero od naslednjih zdravil, saj le ta lahko zmanjšajo učinke zdravila Piramil:

- zdravila za lajšanje bolečin in vnetja (npr. nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID), kot so ibuprofen ali indometacin in acetilsalicilna kislina),
- zdravila za zdravljenje nizkega krvnega tlaka, šoka, srčnega popuščanja, astme ali alergij, kot so efedrin, noradrenalin ali adrenalin. Zdravnik vam bo moral preverjati krvni tlak.

Povejte zdravniku, če jemljete katero od naslednjih zdravil. Naslednja zdravila lahko povečajo možnost neželenih učinkov, če jih jemljete skupaj z zdravilom Piramil:

- zdravila za lajšanje bolečin in vnetja (npr. nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID), kot so ibuprofen ali indometacin in acetilsalicilna kislina);
- zdravila za zdravljenje raka (kemoterapija);
- temsirolimus (za zdravljenje raka);
- sirolimus, everolimus (za preprečevanje zavrnitve presadka);
- diuretiki (tablete za odvajanje vode), kot je furosemid;
- prehranska dopolnila s kalijem (vključno z nadomestki soli), diuretiki, ki varčujejo s kalijem (npr. spironolakton, triamteren, amilorid), in druga zdravila, ki lahko

povečajo količino kalija v krvi (npr. trimetoprim in kotrimoksazol za zdravljenje okužb, ki jih povzročajo bakterije; ciklosporin, imunosupresivno zdravilo za preprečevanje zavrnitve presajenih organov, in heparin, zdravilo, ki se uporablja za redčenje krvi za preprečevanje strdkov);

- steroidna zdravila proti vnetju, kot je prednizolon;
- alopurinol (uporablja se za zniževanje sečne kisline v krvi);
- prokainamid (za težave s srčnim ritmom);
- vildagliptin (uporablja se za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2);
- racekadotril (za zdravljenje driske).

Zdravnik vam bo morda moral spremeniti odmerek in/ali upoštevati druge previdnostne ukrepe:

Če jemljete blokator receptorjev angiotenzina II (ARB) ali aliskiren (glejte tudi informacije pod naslovoma "Ne jemljite zdravila Piramil" in "Opozorila in previdnostni ukrepi").

Povejte zdravniku, če jemljete katero od naslednjih zdravil. Zdravilo Piramil lahko vpliva na delovanje naslednjih zdravil:

- zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni, kot so peroralna zdravila za zniževanje glukoze in insulin. Zdravilo Piramil lahko zniža krvni sladkor. Med jemanjem zdravila Piramil morate redno spremljati vaš krvni sladkor.
- litij (za duševne motnje). Zdravilo Piramil lahko poveča količino litija v krvi. Zdravnik vam bo moral natančno spremljati količino litija.

Če karkoli od naštetega velja za vas (ali če niste prepričani), se, preden vzamete zdravilo Piramil, posvetujte s svojim zdravnikom.

Zdravilo Piramil skupaj s hrano in pijačo

- Pitje alkoholnih pijač hkrati z jemanjem zdravila Piramil lahko povzroči omotico ali vrtoglavost. Če vas skrbi, koliko lahko med jemanjem zdravila Piramil popijete, se posvetujte z zdravnikom, saj lahko alkohol poveča učinke zdravil za zniževanje krvnega tlaka.
- Zdravilo Piramil lahko vzamete s hrano ali brez nje.

Nosečnost in dojenje

Nosečnost

Zdravniku morate povedati, če se vam zdi, da ste noseči (ali bi lahko zanosili). Zdravila Piramil ni dobro jemati v prvih 12 tednih nosečnosti, od 13. tedna naprej pa ga sploh ne smete jemati, ker lahko njegova uporaba med nosečnostjo škoduje otroku.

Če zanosite med zdravljenjem z zdravilom Piramil, morate takoj obvestiti zdravnika. Pred načrtovano nosečnostjo je treba vnaprej opraviti prehod na ustrezno alternativno zdravljenje.

Dojenje

Zdravila Piramil ne smete jemati, če dojite.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katero koli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Med jemanjem zdravila Piramil se lahko pojavi omotica. Verjetnost pojava omotice je večja ob začetku jemanja zdravila Piramil ali pri prehodu na višjo jakost. Če se to pojavi pri vas, ne vozite ali upravljajte s stroji.

3. Kako jemati zdravilo Piramil

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Jemanje tega zdravila

- Zdravilo zaužijte skozi usta vsak dan ob istem času.
- Tableto pogoltnite celo in s tekočino.
- Tablete ne smete drobiti ali žvečiti.

Koliko zdravila morate vzeti

Zdravljenje visokega krvnega tlaka

- Običajen začetni odmerek je 1,25 mg ali 2,5 mg enkrat na dan.
- Zdravnik vam bo prilagajal količino zdravila, dokler vaš krvni tlak ne bo urejen.
- Največji dnevni odmerek je 10 mg enkrat na dan.
- Če že jemljete diuretike (tablete za odvajanje vode), vam bo zdravnik pred začetkom zdravljenja z zdravilom Piramil morda naročil, da diuretike prenehate jemati, ali vam bo odmerek diuretika zmanjšal.

Za zmanjšanje tveganja za srčni infarkt in možgansko kap

- Običajen začetni odmerek je 2,5 mg enkrat na dan.
- Zdravnik se nato lahko odloči in poveča odmerek, ki ga jemljete.
- Običajen odmerek je 10 mg enkrat na dan.

Zdravljenje za zmanjšanje ali upočasnitev slabšanja težav z ledvicami

- Zdravljenje je mogoče začeti z odmerkom 1,25 mg ali 2,5 mg enkrat na dan.
- Zdravnik vam bo prilagodil odmerek, ki ga jemljete.
- Običajen odmerek je 5 mg ali 10 mg enkrat na dan.

Zdravljenje srčnega popuščenja

- Običajen začetni odmerek je 1,25 mg enkrat na dan.
- Zdravnik vam bo prilagodil odmerek, ki ga jemljete.
- Največji dnevni odmerek je 10 mg. Priporočeno je jemanje zdravila dvakrat na dan.

Zdravljenje po srčnem infarktu

- Običajen začetni odmerek je od 1,25 mg enkrat na dan do 2,5 mg dvakrat na dan.
- Zdravnik vam bo prilagodil odmerek, ki ga jemljete.
- Običajen odmerek je 10 mg na dan. Priporočeno je jemanje zdravila dvakrat na dan.

Starejši

Zdravnik bo zmanjšal začetni odmerek in bo bolj počasi prilagajal vaše zdravljenje.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Piramil, kot bi smeli

Takoj se posvetujte z zdravnikom ali pojdite v ambulanto za nujno pomoč najbližje bolnišnice. Ne vozite v bolnišnico sami, pelje naj vas nekdo drug ali pokličite reševalce. S seboj vzemite ovojnino zdravila, tako bo zdravnik lahko vedel, kaj ste vzeli.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Piramil

- Če ste pozabili vzeti odmerek, običajen odmerek vzemite ob naslednjem predvidenem času.
- Ne vzemite dvojnega odmerka zdravila, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če opazite katerega od naslednjih resnih neželenih učinkov, nehajte jemati to zdravilo in nemudoma pojdite k zdravniku. Morda boste potrebovali nujno zdravniško pomoč:

- Oteklost obraza, ustnic ali žrela, ki otežijo požiranje ali dihanje, kot tudi srbenje in izpuščaji. To je lahko znak hude alergijske reakcije na to zdravilo.
- Med hudimi kožnimi reakcijami so izpuščaj, razjede v ustih, poslabšanje že obstoječe bolezni kože, pordelost, mehurji ali odstopanje kože (npr. Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza ali multififormni eritem).

Zdravnika morate nemudoma obvestiti, če se vam pojavijo:

- Hitrejše bitje srca, neenakomerno ali močno bitje srca (palpitacije), bolečine v prsih, tiščanje v prsih ali resnejše težave, vključno s srčnim infarktom in možgansko kapjo.
- Težko dihanje ali kašelj. To so lahko znaki težav s pljuči.
- Večja nagnjenost k podplutbam, dolgotrajnejše krvavitve kot ponavadi, kakršne koli krvavitve (npr. krvavitev iz dlesni), vijoličaste pege na koži ali večja nagnjenost k okužbam kot ponavadi, vnetje žrela in zvišana telesna temperatura, utrujenost, omedlevica, omotica ali bledica. To so lahko znaki težav s kostnim mozgom.
- Huda bolečina v želodcu, ki lahko sega v hrbet. To je lahko znak pankreatitisa (vnetja trebušne slinavke).
- Zvišana telesna temperatura, mrzlica, utrujenost, izguba teka, bolečine v želodcu, siljenje na bruhanje, porumenelost kože ali očesnih beločnic (zlatenica). To so lahko znaki težav z jetri, npr. hepatitisa (vnetja jeter) ali okvare jeter.

Drugi neželeni učinki

Zdravniku ali farmacevtu morate povedati, če kateri od teh neželenih učinkov postane resen ali traja dlje kot le nekaj dni.

Pogosti (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov)

- glavobol ali utrujenost
- omotica. Verjetnost omotice je večja, ko začnete jemati zdravilo Piramil ali začnete jemati večji odmerek
- omedlevica, nenormalno nizek krvni tlak (hipotenzija), zlasti kadar hitro vstanete ali sedete
- suh dražeč kašelj, vnetje obnosnih votlin (sinuzitis) ali bronhitis, kratka sapa
- bolečine v želodcu ali črevesju, driska, prebavne težave, siljenje na bruhanje ali bruhanje
- izpuščaj na koži, z dvignjenim predelom ali brez njega
- bolečine v prsnem košu
- krči ali bolečine v mišicah
- krvne preiskave kažejo več kalija v krvi kot običajno

Občasni (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov)

- težave z ravnotežjem (vrtoglavica)
- srbenje in neobičajne zaznave na koži, npr. odrevenelost, mravljinčenje, zbadanje, pekoč ali gomazeč občutek na koži (parestezije)
- izguba ali sprememba okusa
- težave s spanjem
- potrtost, tesnobnost, izrazitejša živčnost kot ponavadi ali nemir
- zamašen nos, težko dihanje ali poslabšanje astme
- oteklost črevesja, ki jo imenujemo "intestinalni angioedem" in se kaže s simptomi, kot so bolečine v trebuhu, bruhanje in driska
- zgaga, zaprtje ali suha usta
- odvajanje več vode (urina) čez dan kot ponavadi
- močnejše znojenje kot ponavadi
- izguba ali zmanjšanje teka (neješčnost)
- hitrejša ali neredno bitje srca
- oteklost rok ali nog. To je lahko znak, da se v telesu zadržuje več vode kot ponavadi
- zardevanje
- zamegljen vid
- bolečine v sklepih
- zvišana telesna temperatura
- impotenca pri moških, zmanjšano spolno poželenje pri moških ali ženskah
- večje število določenih belih krvnih celic (eozinofilija) na preiskavah krvi
- spremembe izvidov krvnih preiskav, ki kažejo delovanje jeter, trebušne slinavke ali ledvic

Redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- občutek tresenja ali zmedenosti
- rdeč in otekel jezik
- hudo luščenje ali lupljenje kože, srbeč in bulast izpuščaj
- težave z nohti (npr. zrahljanje ali odstopanje nohtov z nohtne posteljice)
- izpuščaj na koži ali podplutbe
- pege na koži in hladni udi

- rdeče, srbeče, otekle ali solzeče se oči
- motnje sluha ali zvenenje v ušesih
- občutek šibkosti
- spremembe izvidov krvnih preiskav, ki kažejo zmanjšanje števila eritrocitov, levkocitov ali trombocitov ali zmanjšanje količine hemoglobina

Zelo redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

- prekomerna občutljivost na sončno svetlobo

Drugi neželeni učinki, o katerih so poročali: Zdravniku ali farmacevtu morate povedati, če kateri od teh neželenih učinkov postane resen ali traja dlje kot le nekaj dni.

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- Koncentriran urin (temne barve), slabost ali bruhanje, mišični krči, zmedenost in epileptični krči, ki lahko nastanejo zaradi neustreznega izločanja antidiuretičnega hormona. Če imate katerega od naštetih simptomov, takoj stopite v stik z zdravnikom.
- težave s koncentracijo
- oteklost ust
- preiskave krvi, ki kažejo premalo krvnih celic v krvi
- preiskave krvi, ki kažejo manj natrija v krvi, kot ponavadi
- prsti na rokah in nogah spremenijo barvo, kadar ste na hladnem, potem pa mravljinčijo ali bolijo, ko se ogrejejo (Raynaudov pojav)
- povečanje prsi pri moških
- počasno ali prizadeto reagiranje
- pekoč občutek
- spremembe zaznavanja vonja stvari
- izpadanje las

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco, Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana; Tel: +386 (0)8 2000 500, Faks: +386 (0)8 2000 510, e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si. S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Piramil

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na dvojnem traku, pretisnem omotu in škatli, poleg oznake »EXP«. Rok uporabnosti se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Piramil

- Učinkovina je ramipril.
Ena tableta vsebuje 2,5 mg ramiprila.
Ena tableta vsebuje 5 mg ramiprila.
Ena tableta vsebuje 10 mg ramiprila.
- Druge sestavine zdravila so mikrokristalna celuloza, predgelirani (koruzni) škrob, silicijev dioksid (E 551), glicinijev klorid (E 640), glicerildibehenat, rumeni železov oksid (E 172) (samo za 2,5 mg), rdeči železov oksid (E 172) (samo za 5 mg).

Izgled zdravila Piramil in vsebina pakiranja

2,5 mg tablete:

Podolgovate, svetlo rumene melirane tablete, z zarezo na eni strani. Tableta se lahko deli na enake odmerke.

5 mg tablete:

Podolgovate, svetlo rožnate melirane tablete, z zarezo na eni strani. Tableta se lahko deli na enake odmerke.

10 mg tablete:

Podolgovate, bele do belkaste tablete, z zarezo na eni strani. Tableta se lahko deli na enake odmerke.

Tablete so pakirane v aluminij/LDPE/LDPE/aluminij dvojni trak ali OPA/aluminij/PE/PE/aluminij pretisne omote ali OPA/aluminij/PVC/PVC/aluminij pretisne omote, ki so vstavljeni v škatlo.

Velikosti pakiranj:

10, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 100 x 1, 250 tablet

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila Piramil

Rp – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalci

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, Kundl, Avstrija

Izdelovalci

Lek S.A., ul.Podlipie 16, 95-010 Strykow, Poljska

Lek S.A., ul.Domaniewska 50 C, 02-672 Varšava, Poljska

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Nemčija

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Avstrija

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavnika imetnika dovoljenja za promet z zdravilom:

Lek farmacevtska družba d.d, Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Avstrija	Ramipril Sandoz 1,25 mg – Tabletten Ramipril Sandoz 2,5 mg – Tabletten Ramipril Sandoz 5 mg – Tabletten Ramipril Sandoz 10 mg – Tabletten
Češka	PIRAMIL 1,25 mg PIRAMIL 2,5 mg PIRAMIL 5 mg PIRAMIL 10 mg
Danska	Ramipril Sandoz
Estonija	Ramicor 2,5 mg Ramicor 5 mg Ramicor 10 mg
Finska	Ramipril Sandoz 1,25 tabletti Ramipril Sandoz 2,5 tabletti Ramipril Sandoz 5 tabletti Ramipril Sandoz 10 tabletti
Madžarska	Piramil 1,25 mg tableta Piramil 2.5 mg tableta Piramil 5 mg tableta Piramil 10 mg tableta
Italija	RAMIPRIL HEXAL AG 10 mg compresse
Latvija	Ramicor 2,5 mg tabletes Ramicor 5 mg tabletes Ramicor 10 mg tabletes
Litva	Ramicor 1,25 mg Ramicor 2,5 mg Ramicor 5 mg Ramicor 10 mg
Nizozemska	Ramipril Sandoz 1,25 mg, tabletten 1,25 mg Ramipril Sandoz 2,5 mg, tabletten 2,5 mg Ramipril Sandoz 5 mg, tabletten 5 mg Ramipril Sandoz 10 mg, tabletten 10 mg
Norveška	Ramipril sandoz tabletter 1.25 mg Ramipril sandoz tabletter 2.5 mg

	Ramipril sandoz tableter 5 mg
	Ramipril sandoz tableter 10 mg
Poljska	Piramil 1,25 mg
	Piramil 2,5 mg
	Piramil 5 mg
	Piramil 10 mg
Portugalska	RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg COMPRIMIDOS
	RAMIPRIL SANDOZ 5 mg COMPRIMIDOS
	RAMIPRIL SANDOZ 10 mg COMPRIMIDOS
Slovaška	Piramil 1,25 mg tables
	Piramil 2,5 mg tables
	Piramil 5 mg tables
	Piramil 10 mg tables
Slovenija	Piramil 2,5 mg tablete
	Piramil 5 mg tablete
	Piramil 10 mg tablete
Švedska	Ramipril Sandoz 1,25 mg tablett
	Ramipril Sandoz 2,5 mg tablett
	Ramipril Sandoz 5 mg tablett
	Ramipril Sandoz 10 mg tablett

Navodilo je nazadnje revidirano dne 11.7.2025