NAVODILO ZA UPORABO

Navodilo za uporabo
Kabazitaksel EVER Pharma 10 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

kabazitaksel

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, s farmacevtom ali z medicinsko sestro.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom, s farmacevtom ali z medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste prejeli zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma
3. Kako uporabljati zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Kabazitaksel EVER Pharma
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma in za kaj ga uporabljamo

Vaše zdravilo se imenuje Kabazitaksel EVER Pharma. Njegovo splošno ime je "kabazitaksel". Zdravilo spada v skupino zdravil, imenovanih "taksani", ki se uporabljajo za zdravljenje raka.

Zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma se uporablja za zdravljenje raka prostate, ki je napredoval po zdravljenju z drugo kemoterapijo. Deluje tako, da prepreči rast in razmnoževanje celic.

Kot del zdravljenja boste vsak dan zaužili tudi kortikosteroidno zdravilo (prednizon ali prednizolon). Za informacije o tem drugem zdravilu se obrnite na svojega zdravnika.

2. Kaj morate vedeti, preden boste prejeli zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma

Ne uporabljajte zdravila Kabazitaksel EVER Pharma:

- če ste alergični (preobčutljivi) na kabazitaksel, druge taksane, ali polisorbat 80 ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če imate premalo belih krvnih celic (število nevtrofilcev manj kot ali enako $1.500/mm^3$),
- če imate hude motnje delovanja jeter,
- ste pred kratkim prejeli ali boste prejeli cepivo proti rumeni mrzlici.

Če kaj od navedenega velja za vas, ne smete dobiti zdravila Kabazitaksel EVER Pharma. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom, preden dobite zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred vsakim zdravljenjem z zdravilom Kabazitaksel EVER boste morali opraviti preiskave krvi, s katerimi bo zdravnik preveril, ali imate dovolj krvnih celic ter zadostno delovanje jeter in ledvic, da lahko dobite zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma.

Zdravniku morate nemudoma povedati:

- če imate zvišano telesno temperaturo. Med zdravljenjem z zdravilom Kabazitaksel EVER Pharma je verjetneje, da se vam število belih krvnih celic zmanjša. Zdravnik vam bo kontroliral kri in splošno stanje glede znakov okužbe. Morda vam bo dal druga zdravila za ohranitev števila krvnih celic. Osebam z majhnim številom krvnih celic se lahko pojavijo smrtno nevarne okužbe. Najzgodnejši znak okužbe je lahko zvišana telesna temperatura; če se vam pojavi, morate o tem takoj obvestiti zdravnika.
- če ste kdaj imeli kakšne alergije. Med zdravljenjem z zdravilom Kabazitaksel EVER Pharma se lahko pojavijo resne alergijske reakcije.
- če imate hudo ali dolgotrajno drisko, čutite slabost v želodcu ali bruhate. Vse to lahko povzroči hudo dehidracijo. Zdravnik vas bo morda moral zdraviti.
- če imate občutek omrtvičenosti, mravljinčenja, pekoč občutek ali zmanjšan občutek v vaših rokah in nogah.
- imate krvavitev iz črevesa ali spremenjeno barvo blata ali bolečine v želodcu. Če so krvavitev ali bolečine hude, bo zdravnik končal vaše zdravljenje z zdravilom Kabazitaksel EVER Pharma. Zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma namreč lahko poveča tveganje za krvavitve ali za nastanek predrtja (luknje) v steni črevesa.
- če imate težave z ledvicami.
- če se vam pojavi rumeno obarvanje kože in oči, temno obarvanje urina, huda navzea (slabost) ali bruhanje, ker je to lahko znak težav z jetri.
- če opazite kakršnokoli pomembno povečanje ali zmanjšanje dnevnega volumna urina.
- če imate kri v urinu.

Če kaj od naštetega velja za vas, morate o tem nemudoma obvestiti svojega zdravnika. Zdravnik vam lahko zmanjša odmerek zdravila Kabazitaksel EVER Pharma ali konča zdravljenje.

Druga zdravila in zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma

Obvestite svojega zdravnika, farmacevta ali medicinsko sestro, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta. Nekatera zdravila namreč lahko vplivajo na delovanje zdravila Kabazitaksel EVER Pharma in zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma lahko vpliva na delovanje drugih zdravil. Med takšnimi zdravili so:

- ketokonazol, rifampicin (za okužbe),
- karbamazepin, fenobarbital ali fenitoin (za napade krčev),
- šentjanževka (*Hypericum perforatum*) (zeliščno zdravilo proti depresiji in drugim stanjem),
- statini (kot so simvastatin, lovastatin, atorvastatin, rosuvastatin ali pravastatin) (za zniževanje ravni holesterola v vaši krvi),
- valsartan (za povišan krvni tlak),

- repaglinid (za sladkorno bolezen).

Med zdravljenjem z zdravilom Kabazitaksel EVER Pharma se pred kakršnimkoli cepljenjem posvetujte s svojim zdravnikom.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma se ne sme uporabljati pri nosečnicah ali ženskah v rodni dobi, ki ne uporabljajo kontracepcije.

Zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma se med dojenjem ne sme uporabljati.

V kolikor lahko vaša partnerka zanosi ali bi lahko zanosila, med spolnim odnosom uporabljajte zaščito. Zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma se lahko pojavi v semenski tekočini (spermi) in lahko vpliva na plod. Priporočljivo je, da med zdravljenjem in še 6 mesecev po zdravljenju ne pride do oploditve. Priporočljivo je tudi, da se pred zdravljenjem posvetujete o shranitvi semenske tekočine, kajti zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma lahko vpliva na plodnost moškega.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Med zdravljenjem s tem zdravilom se vam lahko pojavi utrujenost ali omotica. Če se vam to zgodi, ne upravljajte vozil, strojev ali orodij, dokler se ne počutite bolje.

Zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma vsebuje etanol (alkohol)

Viala 4,5 ml
Zdravilo vsebuje 888,8 mg alkohola (etanola)v vsaki viali. Količina v 4,5ml zdravila ustreza 22,5 ml piva ali 9,4 ml vina.

Viala 5 ml
Zdravilo vsebuje 987,5 mg alkohola (etanola)v vsaki viali. Količina v 5 ml zdravila ustreza 25 ml piva ali 10,4 ml vina.

Viala 6 ml
Zdravilo vsebuje 1185 mg alkohola (etanola)v vsaki viali. Količina v 6 ml zdravila ustreza 30 ml piva ali 12,5 ml vina.

Količina alkohola v tem zdravilu verjetno ne bo vplivala na odrasle in mladostnike.

Količina alkohola v tem zdravilu lahko spremeni učinke drugih zdravil. Če jemljete druga zdravila, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom.

Če spadate v skupino ljudi, ki imajo težave s prekomernim uživanjem alkohola, se pred jemanjem tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom.

3. Kako uporabljati zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma

Navodila za uporabo

Preden boste dobili zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma boste dobili zdravila proti alergiji za zmanjšanje tveganja alergijskih reakcij.

- Zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma vam bo dal zdravnik ali medicinska sestra.
- Zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma je treba pred dajanjem pripraviti (redčiti). To navodilo vključuje praktične informacije za ravnanje z zdravilom Kabazitaksel EVER Pharma in za njegovo dajanje, namenjene zdravnikom, medicinskim sestram in farmacevtom.
- Zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma boste dobili v kapalni (infuziji) v eno od ven (intravensko); dobili ga boste v bolnišnici, infuzija pa bo trajala približno eno uro.
- Kot del zdravljenja boste vsak dan zaužili tudi kortikosteroidno zdravilo (prednizon ali prednizolon).

Koliko zdravila boste dobili in kako pogosto

- Običajen odmerek je odvisen od telesne površine. Zdravnik bo izračunal vašo telesno površino v kvadratnih metrih (m2) in glede nanjo določil odmerek, ki ga morate dobiti.
- Po navadi boste dobili eno infuzijo enkrat na 3 tedne.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi tega zdravila, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Zdravnik se bo o tem z vami pogovoril in vam bo pojasnil možna tveganja in koristi vašega zdravljenja.

Nemudoma obiščite zdravnika, če opazite katerega od naslednjih neželenih učinkov:

- zvišano telesno temperaturo (vročino). Ta je pogosta (pojavi se lahko pri največ kot 1 od 10 ljudi).
- hudo izgubo telesnih tekočin (dehidracijo). Ta je pogosta (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 ljudi). Pojavi se lahko, če imate hudo ali dolgotrajno drisko, zvišano telesno temperaturo ali če bruhate.
- hude bolečine v trebuhu ali bolečine v trebuhu, ki ne minejo. To se lahko pojavi, če imate predrtje v želodcu, požiralniku ali črevesu (gastrointestinalna perforacija). To lahko povzroči smrt.

Če kaj od naštetega velja za vas, morate o tem nemudoma obvestiti svojega zdravnika.

Med drugimi neželenimi učinki so:

Zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 ljudi):

- zmanjšanje števila rdečih krvnih celic (anemija) ali belih krvnih celic (ki so pomembne pri premagovanju okužb)
- zmanjšano število krvnih ploščic (kar se odraža kot povečano tveganje krvavitev)
- izguba apetita (neješčnost)
- prebavne težave, vključno s slabostjo v želodcu, bruhanjem, drisko ali zaprtjem
- bolečine v hrbtu
- kri v urinu
- utrujenost, šibkost ali pomanjkanje energije.

Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 ljudi):

- spremenjeno okušanje
- kratka sapa
- kašelj
- bolečine v trebuhu
- kratkotrajna izguba las in dlak (večinoma se njihova normalna rast obnovi)
- bolečine v sklepih
- okužba sečil
- pomanjkanje belih krvnih celic, povezano z zvišano telesno temperaturo in okužbo
- občutek omrtvičenosti, mravljinčenja, pekoč občutek ali zmanjšano zaznavanje v dlaneh in stopalih
- omotica
- glavobol
- znižanje ali zvišanje krvnega tlaka
- nelagodje v želodcu, zgaga ali spahovanje
- bolečine v trebuhu
- hemoroidi
- mišični spazem
- boleče ali pogosto uriniranje
- inkontinenca urina
- bolezen ledvic ali težave z ledvicami
- razjeda v ustih ali na ustnicah
- okužbe ali tveganje okužb
- visok sladkor v krvi
- nespečnost
- duševna zmedenost
- občutek tesnobnosti
- nenormalni občutki ali izguba zaznavanja ali bolečine v dlaneh in stopalih
- težave z ravnotežjem
- hitro ali neredno bitje srca
- krvni strdek v nogi ali v pljučih
- zardevanje
- bolečine v ustih ali žrelu
- krvavitev iz danke
- nelagodje, občutljivost, šibkost ali bolečina mišic
- otekanje stopal ali nog
- mrzlica
- bolezni nohtov (spremenjena barva nohtov, nohti lahko odstopajo)

Občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 ljudi):

- nizek kalij v krvi
- zvonjenje v ušesih
- občutek vroče kože
- pordelost kože

- vnetje sečnega mehurja, ki se lahko pojavi, če je bil mehur kdaj izpostavljen obsevalnemu zdravljenju (cistitis zaradi pojava pomnjenja obsevanja).

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- intersticijska bolezen pljuč (vnetje pljuč, ki povzroča kašljanje in težave z dihanjem).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom ali z medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks: +386 (0)8 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Kabazitaksel EVER Pharma

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na zunanji ovojnini in na nalepki vial poleg oznake EXP. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Za to zdravilo niso potrebni posebni pogoji shranjevanja.

Ne zamrzujte.

Večodmerne viale: kemična, fizikalna in mikrobiološka stabilnost raztopine po prvem odpiranju je bila dokazana 28 dni pod 25 ° C. Zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma je primerno za uporabo v več odmerkih.

Informacije o shranjevanju in času za uporabo zdravila Kabazitaksel EVER Pharma, ko je že redčeno in pripravljeno za uporabo, so navedene v poglavju "PRAKTIČNE INFORMACIJE ZA ZDRAVSTVENO OSEBJE O PRIPRAVI, UPORABI IN RAVNANJU Z ZDRAVILOM KABAZITAKSEL EVER PHARMA".

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma

Učinkovina je kabazitaksel. En mililiter koncentrata raztopine za infundiranje vsebuje kabazitaksel monohidrat ali brezvodni ekvivalent 10 mg kabazitaksela.

Ena viala s 4,5 ml koncentrata raztopine za infundiranje vsebuje kabazitaksel monohidrat ali brezvodni ekvivalent 45 mg kabazitaksela.

Ena viala s 5 ml koncentrata raztopine za infundiranje vsebuje kabazitaksel monohidrat ali brezvodni ekvivalent 50 mg kabazitaksela.

Ena viala s 6 ml koncentrata raztopine za infundiranje vsebuje kabazitaksel monohidrat ali brezvodni ekvivalent 60 mg kabazitaksela.

Zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma vsebuje pribitek. Pribitek zagotavlja, da izvlečena raztopina 4,5 ml, 5ml ali 6ml vsebuje 10 mg/ml kabazitaksela.

Pomožne snovi so polisorbat 80; makrogol; citronska kislina; in brezvodni etanol (glejte poglavje 2 "Kabazitaksel EVER Pharma vsebuje alkohol").

Izgled zdravila Kabazitaksel EVER Pharma in vsebina pakiranja

Zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma je koncentrat za raztopino za infundiranje (sterilen koncentrat).

Koncentrat je bistra, nežno rumena oljnata raztopina.

Eno pakiranje zdravila Kabazitaksel EVER Pharma vsebuje:

bistro stekleno vialo, zaprto s sivim zamaškom iz brombutilne gume, pod katerim je viala zapečatena z aluminijsko zaporko, pokrito s plastičnim snemljivim pokrovčkom, ki vsebuje 4,5 ml (5 ml ali 6 ml) koncentrata.

Viale so lahko ali ne obložene z zaščitnim omotom.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Kabazitaksel EVER Pharma

H - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah.

Imetnik dovoljenja za promet:

EVER Valinject GmbH
Oberburgau 3
4866 Unterach am Attersee
Avstrija

Proizvajalec:

EVER Pharma Jena GmbH
Otto-Schott-Straße 15
07745 Jena
Nemčija

EVER Pharma Jena GmbH
Brüsseler Str. 18
07747 Jena
Nemčija

Zdravilo je v državah članicah EGP odobreno pod naslednjimi imeni:

	Ime
AT	Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
BE	Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml
DE	Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
DK	Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml
ES	Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml
FI	Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml
FR	Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml
HR	Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml
HU	Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml
IE	Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml concentrate for solution for infusion
IT	Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml
NL	Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml
NO	Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml
PL	Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml
PT	Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml
SI	Kabazitaksel EVER Pharma 10 mg/ml **koncentrat** za raztopino za infundiranje
SE	Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml
SK	Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml
UK	Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 01.07.2023.

Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju.

PRAKTIČNE INFORMACIJE ZA ZDRAVSTVENO OSEBJE O PRIPRAVI, UPORABI IN RAVNANJU Z ZDRAVILOM KABAZITAKSEL EVER PHARMA
Te informacije dopolnjujejo poglavji 3 in 5 navodila za uporabo.
Pomembno je, da pred pripravo raztopine za infundiranje preberete celotni opis tega postopka.

Inkompatibilnosti

Zdravila se ne sme mešati z drugimi zdravili razen s tistimi, ki se uporabljajo za redčenje.

Rok uporabnosti in posebna navodila za shranjevanje

Za to zdravilo niso potrebni posebni pogoji shranjevanja.
Ne zamrzujte.

Po odprtju

Viale z več odmerki: Kemična, fizikalna in mikrobiološka stabilnost raztopine po prvem odpiranju je bila dokazana 28 dni pod 25 ° C. Zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma je primerno za uporabo v več odmerkih.

Po končnem redčenju v vrečki/steklenički za infundiranje:

Kemična in fizikalna stabilnost infuzijske raztopine je bila dokazana 48 ur pod 25 ° C, vključno z enournim časom infuzije in 14 dni v hladilniku, vključno z enournim infuzijskim časom.

Z mikrobiološkega vidika je treba infuzijsko raztopino uporabiti takoj. Če se ne uporabi takoj, so časi in pogoji shranjevanja odgovornost uporabnika in običajno ne smejo biti daljši od 24 ur pod 25 ° C, razen, če je bilo redčenje opravljeno v nadzorovanih in preverjenih aseptičnih pogojih.

Previdnostni ukrepi za pripravo in uporabo

Zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma lahko pripravlja in daje le zdravstveno osebje, ki je naučeno ravnanja s citotoksičnimi zdravili. Nosečnice, ki so del tega zdravstvenega osebja, ne smejo ravnati z zdravilom. Tako kot velja za druga zdravila proti raku, je tudi pri pripravi raztopin zdravila Kabazitaksel EVER Pharma 1in ravnanju z njimi potrebna previdnost; uporabiti je treba naprave za prestrezanje, osebno zaščitno opremo (npr. rokavice) in upoštevati je treba postopke priprave. Če pride zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma v katerikoli fazi ravnanja z njim v stik s kožo, je treba kožo takoj in temeljito umiti z milom in vodo. Če pride v stik s sluznico, jo nemudoma in temeljito umijte z vodo.

Koraki za pripravo

Skrbno in **V CELOTI** preberite to poglavje. Zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma morate pred uporabo redčiti **ENKRAT**.

Naslednji postopek redčenja je treba izvesti na aseptičen način za pripravo raztopine za infundiranje.

Za dajanje predpisanega odmerka bo morda potrebna več kot ena viala koncentrata.

Redčenje za infundiranje

1 korak: Aseptično odvzemite potrebno količino koncentrata (10 mg/ml kabazitaksela) z graduirano injekcijsko brizgo z iglo. Primer: za odmerek 45 mg Kabazitaksel EVER Pharma potrebujete 4,5 ml koncentrata.

Zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma vsebuje pribitek. Ta prebitek zagotavlja, da je mogoče ekstrahirati količino 4,5 ml, 5 ml ali 6 ml, ki vsebuje 10 mg/ml kabazitaksela.

2. korak: injicirajte v sterilen vsebnik z bodisi 5% raztopino glukoze ali bodisi 9 mg/ml raztopine natrijevega klorida (0,9%) za infundiranje. Vsebnik ne sme biti iz PVC. Koncentracija infuzijske raztopine mora biti med 0,10 mg/ml in 0,26 mg/ml.

3. korak: Odstranite brizgo in ročno zmešajte vsebino infuzijske vrečke ali stekleničke.

4. korak: Tako kot pri vseh parenteralnih izdelkih je treba nastalo infuzijsko raztopino pred uporabo vizualno pregledati. Ker je infuzijska raztopina prenasičena, lahko sčasoma kristalizira. V tem primeru se raztopine ne sme uporabiti in jo je treba zavreči.

Infuzijsko raztopino je treba uporabiti takoj. Vendar pa je čas s shranjevanja lahko daljši v specifičnih pogojih, omenjenih v poglavju **Rok uporabnosti in posebna navodila za shranjevanje.**

Zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma se ne sme mešati z drugimi zdravili razen omenjenih.

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

Način uporabe

Zdravilo Kabazitaksel EVER Pharma se daje v obliki enourne infuzije.

Za pripravo in dajanje zdravila Kabazitaksel EVER Pharma ne uporabljate infuzijskih vsebnikov iz PVC ali kompletov za infundiranje iz poliuretana.