

# Aptamil Pregomin Allergy Digestive Care (Aptamil Pregomin ADC)

## Hipoalergena mlečna formula za dojenčke od rojstva naprej

### dietetično živilo za posebne zdravstvene namene

**dodan LCP (DHK-dokozaheksaenojska kislina, AK-arahidonska kislina)**

**dodani nukleotidi**

**brez glutena** 

**ne vsebuje saharoze, laktoze, fruktoze, galaktoze**

#### Pomembno obvestilo

##### • o uporabi

Aptamil Pregomin ADC uporabljajte le pod zdravniškim nadzorom. Aptamil Pregomin ADC je lahko edini vir prehrane dojenčkov od rojstva dalje.

##### • o prehrani vašega otroka

**Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka.** Če mati ne more dojiti ali ima premalo mleka, naj se o uporabi nadomestne hrane in načinu hranjenja posvetuje z zdravnikom pediatrom.

##### • za zdrave zobe vašega otroka

Steklenička za hranjenje naj ne bo vašemu otroku nadomestilo za dudo »tolajilko«. Aptamil Pregomin ADC namreč vsebuje ogljikove hidrate, kateri ob pogostem ali stalnem kontaktu z zobmi lahko povzročijo zobno gnilobo in druge s tem povezane težave. Hranjenje po steklenički naj zato poteka samo toliko časa, dokler otrok resnično pije.

**Sestavine:** glukozi sirup, koncentrat ekstenzivno hidroliziranih beljakovin sirotke (iz mleka), trigliceridi s srednjo verigo, rastlinska olja, emulgator: ester citronske kisline mono in digliceridov, trikalcijev fosfat, kalijev dihidrogen fosfat, kalijev klorid, natrijev klorid, magnezijev klorid, l-askorbinska kislina, natrijev L-askorbat, kalcijev karbonat, inozitol, DL-alfa tokoferil acetat, taurin, holin klorid, železov sulfat, cinkov sulfat, kalcijev D-pantotenat, D-biotin, folna kislina, ribje olje, bakrov sulfat, manganov sulfat, retinil palmitat, riboflavin, DL-alfa tokoferol, cianokobalamin, tiamin hidroklorid, holekalciferol, piridoksin hidroklorid, kalijev jodid, fitomenadion, nikotinamid, L-karnitin, nukleotidi (uridin-, citidin-, adenozin-, inozin-, gvanozin-5-monofosfat natrijeva sol), natrijev selenit.

Povprečna hranilna vrednost		na 100 g izdelka	na 100 ml obroka	Povprečna hranilna vrednost		na 100 g izdelka	na 100 ml obroka
<b>Energijska vrednost</b>	kJ	2155	275	Cink	mg	3,9	0,5
	kcal	515	66	Baker	µg	314	40
Beljakovine	g	14	1,8	Jod	µg	93	12
nukleotidi	mg	25	3,2	Selen	µg	9,8	1,3
Ogljikovi hidrati	g	53,4	6,8	Mangan	mg	0,33	0,04
sladkorji	g	8,3	1,1	Krom**	µg	11	1,4
maltoza	g	6,2	0,8	Molibden**	µg	18	2,3
polisaharidi	g	8,3	1,1	<b>Vitaminski</b>			
<b>Maščoba</b>		27,3	3,5	Vitamin A	µg	405	52
od te nasičene				Vitamin B1	mg	0,39	0,05
maščobne kisline	g	16,2	2,1	Vitamin B2	mg	0,77	0,1
MCT (trigliceridi)	g	13,7	1,8	Vitamin B6	mg	0,31	0,04
1 x nenasičene maščobne k.	g	6,4	0,8	Pantotenska kislina	mg	2,58	0,33
<b>VNMMK ***</b>				Folna kislina	µg	70	8,9
linolna kislina	g	3,7	0,48	Niacin	mg	3,4	0,43
α-linolenska k.	g	0,7	0,09	Vitamin B12	µg	1,4	0,18
<b>DHK* (LCP)</b>	g	0,1	0,007	Vitamin C	mg	65	8,3
<b>AK** (LCP)</b>	g	0,1	0,007	Vitamin D	µg	9,8	1,3
holesterol	mg	0	0	Vitamin E	mg	8,7	1,1
<b>Minerali</b>				Biotin	µg	13	1,7
Natrij	g	0,144	0,018	Vitamin K	µg	37	4,7
Kalij	mg	507	65	<b>Holin</b>	mg	77	9,9
Kalcij	mg	390	50	<b>Taurin</b>	mg	41	5,3
Magnezij	mg	43	6	<b>L-Karnitin</b>	mg	8,3	1,1
Fosfor	mg	216	28	<b>Inozitol</b>	mg	25	3,2
Klorid	mg	326	42				
Železo	mg	6,0	0,8				

Osmolarnost 190 mosmol/l

Analitske vrednosti so odvisne od bioloških nihanj, običajnih pri naravnih surovinah  
\*Standardna raztopina: 12,9 g Aptamil Pregomina ADC + 90 ml vode = 100 ml pripravljene obroka.

\*\*Naravno prisoten, \*\*\* Večkrat nenasičene maščobne kisline

**\*DHK-dokozaheksaenojska kislina, \*\*AK-arahidonska kislina**

**Doziranje:** Količino in število obrokov prilagodite potrebam vašega otroka. V dozirni tabeli so prikazane ustrezne količine za pripravo hrane glede na starost vašega otroka.

#### Dozirna tabela:

starost otroka	Teža	Število obrokov / dan	za en obrok potrebujete		
			ml	količina vode ml	število meric
0-14 dni	2,5-3	7	70	60	2
2-8 tednov	3-3,5	6	100	90	3
2 meseca	3,5-4	5	130	120	4
3 mesece	4-5	5	160	150	5
4 mesece	5-6	5	200	180	6
5 mesecev	6-7	5	230	210	7
po 6. mesecu	>7	4	230	210	7

Do vrha napolnjena in z nožem do roba poravnana priložena merica vsebuje približno 4,3 g Aptamila Pregomina ADC.

#### Priprava:

Natančno upoštevajte navodila za pripravo obroka. Nepravilna priprava obroka predstavlja tveganje za zdravje vašega otroka. Pripravite vedno le svež obrok in ga takoj uporabite (v eni uri). Ostankov hrane ne uporabljajte ponovno. Temeljito operite in prekuhajte stekleničko, dudo in obroček za dudo. Ne pogrevajte obroka v mikrovalovni pečici zaradi možnosti pregretja.

- Zavrite pitno vodo in jo ohladite na približno 40 - 50 °C.
- V stekleničko vlijte 1/3 potrebne količine prekuhane vode.
- Merico napolnite z izdelkom in jo poravnajte z nožem do roba. V stekleničko z vodo dodajte ustrezno število meric izdelka.
- Stekleničko zaprite z zamaskom in jo stresajte. Dolijte preostalo količino prekuhane vode in ponovno dobro premešajte.
- Temperaturo obroka preverite na svojem zapestju. Idealna temperatura obroka je, ko ne čutite ne toplo ne hladno (cca 37 °C).

**Aptamil Pregomin Allergy Digestive care je hipoalergena,** semielementarna hrana za dietetsko uravnavanje: preobčutljivosti/alergije na hrano, težkih akutnih in kroničnih diarej, maldigestije, malabsorpcije in malnutricije, sindroma kratkega črevesja, kroničnega vnetja črevesja, motenj pri presnovi ogljikovih hidratov (intoleranca na laktozo).

#### Priporočamo vam

- Pripravite vedno le svež obrok in ostankov hrane ne uporabljajte ponovno. Pripravljen obrok je potrebno porabiti v eni uri. Odprto vrečko ponovno zaprite.
- Vsebinsko odprte vrečke porabite v 3 tednih.

#### Lastnosti izdelka

Aptamil Pregomin ADC je hipoalergena hrana. Indikacije: zapisane na pločevinki. Zaradi beljakovin sirotke, ki so ekstenzivno hidrolizirane, se zmanjša tveganje za nastanek alergij. Uporabljen je poseben vir maščob, ki pomaga pri lažji absorpciji, kadar je črevo poškodovano. **Aptamil Pregomin ADC vsebuje LCP, mešanico posebnih dolgoveržnih nenasičenih maščobnih kislin DHK in AK.** Z Aptamilom Pregominom ADC bo dobil vaš otrok vse, kar potrebuje za dobro napredovanje.

#### Uporaba

Aptamil Pregomin ADC lahko uporabljate kot edini vir prehrane dojenčkov. O uporabi Aptamila Pregomina ADC se posvetujte z zdravnikom pediatrom. Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do: datum je odtisnjen na dnu pločevinke. Izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru (ne v hladilniku).

Kontrolna številka: odtisnjena je na embalaži

Pakirano v kontrolirani atmosferi.

**Informacije za potrošnika na brezplačni telefonski liniji:**

**080 15 36 ali www.milupa.si**

Izdeluje: Nutricia Cuijk B.V., Grotestraat 91, 5431 DJ Cuijk, Nizozemska  
Zastopa in prodaja: Merit International d.o.o., Letališka ulica 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija.

**Neto 400 g**