

# POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

## 1. IME ZDRAVILA

Aspirin protect 100 mg gastrozistentne tablete

## 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena gastrozistentna tableta vsebuje 100 mg acetilsalicilne kisline.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

## 3. FARMACEVTSKA OBLIKA

gastrozistentna tableta  
bele, okrogle tablete

## 4. KLINIČNI PODATKI

### 4.1 Terapevtske indikacije

Acetilsalicilna kislina je indicirana pri odraslih za uporabo pri naslednjih srčno-žilnih boleznih

- za zmanjšanje tveganja umrljivosti pri bolnikih s sumom na akutni srčni infarkt
- za zmanjšanje tveganja obolevnosti in umrljivosti pri bolnikih, ki so že preboleli srčni infarkt
- za sekundarno preprečevanje možganske kapi
- za zmanjšanje nevarnosti tranzitornih ishemičnih atak (TIA) in možganske kapi pri bolnikih s TIA
- za zmanjšanje tveganja obolevnosti in smrti pri bolnikih s stabilno in nestabilno angino pektoris
- za preprečevanje trombembolije po kirurških ali revaskularizacijskih posegih v/na arterijah (npr. PTCA, CABG, karotidna endarterektomija, arteriovenske premostitve)
- za zmanjšanje tveganja za pojav prvega srčnega infarkta pri ljudeh s srčno-žilnimi dejavniki tveganja (sladkorna bolezen, hiperlipidemija, hipertenzija, debelost, kajenje, starost)

### 4.2 Odmerjanje in način uporabe

#### Odmerjanje

- akutni srčni infarkt

Ob sumu na srčni infarkt je treba dati čimprej začetni odmerek acetilsalicilne kisline (najmanj 200 mg do 300 mg). 30 dni po infarktu je treba jemati vzdrževalni odmerek 200 mg do 300 mg vsak dan. Po 30 dneh je treba pretehtati nadaljno zdravljenje za preprečevanje ponovitve srčnega infarkta. Če se pri tej indikaciji uporabljajo gastrozistentne tablete, je treba prvo tableto zdrobiti ali prežvečiti in nato pogoltniti, da se le-ta hitro absorbira.

- za zmanjšanje tveganja obolevnosti in umrljivosti pri bolnikih, ki so že doživeli srčni infarkt 100 do 300 mg na dan
- za sekundarno preprečevanje možganske kapi 100 do 300 mg na dan
- za zmanjšanje nevarnosti tranzitornih ishemičnih atak (TIA) in možganske kapi pri bolnikih s TIA

100 do 300 mg na dan

- za zmanjšanje tveganja obolevnosti in smrti pri bolnikih s stabilno in nestabilno angino pectoris 100 do 300 mg na dan
- za preprečevanje tromboembolije po kirurških ali revaskularizacijskih posegih v/na arterijah (npr. PTCA, CABG, karotidna endarterektomija, arteriovenske premostitve) 100 do 300 mg na dan
- za zmanjšanje nevarnosti prvega srčnega infarkta pri ljudeh s srčnožilnimi dejavniki tveganja 100 mg na dan ali 300 mg vsak drugi dan

#### *Pediatrična populacija*

Učinkovitost zdravila Aspirin protect pri otrocih, mlajših od 18 let, ni bila dokazana. Podatkov ni na voljo. Zdravilo Aspirin protect se ne priporoča za uporabo pri pediatričnih bolnikih, mlajših od 18 let.

#### *Starejši bolniki*

Prilagajanje odmerka pri akutnem in kroničnem zdravljenju ni potrebno.

#### *Bolniki z okvaro jeter*

Zdravilo Aspirin protect je kontraindicirano pri bolnikih s hudo okvaro jeter (glejte poglavje 4.3). Zdravilo Aspirin protect je treba uporabljati posebej previdno pri bolnikih z blago ali zmerno okvaro jeter (glejte poglavje 4.4).

#### *Bolniki z okvaro ledvic*

Zdravilo Aspirin protect je kontraindicirano pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (glejte poglavje 4.3). Zdravilo Aspirin protect je treba uporabljati previdno pri bolnikih z blago ali zmerno okvaro ledvic, ker acetilsalicilna kislina lahko dodatno poveča tveganje za okvaro ledvic in akutno odpoved ledvic (glejte poglavje 4.4).

#### Način uporabe

peroralna uporaba

Gastrorezistentne tablete je najbolje vzeti najmanj 30 minut pred jedjo z veliko vode.

Gastrorezistentne tablete se ne sme zdrobiti, zlomiti ali žvečiti, da se zagotovi sproščanje v bazičnem okolju črevesja (glejte poglavje 5.2).

Akutni srčni infarkt: prvo tableto je treba zdrobiti ali prežvečiti in nato pogoltniti.

### **4.3 Kontraindikacije**

Acetilsalicilne kisline se ne sme uporabljati

- pri znani preobčutljivosti na acetilsalicilno kislino in druge salicilate ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1
- pri bolnikih, ki imajo v anamnezi astmatične napade po jemanju salicilatov oz. snovi s podobnim delovanjem (nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID))
- pri akutni razjedi v prebavilih
- pri povečani nagnjenosti h krvavitvam (hemoragična diateza)
- pri hudi okvari ledvic
- pri hudi okvari jeter
- pri hudem srčnem popuščanju
- pri bolnikih, ki jemljejo metotreksat v odmerkih 15 mg/teden ali več (glejte poglavje 4.5)
- zadnje tri mesece nosečnosti (glejte poglavje 4.6)

### **4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi**

Acetilsalicilno kislino je treba posebej previdno uporabljati v naslednjih primerih

- preobčutljivost na druga protibolečinska zdravila, protivnetna in protirevmatična zdravila ali druge alergene snovi
- pri bolnikih z razjedami prebavil v anamnezi (kronična ali ponavljajoča se razjeda ali krvavitve iz prebavil v preteklosti)
- ob hkratnem zdravljenju z antikoagulanti (glejte poglavje 4.5)
- pri bolnikih z okvaro ledvic ali bolnikih z motnjami v srčno-žilnem obtoku (npr. bolezni ledvičnih žil, kongestivna okvara srca, zmanjšan intravaskularni volumen, večji kirurški posegi, sepsa ali večje krvavitve), ker acetilsalicilna kislina lahko dodatno poveča tveganje za okvaro ledvic ali akutno odpoved ledvic
- Pri bolnikih, ki imajo hudo pomanjkanje glukoze-6-fosfat dehidrogenaze, lahko acetilsalicilna kislina povzroči hemolizo ali hemolitično anemijo. Dejavniki, ki lahko povečajo tveganje za hemolizo so npr. visoki odmerki, zvišana telesna temperatura ali akutne okužbe.
- pri okvarah jeter
- Nekatera nesteroidna protivnetna zdravila, kot sta ibuprofen in naproksen, lahko zmanjšajo inhibitorni učinek acetilsalicilne kisline na agregacijo trombocitov. Bolnike, ki redno uporabljajo acetilsalicilno kislino, je treba opozoriti, da naj se posvetujejo z zdravnikom, če nameravajo jemati nesteroidna protivnetna zdravila (glejte poglavje 4.5).
- Acetilsalicilna kislina lahko povzroči bronhospazem in sproži astmatičen napad ali druge preobčutljivostne reakcije. Tveganje je večje pri bolnikih z bronhialno astmo, senenim nahodom, nosnimi polipi ali kronično pljučno boleznijo. Enako velja za bolnike, ki so preobčutljivi na druge snovi (npr. kožne reakcije, srbečica, koprivnica).
- Acetilsalicilna kislina lahko zaradi zaviralnega učinka na agregacijo trombocitov, ki traja še več dni po uporabi, poveča nagnjenost h krvavitvam med kirurškim posegom in po njem (tudi pri manjših kirurških posegih, npr. izdrtju zoba). Bolniki se morajo o uporabi acetilsalicilne kisline posvetovati z zdravnikom.
- Majhni odmerki acetilsalicilne kisline zmanjšajo izločanje sečne kisline. To lahko pri bolnikih z zmanjšanim izločanjem sečne kisline povzroči protin.

#### Pediatrična populacija

Zdravil, ki vsebujejo acetilsalicilno kislino, se ne sme uporabljati pri otrocih in mladostnikih za virusne okužbe (z ali brez zvišane telesne temperature), ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom. Pri določenih virusnih boleznih, zlasti influenci A, influenci B in noricah, obstaja tveganje za pojav Reyevega sindroma – zelo redke, a potencialno smrtno nevarne bolezni, ki zahteva takojšnjo medicinsko pomoč. Tveganje se lahko poveča, če se sočasno uporablja acetilsalicilno kislino, vendar vzročna povezanost ni dokazana. Če se pri takšnih boleznih pojavi trdovratno bruhanje, je to lahko znak Reyevega sindroma.

#### Zdravilo Aspirin protect vsebuje natrij

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na tableto, kar v bistvu pomeni 'brez natrija'.

### **4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij**

#### *Kontraindicirano sočasno zdravljenje*

##### Metotreksat v odmerkih 15 mg/teden ali več

Hematološka toksičnost metotreksata se ob sočasnem jemanju acetilsalicilne kisline poveča (protivnetna zdravila zmanjšajo ledvični očistek metotreksata, salicilati izpodrivajo metotreksat iz vezavnih mest na plazemskih beljakovinah) (glejte poglavje 4.3).

*Sočasna zdravljenja, pri katerih je potrebna posebna previdnost*

##### Metotreksat v odmerkih manjših kot 15 mg/teden

Hematološka toksičnost metotreksata se ob sočasnem jemanju acetilsalicilne kisline poveča (protivnetna zdravila zmanjšajo ledvični očistek metotreksata, salicilati izpodrivajo metotreksat iz vezavnih mest na plazemskih beljakovinah).

#### Nesteroidna protivnetna zdravila

Sočasna uporaba (na isti dan) nekaterih nesteroidnih protivnetnih zdravil, kot sta ibuprofen in naproksen, lahko zmanjša ireverzibilni zaviralni učinek acetilsalicilne kisline na agregacijo trombocitov. Klinična pomembnost teh interakcij ni znana. Pri bolnikih z večjim srčno-žilnim tveganjem lahko zdravljenje z nekaterimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, kot sta ibuprofen ali naproksen, zmanjša učinek acetilsalicilne kisline pri preprečevanju srčno-žilnih bolezni (glejte poglavje 4.4).

#### Metamizol

Ob sočasnem jemanju lahko metamizol zmanjša učinek acetilsalicilne kisline na agregacijo trombocitov. Zato je treba to kombinacijo uporabljati previdno pri bolnikih, ki jemljejo acetilsalicilno kislino v majhnih odmerkih za preprečevanje bolezni srca.

#### Antikoagulanti, trombolitiki, drugi zaviralci agregacije trombocitov, zdravila, ki vplivajo na hemostazo

Poveča se nevarnost krvavitve.

#### Nesteroidna protivnetna zdravila hkrati s salicilati

Zaradi sinergističnega učinka se poveča tveganje za pojav razjed in krvavitev iz prebavil.

#### Selektivni zaviralci privzema serotonina

Zaradi sinergističnega učinka se poveča tveganje za pojav krvavitev iz prebavil.

#### Digoksin

Zaradi zmanjšane izločanja skozi ledvice se poveča plazemska koncentracija digoksina.

#### Zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni, npr. inzulin, sulfonilsečnine v kombinaciji z acetilsalicilno kislino v velikih odmerkih

Veliki odmerki acetilsalicilne kisline povečajo hipoglikemični učinek antidiabetikov zaradi njenega hipoglikemičnega delovanja in izpodrivanja sulfonilsečnin iz vezavnih mest na plazemskih beljakovinah.

#### Diuretiki hkrati z acetilsalicilno kislino v velikih odmerkih

Zaradi zmanjšanja sinteze prostaglandinov v ledvicah se zmanjša glomerulna filtracija.

#### Sistemske glukokortikoidi, razen hidrokortizona, ki se uporablja kot nadomestno zdravljenje pri Addisonovi bolezni

Kortikosteroidi povečajo izločanje salicilatov, zato se raven salicilatov v krvi med zdravljenjem s kortikosteroidi zniža; po prenehanju zdravljenja s kortikosteroidi obstaja nevarnost predoziranja salicilatov.

Sočasna uporaba lahko poveča pojavnost gastrointestinalnih krvavitev in razjed v prebavilih.

#### Zaviralci angiotenzinske konvertaze (ACE) hkrati z acetilsalicilno kislino v velikih odmerkih

Zmanjšanje glomerulne filtracije zaradi zavrtja vazodilatacijskih prostaglandinov, poleg tega tudi zmanjšan antihipertenzivni učinek.

#### Valprojska kislina

Zaradi izpodrivanja iz vezavnih mest na plazemskih beljakovinah se poveča toksičnost valprojske kisline.

#### Alkohol

Acetilsalicilna kislina in alkohol delujeta aditivno, kar poveča negativen vpliv na sluznico prebavil in podaljša čas krvavitve.

Zdravila za izločanje sečne kisline, npr. benzbromaron, probenecid  
Zmanjša se izločanje sečne kisline (kompetitivno delovanje v ledvičnih tubulih).

#### **4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje**

##### Nosečnost

Zaviranje sinteze prostaglandinov lahko škodljivo vpliva na nosečnost in/ali embrio/fetalni razvoj. Glede na podatke iz epidemioloških študij se uporaba zaviralcev sinteze prostaglandinov v zgodnji nosečnosti povezuje s povečanim tveganjem za splav, pojav malformacij srca in gastroshiz. Absolutno tveganje za srčno-žilne malformacije se poveča z manj kot 1 % na približno 1,5 %. Tveganje se poveča s povečevanjem odmerka in trajanjem zdravljenja. V študijah na živalih je uporaba zaviralcev sinteze prostaglandinov pokazala povečano pred- in poimplantacijsko izgubo in embriofatalno smrtnost. Pri živalih, ki so jim dajali zaviralce sinteze prostaglandinov v obdobju organogeneze, so poročali o povečani incidenci različnih malformacij, tudi srčno-žilnih.

Od 20. tedna nosečnosti dalje lahko uporaba zdravila Aspirin protect povzroči oligohidramniji zaradi motenj delovanja ledvic pri plodu. To se lahko pojavi kmalu po začetku zdravljenja in je običajno reverzibilno po ukinitvi zdravljenja. Poleg tega so po zdravljenju v drugem tromesečju nosečnosti poročali o konstrikciji arterioznega duktusa, ki je v večini primerov izzvenela po ukinitvi zdravljenja. V prvem in drugem tromesečju nosečnosti se zato zdravila Aspirin protect ne sme dajati, razen če je to nujno potrebno. Če ženska, ki poskuša zanositi, ali ženska v prvem in drugem tromesečju nosečnosti, jemlje zdravilo Aspirin protect, mora odmerek biti čim manjši, trajanje zdravljenja pa čim krajše. Po večdnevni izpostavljenosti zdravilu Aspirin protect od 20. tedna nosečnosti dalje je treba razmisliti o prenatalnem spremljanju glede oligohidramnija in konstrikcije arterioznega duktusa. Če se pojavi oligohidramniji ali konstrikcija arterioznega duktusa, je treba zdravljenje z zdravilom Aspirin protect ukiniti.

V tretjem tromesečju lahko vsi zaviralci sinteze prostaglandinov pri plodu povzročijo:

- kardiopulmonalno toksičnost (prezgodnja konstrikcija/zaprta arterioznega duktusa in pljučna hipertenzija),
- motnjo delovanja ledvic (glejte zgoraj), ki se lahko razvije do ledvične odpovedi z oligohidramnijem,

pri materi in novorojenčku ob koncu nosečnosti pa:

- morebitno podaljšanje časa krvavitve, tj. antiagregacijski učinek, ki se lahko pojavi tudi pri zelo majhnih odmerkih,
- zavrtje krčenja maternice s posledičnim zapoznelim ali podaljšanim porodom.

Zato je zdravilo Aspirin protect v tretjem tromesečju nosečnosti kontraindicirano (glejte poglavji 4.3 in 5.3).

##### Dojenje

Majhne količine salicilatov in njihovih presnovkov prehajajo v materino mleko.

Ker do sedaj pri novorojenčkih, katerih matere so občasno jemale acetilsalicilno kislino, ni bilo opaziti neželenih učinkov, dojenja običajno ni treba prekiniti. Če matere jemljejo acetilsalicilno kislino redno ali v velikih odmerkih, je treba z dojenjem dovolj zgodaj prenehati.

##### Plodnost

Obstajajo dokazi, da lahko zdravila, ki zavirajo sintezo ciklooksigenaze/prostaglandinov, poslabšajo plodnost ženske z neposrednim vplivom na ovulacijo. Učinek izgine po prenehanju zdravljenja.

#### **4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev**

Zdravilo Aspirin protect nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

#### 4.8 Neželeni učinki

##### Povzetek podatkov o varnosti zdravila

Spodaj navedeni neželeni učinki temeljijo na spontanih poročilih iz obdobja trženja z vsemi oblikami zdravil Aspirin, tudi peroralnimi oblikami za kratkotrajno in dolgotrajno zdravljenje in kliničnih preskušanj z acetilsalicilno kislino kot preskušanim zdravilom. Pogostnost temelji samo na podatkih od skupine bolnikov, ki je prejela acetilsalicilno kislino v študiji ARRIVE.

##### Seznam neželenih učinkov

Pogostnosti neželenih učinkov, o katerih so poročali pri zdravljenju z acetilsalicilno kislino, so povzete v spodnji preglednici.

Po pogostnosti so neželeni učinki opredeljeni kot sledi:

pogosti ( $\geq 1/100$  do  $< 1/10$ )

občasni ( $\geq 1/1000$  do  $< 1/100$ )

redki ( $\geq 1/10\ 000$  do  $< 1/1000$ )

Neželeni učinki, ki so jih opazili le v obdobju spremljanja po začetku trženja zdravila in neželeni učinki, za katere pogostnosti ni bilo mogoče oceniti, so razvrščeni v skupino »neznana pogostnost«.

##### **Neželeni učinki, o katerih so poročali v študiji ARRIVE\* in v obdobju trženja zdravila pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom Aspirin protect.**

<b>Organski sistem (MedDRA SOC)</b>	<b>Pogosti</b>	<b>Občasni</b>	<b>Redki</b>	<b>Neznana pogostnost</b>
<b>Bolezni krvi in limfatičnega sistema</b>		slabokrvnost zaradi pomanjkanja železa <sup>a</sup>	posthemoragična anemija	hemoliza <sup>b</sup> hemolitična anemija <sup>b</sup>
<b>Bolezni imunskega sistema</b>		preobčutljivost preobčutljivost na zdravila alergijski edem in angioedem	anafilaktične reakcije	anafilaktični šok
<b>Bolezni živčevja</b>	omotica	cerebralne in intrakranialne krvavitve <sup>c</sup>		
<b>Ušesne bolezni, vključno z motnjami labirinta</b>	tinitus			
<b>Srčne bolezni</b>				sindrom dihalne stiske <sup>d</sup>
<b>Žilne bolezni</b>		hematomi	krvavitve krvavitve v mišice	krvavitve pri kirurških posegih
<b>Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora</b>	krvavitev iz nosu rinitis	kongestija nosne sluznice		bolezen dihal, ki se poslabša z jemanjem acetilsalicilne kisline

<b>Organski sistem (MedDRA SOC)</b>	<b>Pogosti</b>	<b>Občasni</b>	<b>Redki</b>	<b>Neznana pogostnost</b>
<b>Bolezni prebavil</b>	dispepsija bolečine v prebavilih in trebuhu vnetje prebavil krvavitve v prebavilih <sup>c</sup>	krvavitve iz dlesni erozije in razjede v prebavilih	perforacija razjed v prebavilih	zožitev posameznih delov črevesa (črevesna diafragmalna bolezen)
<b>Bolezni jeter, žolčnika in žolčevodov</b>		okvara jeter	povečane vrednosti transaminaz	
<b>Bolezni kože in podkožja</b>	izpuščaj srbenje	koprivnica		
<b>Bolezni sečil</b>	krvavitev v sečilih		okvare ledvic <sup>e</sup> akutna odpoved ledvic <sup>e</sup>	
<b>Poškodbe in zastrupitve in zapleti pri posegih</b>	glejte poglavje 4.9 Prekomerno odmerjanje			

\*Klinično preskušanje ARRIVE je sponzoriralo podjetje Bayer. V skupino bolnikov, zdravljenimi s 100 mg acetilsalicilne kisline, je bilo vključenih 6270 bolnikov, v skupino, ki je prejela placebo, pa 6276 bolnikov. Mediana trajanja izpostavljenosti acetilsalicilni kislini je bila 5,0 let, v razponu od 0 do 7 let.

<sup>a</sup> zaradi krvavitev

<sup>b</sup> pri bolnikih s hudim pomanjkanjem glukoze-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD)

<sup>c</sup> LT/smrtni primeri so poročali z enako pogostostjo pri bolnikih, ki so prejeli acetilsalicilno kislino ali placebo, <0,1%

<sup>d</sup> pri hudih alergijskih reakcijah

<sup>e</sup> pri bolnikih s predhodnimi okvarami ledvic ali motnjami v srčno-žilnem krvnem obtoku

#### Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: [www.jazmp.si](http://www.jazmp.si)

#### **4.9 Preveliko odmerjanje**

Zastrupitev s salicilati (> 100 mg/kg/dan več kot dva dni lahko povzroči zastrupitev) je lahko posledica kronične terapevtske uporabe, zastrupitve ali življenjsko ogrožujoče akutne zastrupitve (prekomernega odmerjanja) zaradi nenamerne zaužitja prevelikega odmerka npr. pri otrocih ali namerne zastrupitve.

Kronična zastrupitev s salicilati je lahko težko prepoznavna, ker so znaki ali simptomi neznačilni. Blaga kronična zastrupitev s salicilati ali salicilizem se običajno pojavi po ponavljajoči se uporabi velikih odmerkov. Kot simptomi se pojavijo omotica, vrtoglavica, zvonjenje v ušesih, gluhost, znojenje, navzea, bruhanje, glavobol, zmedenost, ki so lahko manj izraziti pri uporabi manjših odmerkov. Zvonjenje v ušesih se pojavi pri plazemskih koncentracijah od 150 do

300 mikrogramov/ml. Hudi neželeni učinki se pojavijo pri plazemskih koncentracijah večjih od 300 mikrogramov/ml.

Značilnost akutne zastrupitve je huda motnja v kislinsko-baznem ravnovesju in je odvisna od starosti in stopnje zastrupitve. Pri otrocih se najpogosteje kaže kot metabolna acidoza. Stopnje zastrupitve se ne da predvideti samo iz plazemske koncentracije. Absorpcija acetilsalicilne kisline je lahko zakasnela zaradi počasnejšega praznjenja želodca, čvrstih tvorbo v želodcu (netopnih skupkov zdravil) ali kot posledica zaužitja gastrozistentnih pripravkov. Ukrepi pri zastrupitvi z acetilsalicilno kislino so odvisni od obsega, stopnje in kliničnih simptomov in morajo biti v skladu s standardnimi ukrepi pri zastrupitvah. Običajno se priporoča pospešitev izločanja zdravila kot tudi vzpostavitev elektrolitskega in kislinsko-baznega ravnovesja.

Zaradi zapletenih patofizioloških učinkov pri zastrupitvi s salicilati, so lahko prisotni naslednji znaki in simptomi:

<i>Znaki in simptomi</i>	<i>Izvidi preiskav</i>	<i>Ukrepi</i>
<b>BLAGA DO ZMerna ZASTRUPITEV</b>		izpiranje želodca, uporaba medicinskega oglja, izzvana alkalna diureza
tahipneja, hiperventilacija, respiratorna alkalozna	alkalemija, alkalurija	nadomeščanje izgubljene tekočine in elektrolitov
čezmerno znojenje		
slabost, bruhanje		
<b>ZMerna DO HUDA ZASTRUPITEV</b>		izpiranje želodca, uporaba medicinskega oglja, izzvana alkalna diureza, hemodializa v hudih primerih
respiratorna alkalozna s kompenzatorno presnovno acidozo	acidemija, acidurija	nadomeščanje izgubljene tekočine in elektrolitov
zvišana telesna temperatura		nadomeščanje izgubljene tekočine in elektrolitov
motnje dihanja (hiperventilacija, nekardiogeni pljučni edem, zastoj dihanja, dušenje)		
kardiovaskularne motnje (aritmije, hipotenzija, srčni zastoj)	tj. krvni tlak, spremembe na EKG	
izguba tekočine in elektrolitov (dehidracija, oligurija, okvara ledvic)	tj. hipokaliemija, hipernatriemija, hiponatriemija, motnje v delovanju ledvic	nadomeščanje izgubljene tekočine in elektrolitov
motnje v presnovi glukoze, ketoza	hiperglikemija hipoglikemija (predvsem pri otrocih) povečane vrednosti ketonov	
zvonjenje v ušesih, motnje sluha		
krvavitve v prebavilih		
hematološke motnje: zaviranje trombocitov do koagulopatij		
nevrološke motnje: toksična		



encefalopatija in depresija osrednjega živčnega sistema, ki lahko privede do zaspanosti, zmedenosti, kome in krčev		
--	--	--

## 5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

### 5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: zaviralci agregacije trombocitov brez heparina; oznaka ATC: B01AC06

#### Mehanizem delovanja

Acetilsalicilna kislina zavira agregacijo trombocitov. Zavira nastajanje tromboksana A<sub>2</sub> v trombocitih. Njeno delovanje je posledica ireverzibilnega zaviranja ciklooksigenaze (COX-1).

#### Farmakodinamični učinki

Ireverzibilno zaviranje ciklooksigenaze je še posebej izrazito pri trombocitih, ker trombociti ne morejo ponovno sintetizirati tega encima. Domnevajo, da acetilsalicilna kislina tudi drugače zaviralno učinkuje na trombocite. Acetilsalicilna kislina spada v skupino kislih nesteroidnih protivnetnih zdravil z analgetičnimi, antipiretičnimi in protivnetnimi lastnostmi.

#### Klinična učinkovitost

Zaradi zaviralnega učinka na agregacijo trombocitov, se uporablja za zdravljenje različnih žilnih bolezni. Veliki peroralni odmerki se uporabljajo za lajšanje bolečin in zniževanje zvišane telesne temperature, npr. pri prehladu ali gripi, za zniževanje zvišane telesne temperature in za lajšanje bolečin v sklepih in mišicah ter pri akutnih in kroničnih vnetnih boleznih, kot so revmatoidni artritis, osteoartritoza in ankilozirajoči spondilitis.

Eksperimentalni podatki kažejo, da sočasna uporaba ibuprofena in acetilsalicilne kisline lahko zavre učinek nizkih odmerkov acetilsalicilne kisline na agregacijo trombocitov. V eni študiji, v kateri so aplicirali 400 mg ibuprofena v enkratnem odmerku 8 ur pred ali 30 minut po aplikaciji acetilsalicilne kisline (v odmerku 81 mg) v farmacevtski obliki s takojšnjim sproščanjem, so zabeležili zmanjšan učinek acetilsalicilne kisline na tvorbo tromboksana ali agregacijo trombocitov. Na voljo je malo podatkov in zaradi nezanesljivosti pri ekstrapolaciji *ex vivo* podatkov na klinične primere, trdni zaključki glede redne uporabe ibuprofena niso možni. Pri občasni uporabi ibuprofena se klinično pomembni učinki ne smatrajo kot verjetni.

### 5.2 Farmakokinetične lastnosti

#### Absorpcija

Acetilsalicilna kislina se po peroralnem zaužitju iz prebavil absorbira hitro in popolnoma. Acetilsalicilna kislina se med absorpcijo in po njej pretvori v svoj glavni presnovek – salicilno kislino. Iz gastrorezistentne tablete zdravila Aspirin protect se acetilsalicilna kislina ne sprosti v želodcu, ampak v bazičnem okolju črevesja. Zato je C<sub>max</sub> acetilsalicilne kisline dosežena 2 – 7 ur po zaužitju gastrorezistentnih tablet tj. zakasnjena v primerjavi s tabletami s takojšnjim sproščanjem.

Sočasno zaužitje hrane privede do zakasnitve, vendar je absorpcija acetilsalicilne kisline popolna, kar pomeni, da hrana vpliva na hitrost absorpcije, ne pa na njen obseg. Zaradi povezave med celokupno izpostavljenostjo acetilsalicilne kisline v plazmi in njenim inhibitornim učinkom na agregacijo trombocitov, zakasnitev absorpcije zdravila Aspirin protect gastrorezistentne tablete ni pomembna pri kroničnem zdravljenju z nizkimi odmerki zdravila Aspirin za zagotovitev ustrezne inhibicije agregacije trombocitov. Ne glede na to, je za zagotovitev ustreznega učinka gastrorezistentne tablete, zdravilo Aspirin protect najbolje vzeti (30 minut ali več) pred obrokom hrane, z veliko vode (glejte poglavje 4.2).

#### Porazdelitev

Acetilsalicilna kislina in salicilna kislina se vežeta na plazemske beljakovine in se hitro porazdelita po celem telesu. Salicilna kislina prehaja skozi placento in se izloča v materino mleko (glejte poglavje 4.6).

#### Biotransformacija

Acetilsalicilna kislina se pretvori v glavni presnovek salicilno kislino. Acetilna skupina acetilsalicilne kisline se začne hidrolitično cepiti že med prehodom skozi črevesno sluznico, vendar ta proces poteka pretežno v jetrih. Glavni presnovek, salicilna kislina, se odstrani s presnovo v jetrih. Glavni presnovki so salicilurična kislina, salicilfenolniglukuronid, salicilacilglukuronid, gentizinska kislina in gentizurična kislina.

#### Izločanje

Izločanje salicilne kisline je odvisno od odmerka, kajti zmogljivost jetrnih encimov omejuje presnovo. Razpolovna doba izločanja traja po zaužitju majhnih odmerkov dve do tri ure, po zaužitju velikih pa okoli 15 ur. Salicilna kislina in njeni presnovki se izločajo v glavnem skozi ledvice. Farmakokinetični podatki o acetilsalicilni kislini, ki so na voljo, ne kažejo klinično pomembnih razlik med odmerki, če so le ti v razponu od 100 mg do 500 mg.

### **5.3 Predklinični podatki o varnosti**

V študijah na živalih so salicilati v velikih odmerkih povzročili okvare ledvic, ne pa kakšnih drugih organskih sprememb.

Acetilsalicilno kislino so glede mutagenosti obširno preučevali *in vitro* in *in vivo*; relevantnih dokazov o mutagenem potencialu niso našli. Enako velja za študije kancerogenosti. Salicilati so v študijah na živalih učinkovali teratogeno pri številnih različnih vrstah živali. Po prenatalni izpostavljenosti so opisane motnje implantacije, embriotoksični in fetotoksični učinki ter okrnjena sposobnost učenja pri potomcih.

## **6. FARMACEVTSKI PODATKI**

### **6.1 Seznam pomožnih snovi**

#### Jedro tablete

uprašena celuloza  
koruzni škrob

#### Gastrorezistentna obloga

metakrilna kislina in etilakrilat, kopolimer 1:1, 30 odstotna disperzija  
polisorbat 80 (E433)  
natrijev lavrilsulfat  
smukec (E553b)  
trietilcitrat (E1505)

### **6.2 Inkompatibilnosti**

Navedba smiselno ni potrebna.

### **6.3 Rok uporabnosti**

5 let

### **6.4 Posebna navodila za shranjevanje**

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

## **6.5 Vrsta ovojnine in vsebina**

škafka s 30 gastrozefzsfentnfm tablefama (3 x 10 tablef v pretfsm omotu fz PP/Al)  
škafka s 100 gastrozefzsfentnfm tablefama (10 x 10 tablef v pretfsm omotu fz PP/Al)

## **6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravfdom**

Nf posebmf zahtev.

## **7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM**

Bayer d. o. o.  
Bravnfčarjeva 13  
1000 Ljubljana  
Slovenfja

## **8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z ZDRAVILOM**

H/92/00220/005-006

## **9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM**

Datum prve odobrfve: 19. 6. 1992  
Datum zadnjega podaljšanja: 19. 1. 2012

## **10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA**

13. 08. 2023