

NAVODILO ZA UPORABO

Florgan 10 mg orodisperzibilne tablete loratadin

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolje koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 10 dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Florgan in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Florgan
3. Kako jemati zdravilo Florgan
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Florgan
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO FLORGAN IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Florgan vsebuje zdravilno učinkovino loratadin, ki spada v skupino zdravil, imenovanih antihistaminiki, ki jih uporabljamo za zdravljenje simptomov alergije.

Zdravilo Florgan lahko uporabljamo za hitro olajšanje simptomov:

- alergijskega rinitisa (senenega nahoda), kot so kihanje, srbenje in izcedek iz nosu ter srbeče in pekoče oči,
- kronične koprivnice, kot so srbenje in pordelost kože ter kožni izpuščaji.

Orodisperzibilne tablete Florgan se v stiku s slino v ustih razpustijo, zato jih lahko zaužijete brez vode. Tablete imajo okus po sladki pomaranči.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO FLORGAN

Ne uporabljajte zdravila Florgan

- če ste alergični (preobčutljivi) na loratadin ali katerokoli sestavino zdravila Florgan,
- pri otrocih, ki so mlajši od 2 let.

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Florgan

- če imate hudo bolezen jeter, o tem obvestite svojega zdravnika,
- če morate opraviti kožne teste za ugotavljanje alergije, priporočamo, da zdravilo Florgan prenehate jemati vsaj 2 dneva prej, ker lahko zdravilo prikrije znake preobčutljivosti.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Do medsebojnega delovanja lahko pride z vsemi znanimi zaviralci določenih encimov (CYP3A4 ali CYP2D6), kar povzroči povečano koncentracijo zdravilne učinkovine v krvi, zato pa se poveča pogostnost pojavljanja neželenih učinkov.

Jemanje zdravila Florgan skupaj s hrano in pijačo

Zdravila Florgan ni potrebno jemati z vodo ali tekočino.
Zdravilo Florgan lahko jemljete neodvisno od hrane.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Nosečnost

Varnost uporabe zdravilne učinkovine loratadin med nosečnostjo ni bila dokazana, zato jemanje zdravila Florgan med nosečnostjo ni priporočljivo.

Dojenje

Zdravilna učinkovina loratadin se izloča v materino mleko, zato jemanje zdravila Florgan med dojenjem ni priporočljivo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni pričakovati, da bi zdravilo Florgan v priporočenih odmerkih imelo vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev. Kljub temu lahko nekateri ljudje občutijo zaspanost, kar lahko vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Florgan

Zdravilo Florgan vsebuje aspartam, ki je vir fenilalanina. Lahko škoduje ljudem s fenilketonurijo.

Zdravilo Florgan vsebuje laktozo in sorbitol. Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO FLORGAN

Pri jemanju zdravila Florgan natančno upoštevajte zdravnikova ali farmacevtova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Način uporabe in odmerjanje

Orodisperzibilne tablete zdravila Florgan so namenjene za peroralno uporabo (zaužitje skozi usta). Položite jih na jezik (glejte točko 3 v nadaljevanju). Orodisperzibilne tablete se raztopijo v ustih, ko pridejo v stik s slino, zato jih lahko jemlje brez vode. Imajo sladek okus po pomaranči.

Z orodisperzibilnimi tabletami zdravila Florgan ravnajte previdno, ker se lahko hitro zdrobijo. Ne prijemajte jih z mokrimi rokami.



1. Ločite posamezno enoto v ovojnicini po zarezi.



2. Povlecite folijo v smeri puščice in previdno vzemite tableto iz ovojnicine. Tablete ne smete potiskati skozi folijo.



3. Tableto takoj položite na jezik in počakajte, da se popolnoma razpusti. Šele nato jo pogoltnite. Vode pri tem ne potrebujete.

Odrasli: običajni odmerek je 1 tableta na dan.

Otroci, ki tehtajo več kot 30 kg: običajni odmerek je 1 tableta na dan.

Otroci, ki tehtajo 30 kg ali manj: uporaba orodisperzibilnih tablet Florgan ni priporočljiva.

Otroci, ki so stari od 2 do 12 let, lahko jemljejo zdravilo le po posvetu z zdravnikom.

Zdravila Florgan orodisperzibilne tablete **ne dajajte otrokom, starim manj kot 2 leti.**

Če ste **bolnik z okvaro jeter**, morate zdravljenje začeti z manjšim odmerkom zdravila in to le po zdravnikovem nasvetu ter pod njegovim nadzorom. Za odrasle in otroke, ki tehtajo več kot 30 kg, je priporočen začetni odmerek 1 tableta (10 mg) vsak drugi dan.

Starejšim bolnikom in bolnikom z okvaro ledvic ni potrebno prilagajati odmerka.

Trajanje zdravljenja

Samozdravljenje lahko **traja do 10 dni**. Če se bolezenski znaki po 10 dneh ne izboljšajo ali se celo poslabšajo, obiščite zdravnika.

Če menite, da je učinek zdravila Florgan premočan ali prešibek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Florgan, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Florgan, kot bi smeli, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Zaužitje večjega odmerka od priporočenega lahko povzroči zaspanost, hitro utripanje srca in glavobol.

Zdravilo je potrebno čim prej odstraniti iz prebavil (aktivno oglje v obliki vodne raztopine, izpiranje želodca), ter s tem zmanjšati njegovo vsrkavanje iz prebavil v kri. Zdravljenje prevelikega odmerjanja je odvisno od vaših simptomov. Potekati mora pod zdravniškim nadzorom.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Florgan

Če ste pozabili vzeti zdravilo Florgan, ga vzemite takoj, ko je to mogoče. Pri tem vam urnika odmerjanja ni treba spremeniti. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Florgan neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Neželeni učinki pri otrocih (od 2 do 12 let)

Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov)
Glavobol, razdražljivost, utrujenost.

Neželeni učinki pri odraslih in mladostnikih

Pogosti (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov)

Zaspanost, nespečnost.

Občasni (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

Povečan apetit, glavobol.

Zelo redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov)

Nenadna huda alergijska reakcija (težave z dihanjem, srbenje in otekanje), hitro utripanje srca (tahikardija), neprijetni občutki ob hitrem ali močnem utripanju srca (palpitacije), motnje v delovanju jeter, vnetje želodčne sluznice, slabost, omotica, suha usta, izpuščaji, izpadanje las, utrujenost.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA FLORGAN

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Zdravila Florgan ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na obojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Florgan

- *Zdravilna učinkovina* je loratadin. Ena orodisperzibilna tableta vsebuje 10 mg loratadina.
- *Pomožne snovi* so: mikrokristalna celuloza (E460), brezvodni koloidni silicijev dioksid (E551), manitol (E421), sorbitol (E420), krosповidon, hidratiran koloidni silicijev dioksid, brezvodna laktoza, koruzni škrob, magnezijev stearat (E572), polisorbitat 80, brezvodna citronsko kislina, povidon, premrežen natrijev karmelozat, aroma pomaranče, aspartam (E951).

Izgled zdravila Florgan in vsebina pakiranja

Orodisperzibilna tableta je bela, okrogla in ravna.

Škatla s 4 orodisperzibilnimi tabletami (1 pretisni omot po 4 orodisperzibilne tablete).

Škatla z 10 orodisperzibilnimi tabletami (1 pretisni omot po 10 orodisperzibilnih tablet).

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način izdaje zdravila Florgan

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

Navodilo je bilo odobreno 3. 7. 2013.