

NAVODILO ZA UPORABO

Glandosane oralno pršilo, raztopina

sorbitol, natrijev karmelozat, kalijev klorid, natrijev klorid, kalijev hidrogenfosfat, kalcijev klorid dihidrat, magnezijev klorid heksahidrat

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika, farmacevta ali medicinske sestre.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Glandosane in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Glandosane
3. Kako uporabljati zdravilo Glandosane
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Glandosane
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Glandosane in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Glandosane je raztopina, ki deluje kot umetna slina. Njena sestava s svojimi fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi posnema lastnosti prave sline. Deluje na sluznico, ki je lahko suha zaradi različnih vzrokov:

- vnetje žlez slinavk zaradi sevanja,
- Sjögrenov sindrom (kronična bolezen, za katero je značilna suhost ustne sluznice),
- v enotah intenzivne terapije,
- kot stranski učinek nekaterih zdravil, npr. antidepresivov.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se morate posvetovati z zdravnikom.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Glandosane

Ne uporabljajte zdravila Glandosane

Če ste alergični na učinkovine ali katerokoli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Glandosane

Pršilnik je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Po uporabi ga ne odpirajte na silo in ga ne sežigajte. Ne razpršujte v oči, plamen ali vroča telesa! Varujte pred soncem, direktnim ognjem in drugimi viri toplote! Pršilnika ne prelučnjajte ali sežigajte niti takrat, ko je prazen.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Glandosane se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

Druga zdravila in zdravilo Glandosane

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Zdravilo Glandosane skupaj s hrano in pijačo

Zdravilo lahko uporabljate neodvisno od obrokov hrane.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Glandosane nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Zdravilo Glandosane vsebuje natrijev benzoat (E 211) in sorbinsko kislino (E 200)

To zdravilo vsebuje 29,9 mg natrijevega benzoata (E 211) na 50 ml, kar je enako 59,8 mg natrijevega benzoata (E 211) na 100 ml. Natrijev benzoat lahko poveča tveganje za zlatenico (rumeno obarvanje kože in oči) pri novorojenčkih (do 4. tedna starosti).

To zdravilo vsebuje sorbinsko kislino (E 200). Sorbinska kislina (E 200) lahko povzroči lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol natrija (23 mg) na ml, kar v bistvu pomeni "brez natrija".

3. Kako uporabljati zdravilo Glandosane

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu, ali navodila zdravnika, farmacevta ali medicinske sestre. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

Priporočeno odmerjanje

Po potrebi večkrat na dan navlažite sluznico v ustih in žrelu.

Zdravilo Glandosane uporabljajte toliko časa, dokler ne dosežete primerne vlažnosti ustne votline oziroma kot priporoči zdravnik ali farmacevt.

Način uporabe

Zdravilo Glandosane uporabite tako, da pršite raztopino iz kovinskega vsebnika (1–2 sekundi) neposredno v ustno votlino. Pršilnik pri tem držite navpično. Če menite, da je učinek zdravila Glandosane premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Glandosane, kot bi smeli

Če se po prevelikem odmerku pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Glandosane

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Če ste pozabili uporabiti zdravilo Glandosane, ga uporabite takoj, ko bo mogoče.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavljajo pri vseh bolnikih. Pri priporočeni uporabi neželeni učinki do sedaj niso znani.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

5. Shranjevanje zdravila Glandosane

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Varujte pred soncem, direktnim ognjem in drugimi viri toplote.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Glandosane

50 ml zdravila vsebuje:

- Učinkovine so:

sorbitol	1,5225 g
natrijev karmelozat	0,5075 g
kalijev klorid	0,0609 g
natrijev klorid	0,0428 g
kalijev hidrogenfosfat	0,0174 g
kalcijev klorid dihidrat	0,0074 g
magnezijev klorid heksahidrat	0,0026 g
- Pomožne snovi so:
 - ogljikov dioksid
 - sorbinska kislina (E200)
 - natrijev benzoat (E211)
 - klorovodikova kislina (za uravnavanje pH)
 - natrijev hidroksid (za uravnavanje pH)
 - prečiščena voda

Izgled zdravila Glandosane in vsebina pakiranja

Raztopina je bistra in brezbarvna. V škatli je aluminijast vsebnik z zaporko s pršilnim ventilom, v katerem je 50 ml raztopine.

Način izdaje zdravila Glandosane

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Farmedica, d. o. o., Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/5240216,
faks: 01/5240214,
e-pošta: farmedica@farmedica.si

Proizvajalec

STADAPHARM GmbH, Feodor-Lynen-Str. 35, 30625 Hannover, Nemčija

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 21.10.2022.