

Navodilo za uporabo

Metforminijev klorid Lek 500 mg filmsko obložene tablete **Metforminijev klorid Lek 850 mg filmsko obložene tablete**

metforminijev klorid

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Metforminijev klorid Lek in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Metforminijev klorid Lek
3. Kako jemati zdravilo Metforminijev klorid Lek
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Metforminijev klorid Lek
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Metforminijev klorid Lek in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Metforminijev klorid Lek vsebuje metformin, zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni. Sodi v skupino zdravil, ki se imenujejo bigvanidi. Insulin je hormon, ki ga proizvaja trebušna slinavka in uravnava količino glukoze (sladkorja) v krvi. Telo uporablja glukozo za proizvodnjo energije ali pa jo shrani za kasnejšo uporabo.

Če imate sladkorno bolezen, trebušna slinavka ne proizvaja dovolj insulina ali pa ga vaše telo ni sposobno ustrezno uporabljati. To povzroči visoko koncentracijo glukoze v krvi. Zdravilo Metforminijev klorid Lek pomaga znižati koncentracijo glukoze v krvi na čimbolj normalno raven.

Če ste odrasla oseba s prekomerno telesno maso, bo jemanje zdravila Metforminijev klorid Lek skozi daljše obdobje pomagalo tudi zmanjšati tveganje za pojav zapletov, povezanih s sladkorno boleznijo. Zdravilo Metforminijev klorid Lek ima vpliv na vzdrževanje stabilne telesne mase ali zmerno zmanjšanje telesne mase.

Zdravilo Metforminijev klorid Lek se uporablja za zdravljenje bolnikov s **sladkorno boleznijo tipa 2** (imenovano tudi »od insulina neodvisna sladkorna bolezen«), kadar z dieto in telesno aktivnostjo ni mogoče doseči primerne nadzora ravni krvnega sladkorja. Metforminijev klorid se uporablja predvsem pri bolnikih s čezmerno telesno maso.

Odrasli lahko jemljejo metformin samostojno ali v kombinaciji z drugimi zdravili za zdravljenje sladkorne bolezni (zdravila, ki jih bolnik zaužije ali insulin).

Otroci po dopolnjenem 10. letu starosti in mladostniki lahko jemljejo metformin samostojno ali v kombinaciji z insulinom.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Metforminijev klorid Lek

Ne jemljite zdravila Metforminijev klorid Lek:

- če ste **alergični** na metformin ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- če imate hudo oslabiljeno delovanje ledvic.
- če imate nenadzorovano sladkorno bolezen, na primer s hudo hiperglikemijo (visoko ravno sladkorja v krvi), siljenjem na bruhanje, bruhanjem, drisko, hitro izgubo telesne mase, laktacidozo (glejte spodaj »Tveganje za laktacidozo«) ali ketoacidozo. Ketoacidoza je stanje, pri katerem se snovi, imenovane »ketonska telesa«, kopičijo v krvi, kar lahko povzroči diabetično predkomo. Simptomi vključujejo bolečine v trebuhu, hitro in globoko dihanje, zaspanost ali zadah z nenavadnim sadnim vonjem.
- če imate **težave z jetri**.
- če redno uživete velike količine **alkohola**.
- če ste iz telesa izgubili preveč vode (**dehidracija**), na primer po
 - dolgotrajni ali hudi driski,
 - večkratnem zaporednem bruhanju.

Dehidracija lahko vodi v težave z ledvicami, ki pomenijo tveganje za pojav laktacidoze (glejte spodaj »Opozorila in previdnostni ukrepi«).

- če se zdravite zaradi akutnega srčnega popuščanja ali ste pred kratkim imeli srčni infarkt, imate resne težave s krvnim obtokom (kot na primer šok) ali imate težave z dihanjem. To lahko povzroči pomanjkanje preskrbe tkiva s kisikom, kar lahko pomeni tveganje za pojav laktacidoze (glejte spodaj »Opozorila in previdnostni ukrepi«).
- če imate hudo okužbo, kot je okužba pljuč, bronhialnega sistema ali ledvic. Hude okužbe lahko vodijo v težave z ledvicami, ki pomenijo tveganje za pojav laktacidoze (glejte spodaj »Opozorila in previdnostni ukrepi«).

Če karkoli od zgoraj navedenega velja za vas, se, preden začnete jemati to zdravilo, posvetujte z zdravnikom.

Posvetujte se z zdravnikom, če:

- potrebujete preiskavo, kot je rentgen ali drugo preiskavo, ki vključuje injiciranje kontrastnega sredstva, ki vsebuje jod, v krvni obtok,
- če morate na večji kirurški poseg.

Če morate na večji kirurški poseg, morate v času posega in še nekaj časa po tem prenehati z jemanjem zdravila Metforminijev klorid Lek. Zdravnik se bo odločil, kdaj morate z jemanjem zdravila Metforminijev klorid Lek prenehati in kdaj lahko nadaljujete.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Tveganje za laktacidozo

Zdravilo Metforminijev klorid Lek lahko povzroči zelo redek, a zelo resen neželeni učinek, imenovan laktacidoza, zlasti če ledvice ne delujejo pravilno. Tveganje za razvoj laktacidoze je večje tudi ob sočasni nenadzorovani sladkorni bolezni, resnih okužbah, dolgotrajnem postenju ali čezmernem uživanju alkohola, dehidraciji (glejte dodatne informacije spodaj), težavah z jetri ali katerih koli bolezenskih stanjih, pri katerih je oskrba dela telesa s kisikom zmanjšana (na primer akutna huda bolezen srca).

Če kar koli od zgoraj navedenega velja za vas, se za več navodil posvetujte z zdravnikom.

Za kratek čas prenehajte jemati zdravilo Metforminijev klorid Lek, če imate stanje, ki je lahko povezano z dehidracijo (znatna izguba telesnih tekočin), kot je hudo bruhanje, driska, zvišana telesna temperatura, izpostavljenost vročini ali če pijete manj tekočine, kot običajno. Za več navodil se posvetujte z zdravnikom.

Takoj prenehajte jemati zdravilo Metforminijev klorid Lek in se obrnite na zdravnika ali najbližjo bolnišnico, če se pojavijo nekateri od simptomov laktacidoze, saj lahko to stanje vodi v komo.

Simptomi laktacidoze vključujejo:

- bruhanje,
- bolečina v trebuhu (abdominalna bolečina),
- mišične krče,
- splošno slabo počutje s hudo utrujenostjo,
- težave z dihanjem,
- znižano telesno temperaturo in počasen srčni utrip.

Laktacidoza je urgentno zdravstveno stanje, ki ga je treba zdraviti v bolnišnici.

Pred začetkom jemanja zdravila Metforminijev klorid Lek ali če se katero od spodaj navedenih stanj nanaša na vas, se posvetujte z zdravnikom:

- simptomi **prenizke ravni krvnega sladkorja**, kot so:
 - šibkost,
 - omotičnost,
 - povečano znojenje,
 - pospešen srčni utrip,
 - motnje vida,
 - težave s koncentracijo.

Če občutite te simptome, pojejte ali popijte nekaj sladkega. Samo zdravilo Metforminijev klorid Lek ne more povzročiti pretiranega znižanja ravni krvnega sladkorja, lahko pa to storijo druga zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni.

- **čezmerna telesna masa.**
Držite se predpisane diete z omejevanjem vnosa kalorij.
- **uporaba drugih zdravil.**
Glejte poglavje »Druga zdravila in zdravilo Metforminijev klorid Lek«.

Med zdravljenjem z zdravilom Metforminijev klorid Lek bo zdravnik **vsaj enkrat letno preveril delovanje ledvic**, če pa ste starejša oseba in/ali se vam delovanje ledvic slabša, pa še pogosteje.

Otroci, mlajši od 10 let

Jemanje zdravila Metforminijev klorid Lek za to starostno skupino **ni priporočeno**.

Druga zdravila in zdravilo Metforminijev klorid Lek

Če vam bodo v krvni obtok injicirali kontrastno sredstvo, ki vsebuje jod, na primer zaradi rentgenskega ali drugega slikanja, morate pred časom injiciranja ali v tem času prenehati z jemanjem zdravila Metforminijev klorid Lek. Zdravnik se bo odločil, kdaj morate z jemanjem zdravila Metforminijev klorid Lek prenehati in kdaj lahko nadaljujete.

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo. Morda boste morali pogosteje opravljati preiskave glukoze v krvi in delovanja ledvic, zdravnik pa bo morda moral prilagoditi odmerek zdravila Metforminijev klorid Lek. Posebno pomembno je omeniti naslednje:

- zdravila, ki vsebujejo **alkohol**,
- **glukokortikoidi**, zdravila za preprečevanje zavrnitve presajenih organov in zmanjšanje vnetja, na primer pri astmi ali kožnih vnetjih,
- **zdravila za širjenje dihalnih poti**, na primer salbutamol, fenoterol in terbutalin,
- zdravila, ki povečajo nastajanje urina (diuretiki),
- zdravila **za zdravljenje bolečine in vnetja** (nesteroidna protivnetna zdravila in ali zaviralci COX-2, kot sta ibuprofen in celekoksib),
- nekatera zdravila **za zdravljenje visokega krvnega tlaka** (zaviralci ACE in antagonisti receptorjev angiotenzina II),

- **zdravila, ki lahko spremenijo količino zdravila Metforminijev klorid Lek v vaši krvi**, še zlasti, če imate oslABLJENO delovanje ledvic (npr. verapamil, rifampicin, cimetidin, dolutegravir, ranolazin, trimetoprim, vandetanib, izavukonazol, krizotinib, olaparib),
- **zdravila za zniževanje ravni krvnega sladkorja** kot na primer insulin ali zdravila za peroralno uporabo.
Sočasno jemanje zdravila Metforminijev klorid Lek in naštetih zdravil lahko povzroči pretirano znižanje ravni krvnega sladkorja. Glejte poglavje »Opozorila in previdnostni ukrepi«.

Zdravilo Metforminijev klorid Lek skupaj z alkoholom

Med jemanjem zdravila Metforminijev klorid Lek ne uživajte čezmernih količin alkohola, saj lahko to poveča tveganje za laktacidozo (glejte poglavje »Opozorila in previdnostni ukrepi«).

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

- Nosečnost

Ne jemljite zdravila **Metforminijev klorid Lek**, če ste noseči ali načrtujete zanositev. V takem primeru obvestite zdravnika, saj je treba zdravljenje z zdravilom Metforminijev klorid Lek prekiniti in ga nadomestiti z insulinom.

- Dojenje

Če dojite, **ne jemljite** zdravila **Metforminijev klorid Lek**, ne da bi se pred tem posvetovali z zdravnikom.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Metforminijev klorid Lek samo ne povzroča hipoglikemije (prenizko koncentracijo glukoze v krvi). To pomeni, da ne vpliva na vašo sposobnost za vožnjo ali upravljanje strojev. Vseeno morate biti posebno previdni, če zdravilo Metforminijev klorid Lek jemljete skupaj z drugimi zdravili za zdravljenje sladkorne bolezni, ki lahko povzročijo hipoglikemijo (na primer sulfonilsečnine, insulin, meglitinidi). Simptomi hipoglikemije vključujejo šibkost, omotico, močnejše znojenje, hiter srčni utrip, motnje vida in težave s koncentracijo. Če se pri vas pojavijo ti simptomi, ne vozite in ne upravljajte strojev.

3. Kako jemati zdravilo Metforminijev klorid Lek

Metforminijev klorid Lek 500 mg:

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Če imate zmanjšano delovanje ledvic, vam bo morda zdravnik predpisal manjši odmerek.

Zdravilo Metforminijev klorid Lek ne more nadomestiti koristi zdravega življenjskega sloga. Nadaljujte z upoštevanjem nasvetov o dieti, ki vam jih je dal zdravnik, in se redno ukvarjajte s telesno aktivnostjo.

* Za potrebe individualnega prilagajanja odmerkov so na voljo tudi tablete, ki vsebujejo 850 mg in 1000 mg učinkovine metforminijev klorid.

Odrasli

- Priporočeni odmerek: 1 tableta zdravila Metforminijev klorid Lek 500 mg dvakrat do trikrat na dan.

- Po približno dveh tednih jemanja zdravila Metforminijev klorid Lek bo zdravnik izmeril vašo raven krvnega sladkorja in morda prilagodil odmerke.
- Največji odmerek: 6 tablet* zdravila Metforminijev klorid Lek 500 mg na dan, razdeljenih v tri odmerke.

Otroci, stari 10 let ali več

- Običajen začetni odmerek: 1 tableta zdravila Metforminijev klorid Lek 500 mg ali 850 mg* metforminijevega klorida na dan.
- Po približno dveh tednih jemanja zdravila Metforminijev klorid Lek bo zdravnik izmeril otrokovo raven krvnega sladkorja in po potrebi prilagodil odmerek.
- Največji odmerek: 4 tablete* zdravila Metforminijev klorid Lek 500 mg na dan, v dveh ali treh odmerkih.

Bolniki, stari 65 let ali več

Zdravnik bo določil odmerek na podlagi delovanja vaših ledvic, saj je v tej starostni skupini pogostnost okvarjenega delovanja ledvic visoka. Glejte tudi poglavje 2, razdelek »Opozorila in previdnostni ukrepi«.

Način jemanja

Tablete pogoltnite cele s kozarcem vode **med obrokom ali po njem**.

Metforminijev klorid Lek 850 mg:

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Če imate zmanjšano delovanje ledvic, vam bo morda zdravnik predpisal manjši odmerek.

* Za potrebe individualnega prilagajanja odmerkov so na voljo tudi tablete, ki vsebujejo 500 mg in 1000 mg učinkovine metforminijev klorid.

Odrasli

- Običajen odmerek: 1 tableta zdravila Metforminijev klorid Lek 850 mg dvakrat do trikrat na dan.
- Po približno dveh tednih jemanja zdravila Metforminijev klorid Lek bo zdravnik izmeril vašo raven krvnega sladkorja in morda prilagodil odmerek.
- Največji odmerek: 3000 mg* metforminijevega klorida na dan razdeljen v tri odmerke.

Otroci, stari 10 let ali več

- Običajen začetni odmerek: 500 mg* metforminijevega klorida ali 1 tableta zdravila Metforminijev klorid Lek 850 mg na dan. Po približno dveh tednih jemanja zdravila Metforminijev klorid Lek bo zdravnik izmeril otrokovo raven krvnega sladkorja in po potrebi prilagodil odmerek.
- Največji odmerek: 2000 mg* metforminijevega klorida na dan, v dveh ali treh odmerkih.

Bolniki, stari 65 let ali več

Zdravnik bo določil odmerek na podlagi delovanja vaših ledvic, saj je v tej starostni skupini pogostnost okvarjenega delovanja ledvic visoka. Glejte tudi 2. poglavje, razdelek »Opozorila in previdnostni ukrepi«.

Način jemanja

Tablete pogoltnite s kozarcem vode **med obrokom ali po njem**. Razdelilna zarezna je namenjena le delitvi tablete za lažje požiranje.

Spremljanje

- Zdravnik vam bo redno določal koncentracijo glukoze v krvi in prilagajal vaš odmerek zdravila Metforminijev klorid Lek glede na koncentracije glukoze v vaši krvi. Poskrbite, da se redno posvetujete z zdravnikom. To je še posebno pomembno pri otrocih in mladostnikih ali če ste starejša oseba.
- Zdravnik bo tudi vsaj enkrat letno preveril delovanje vaših ledvic. Če ste starejši ali če imate okvarjeno delovanje ledvic, boste morda potrebovali pogostejše preglede.

Trajanje zdravljenja

Trajanje zdravljenja odredi lečeči zdravnik.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Metforminijev klorid Lek, kot bi smeli

Če ste vzeli prevelik odmerek zdravila Metforminijev klorid Lek, takoj pokličite zdravnika ali najbližjo bolnišnico.

Prevelik odmerek zdravila Metforminijev klorid Lek ne bo povzročil pretirano nizke ravni krvnega sladkorja, lahko pa poveča tveganje za pojav zakisanja krvi zaradi kopičenja mlečne kisline v krvi.

Simptomi zakisanja so opisani na koncu razdelka »Ne jemljite zdravila Metforminijev klorid Lek«. Bolečine v mišicah s krči, hitro in globoko dihanje, izguba zavesti ali koma se lahko pojavijo v nekaj urah. To stanje zahteva takojšen sprejem v bolnišnico.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Metforminijev klorid Lek

Če ste pozabili vzeti odmerek, ta odmerek preskočite in zaužijte naslednji odmerek ob naslednjem predpisanem času.

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če ste prenehali jemati zdravilo Metforminijev klorid Lek

Prenehanje zdravljenja z zdravilom Metforminijev klorid Lek brez zdravnikovega soglasja lahko povzroči nenadzorovan dvig ravni krvnega sladkorja. To poveča tveganje za dolgoročne okvare, na primer na očeh, ledvicah in krvnih žilah.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Zdravilo Metforminijev klorid Lek lahko povzroči zelo redek (pojavi se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov), a zelo resen neželeni učinek, imenovan laktacidoza (glejte poglavje »Opozorila in previdnostni ukrepi«). V tem primeru morate **prenehati jemati zdravilo Metforminijev klorid Lek in se takoj obrniti na zdravnika ali najbližjo bolnišnico**, saj lahko laktacidoza vodi v koma.

Ostali možni neželeni učinki:

Zelo pogosti, pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov.

- slabost s siljenjem na bruhanje,
- bruhanje,
- driska,
- bolečine v trebuhu,
- izguba teka.

Ti učinki se pojavijo predvsem na začetku zdravljenja in v večini primerov izzvenijo sami od sebe. Za preprečevanje teh učinkov je priporočljivo tablete zaužiti med obrokom ali po njem ter v dveh ali treh ločenih odmerkih.

Pogosti, pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov.

- spremembe okušanja.

Zelo redki, pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov

- zmanjšanje absorpcije vitamina B12 v črevesju pri dolgotrajnem zdravljenju z zdravilom Metforminijev klorid Lek,
- pordelost kože,
- srbenje,
- srbeč izpuščaj,
- nenormalne vrednosti jetrnih testov ali vnetje jeter; to lahko povzroči:
 - utrujenost,
 - izgubo teka,
 - izgubo telesne mase,
 - porumenelost kože ali beločnic.

Če opazite katerega od teh znakov, nemudoma prenehajte jemati zdravilo Metforminijev klorid Lek in se posvetujte z zdravnikom.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si.

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Metforminijev klorid Lek

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in pretisnem omotu ali vsebniku za tablete, poleg oznake »EXP:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Metforminijev klorid Lek

Učinkovina je metforminijev klorid.

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 500 mg metforminijevega klorida, kar ustreza 390 mg metformina.

Ena filmsko obložena tableta vsebuje 850 mg metforminijevega klorida, kar ustreza 662,9 mg metformina.

Druge sestavine zdravila so: povidon K 90, magnezijev stearat, hipromeloza, makrogol 4000, titanov dioksid.

Izgled zdravila Metforminijev klorid Lek in vsebina pakiranja

500 mg filmsko obložene tablete:

Okrogle, bele, bikonveksne, filmsko obložene tablete z oznako »M 500« na eni strani in brez oznak na drugi strani.

Velikost: 11 mm x 6 mm.

Zdravilo Metforminijev klorid Lek 500 mg je na voljo v

- vsebniku za tablete iz HDPE z LDPE zaporko ali s PP zaporko in vsebnikom s sušilnim sredstvom s po 30, 60, 100, 250, 330, 400, 500 filmsko obloženimi tabletami.
- PVC/alu pretisnih omotih s po 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 250, 270 filmsko obloženimi tabletami.

850 mg filmsko obložene tablete:

Ovalne, bele, filmsko obložene tablete z zarezo na eni strani in oznako »M 850« na drugi strani.

Velikost: 19 mm x 6,5 mm.

Zdravilo Metforminijev klorid Lek 850 mg je na voljo v

- vsebniku za tablete iz HDPE z LDPE zaporko ali s PP zaporko in vsebnikom s sušilnim sredstvom s po 30, 60, 100, 200, 250, 500 filmsko obloženimi tabletami.
- PVC/alu pretisnih omotih s po 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 250, 300 filmsko obloženimi tabletami.

Vsebnik s sušilnim sredstvom pustite v plastenki.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Metforminijev klorid Lek

Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija

Proizvajalci

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Nemčija
Lek S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varšava, Poljska
Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Poljska

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

BG: МЕГЛЮКОН 850 МГ ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ

BE: Metformine Sandoz 500 mg filmomhulde tabletten

Metformine Sandoz 850 mg filmomhulde tabletten

- CZ: Metformin Sandoz
Metformin Sandoz
- DK: Metformin »Sandoz«
- ES: Metformina Sandoz 850 mg comprimidos recubiertos con película EFG
- FI: Oramet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Oramet 850 mg tabletti, kalvopäällysteinen
- FR: METFORMINE SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé
METFORMINE SANDOZ 850 mg, comprimé pelliculé
- IS: Metformin Sandoz 500 mg filmuhúðuð tafla
- NL: METFORMINE HCL SANDOZ 500 MG, filmomhulde tabletten
METFORMINE HCL SANDOZ 850 MG, filmomhulde tabletten
- NO: Metformin Sandoz 500 mg tabletter, filmdrasjerte
Metformin Sandoz 850 mg tabletter, filmdrasjerte
- PT: Metformina Sandoz
Metformina Romac
- PL: ETFORM 500
ETFORM 850
- SE: Metformin Sandoz 500 mg filmdragerad tablett
Metformin Sandoz 850 mg filmdragerad tablett
- SI: Metforminijev klorid Lek 500 mg filmsko obložene tablete
Metforminijev klorid Lek 850 mg filmsko obložene tablete
- UK: Metformin Hydrochloride 500 mg film-coated tablets
Metformin Hydrochloride 850 mg film-coated tablets

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 03.08.2021.