

Navodilo za uporabo

Rivotril 0,5 mg tablete

Rivotril 2 mg tablete

klonazepam

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Rivotril in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Rivotril
3. Kako jemati zdravilo Rivotril
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Rivotril
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Rivotril in za kaj ga uporabljamo

Tablete Rivotril vsebujejo učinkovino klonazepam, ki spada v skupino zdravil, imenovanih benzodiazepini. Klonazepam preprečuje epileptične napade (krče). Zdravilo Rivotril se uporablja za zdravljenje epilepsije pri dojenčkih, otrocih in odraslih.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Rivotril

Ne jemljite zdravila Rivotril:

- če ste alergični na klonazepam ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če ste alergični na druga zdravila iz skupine benzodiazepinov (med njimi so diazepam, flurazepam in temazepam),
- če redno pijete alkohol ali jemljete droge ali ste imeli v preteklosti težave z odvisnostjo od alkohola, zdravil ali drog,
- pri težavah z dihanjem ali hudi bolezni pljuč,
- pri hudi okvari jeter (ker lahko zdravilo sproži motnje zavesti ali komo).

Zdravila ne smete prejeti, če ste v komi.

Če kar koli od navedenega velja za vas, ne jemljite zdravila Rivotril. Če niste prepričani, se posvetujte z zdravnikom.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Rivotril se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Rivotril:

- **Pri dojenčkih in majhnih otrocih** je treba paziti na prehodnost dihalnih poti, ker se lahko zveča slinjenje in izločanje bronhialne sluzi.
- **Če sočasno jemljete druge antiepileptike ali zdravila, ki delujejo na osrednje živčevje**, vam bo zdravnik prilagodil odmerek zdravila Rivotril (glejte tudi odstavek »Druga zdravila in zdravilo Rivotril«).
- **Izogibati se morate uživanju alkohola**, saj lahko alkohol poveča učinke zdravila Rivotril, kar

- lahko vodi do hude zaspanosti in omotičnosti ali celo do zaviralnega delovanja na dihalni in srčno-žilni sistem (glejte odstavek »Zdravilo Rivotril skupaj s hrano, pijačo in alkoholom«).
- **POMEMBNO: Jemanja zdravila Rivotril ne smete prekiniti nenadoma**, ker lahko s tem sprožite hud epileptični napad. Če je treba zdravljenje prekiniti, vam bo zdravnik odmerke zmanjševal postopoma (glejte poglavje »Če ste prenehali jemati zdravilo Rivotril«).
 - **Fizična in psihološka odvisnost:** Jemanje benzodiazepinov, med katere sodi tudi zdravilo Rivotril, lahko povzroči fizično in psihološko odvisnost, zlasti pri bolnikih, ki so tudi sicer nagnjeni k odvisnosti (odvisniki od alkohola, drog ali zdravil), pri večjih odmerkih in dolgotrajnem zdravljenju. Če jemanje prekinete nenadoma oziroma odmerek zmanjšate prehitro, lahko pri vas nastopi odtegnitveni sindrom (glejte poglavje »Če ste prenehali jemati zdravilo Rivotril«).
 - **Paradoksalne reakcije:** Pri jemanju zdravila Rivotril se tako kot pri ostalih benzodiazepinih lahko pojavljajo paradoksalne reakcije, kot so nemir, vznemirjenost, razdražljivost, agresivnost, tesnoba, zmedenost, jeza, nočne more, halucinacije, psihoze, neprimerno vedenje in drugi vedenjski neželeni učinki. Pojav paradoksalnih reakcij je bolj verjeten pri otrocih in starejših. V primeru pojava paradoksalnih reakcij se posvetujte z zdravnikom, saj boste morda morali prenehati jemati zdravilo Rivotril.
 - **Samomorilne misli:** Pri majhnem številu bolnikov, ki so se zdravili z antiepileptiki, kot je zdravilo Rivotril, so se pojavile misli na samopoškodovanje ali samomor. Če kadar koli začnete razmišljati o tem, se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Zdravnik vas bo pogosteje nadzoroval tudi, če ste v preteklosti že imeli depresijo ali ste bili nagnjeni k poskusom samomora.
 - **Dolgotrajno jemanje zdravila Rivotril ali zdravljenje z velikimi odmerki:** pride lahko do pojava reverzibilne motnje, kot so motnja govora zaradi okvare možganov ali perifernih živcev (disartrija), zmanjšana koordinacija gibov in motnja gibanja (ataksija), nehoteni ritmični gibi zrkel in dvojni vid (diplopija). Tveganje za anterogradno amnezijo (izguba spomina), ki se lahko pojavi pri uporabi benzodiazepinov v terapevtskih odmerkih, se pri večjih odmerkih še poveča. Izguba spomina je lahko povezana z neprimernim vedenjem. Pri nekaterih oblikah epilepsije se lahko pri dolgotrajnem zdravljenju poveča pogostnost napadov.

Pri jemanju zdravila Rivotril bodite pozorni tudi, če imate katero od naslednjih **bolezni**:

- ataksijo (bolezen, pri kateri je motena usklajenost mišičnih gibov);
- miastenijo gravis (avtoimunsko bolezen, za katero sta značilni šibkost mišic in hitra utrudljivost);
- blago do zmerno bolezen jeter. Zdravnik vam bo prilagodil odmerek zdravila Rivotril ter pogosteje izvajal kontrole delovanja jeter in vaše krvne slike;
- bolezen dihal (npr. kronično obstruktivno pljučno bolezen). Zdravnik vam bo prilagodil odmerek zdravila Rivotril;
- če ste starejši ali ste oslabljeni. Zdravnik vam bo prilagodil odmerek zdravila Rivotril;
- porfirijo (motnja v presnovi porfirina);
- apnejo (začasno prenehanje dihanja) v spanju. Jemanje zdravila Rivotril pri bolnikih z apnejo v spanju ni priporočljivo in je dovoljeno le v skladu z navodili zdravnika, ki je pretehtal koristi in tveganja zdravljenja.

Druga zdravila in zdravilo Rivotril

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo. To velja tudi za zdravila rastlinskega izvora.

To je pomembno, ker se lahko med sočasnim jemanjem več zdravil poveča ali zmanjša njihov učinek.

➔ Še posebej je pomembno, da zdravniku ali farmacevtu poveste, če jemljete katero od naslednjih zdravil:

- druga zdravila za zdravljenje epilepsije, kot so karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, lamotrigin, natrijev valproat ali valprojska kislina, pirimidon,
- uspavala (hipnotike),
- nekatera zdravila proti bolečinam (analgetike),
- zdravila za zdravljenje psihoz (nevroleptike),

- zdravila za zdravljenje depresije (antidepresive),
- zdravila za zdravljenje glivičnih okužb (antimikotiki), kot je flukonazol.

Če niste prepričani, ali jemljete katero od navedenih zdravil, vprašajte svojega zdravnika.

Veliko od teh zdravil deluje na osrednje živčevje, zato lahko ob sočasnem jemanju zdravila Rivotril pride do močnejše izražene zaspanosti ter omotičnosti ali celo do zaviralnega delovanja na srčno-žilni in dihalni sistem. Zdravnik vam bo prilagodil odmerke teh zdravil, da bo dosežen optimalni odziv na zdravljenje.

Zdravilo Rivotril skupaj s hrano, pijačo in alkoholom

Zdravilo Rivotril lahko vzamete ne glede na obroke hrane.

Med jemanjem zdravila Rivotril se izogibajte pitju alkohola (glejte tudi odstavek »Opozorila in previdnostni ukrepi«). Pri taki sočasni uporabi so učinki, kot sta zaspanost in omotičnost, bolj izraziti, lahko pa pride tudi do zaviralnega delovanja na srčno-žilni in dihalni sistem.

Nosečnost in dojenje

Zdravila Rivotril se med nosečnostjo ne sme jemati, razen izjemoma v nujnih primerih. Zdravilo namreč lahko škodljivo vpliva na plod ali pri novorojenčku povzroči odtegnitveni sindrom.

→ Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete to zdravilo. Tako nosečnost sama kot nenadna prekinitev jemanja zdravila Rivotril lahko povzroči poslabšanje epilepsije.

Klonazepam prehaja v mleko, zato se zdravila Rivotril med dojenjem ne sme jemati. Če je zdravljenje nujno potrebno, je treba dojenje prekiniti.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

O vožnji avtomobila ter upravljanju strojev med jemanjem zdravila Rivotril se posvetujte z zdravnikom. Zdravilo Rivotril lahko namreč upočasni vaše reakcije, zlasti v prvih dneh po začetku zdravljenja ali ob sočasnem uživanju alkohola, zato se takrat tovrstnim dejavnostim popolnoma izogibajte.

Če imate kakršnekoli dvome glede sposobnosti za vožnjo ter rokovanje s stroji oziroma orodji, se posvetujte z zdravnikom.

V splošnem je pravilo, da bolniki z epilepsijo ne smejo voziti. Tudi ko so z zdravilom Rivotril ustrezno nadzorovani, se je treba zavedati, da lahko vsako povečanje odmerka ali sprememba v času jemanja odmerka spremeni bolnikove reakcije.

Zdravilo Rivotril vsebuje laktozo

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom.

3. Kako jemati zdravilo Rivotril

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Pogoltnite tableto z zadostno količino vode. **Tablet ne smete zgristi.** Za lažje odmerjanje lahko 0,5-mg tableto razdelite na dva enaka odmerka, 2-mg pa na dva ali štiri enake odmerke. Če želite tableto prelomiti, stran z zarezo obrnite k sebi in jo prelomite.

- Zdravljenje boste začeli z majhnimi odmerki, ki vam jih bo zdravnik v obdobju 2 do 4 tednov postopoma povečeval, dokler ne bo dosežen želeni učinek. Če zdravljenje začnete z majhnimi odmerki, so namreč neželeni učinki ob začetku zdravljenja blažji in manj pogosti.
- Zdravnik vam bo običajno naročil, da **celokupni dnevni odmerek razdelite na tri ali štiri**

enake odmerke, ki jih boste jemali v enakomernih časovnih razmikih prek dneva.

- Zdravnik vam bo predpisal odmerek, ki bo ustrezal le vam in ga prilagodil glede na vašo starost in na vaš odziv na zdravilo. **Odmerkov ne smete spreminjati ali zdravljenja prekinjati, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom.**

Odrasli

Običajni začetni odmerek je 1 mg na dan (ena 0,5-mg tableta dvakrat na dan).

Ta odmerek bo zdravnik postopoma povečal (vzdrževalni odmerek je običajno med 4 mg in 8 mg na dan). Največji odmerek znaša 20 mg na dan.

Starejši

Zdravnik vam bo odmerek skrbno prilagodil. Priporočeni začetni odmerek je 0,25 mg ali 0,5 mg na dan. Najbolje ga je vzeti pred spanjem.

Ta odmerek bo zdravnik postopoma povečal (vzdrževalni odmerek je običajno med 0,5 mg in 3 mg na dan).

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Dojenčki (do 1 leta)*

Običajni začetni odmerek je 0,2 mg na dan (**1 kapljica (0,1 mg), dvakrat na dan**).

Ta odmerek bo zdravnik postopoma povečal (vzdrževalni odmerek je običajno med 0,5 mg in 1 mg na dan).

Majhni otroci (od 1 do 5 let)*

Običajni začetni odmerek je 0,6 mg na dan (**2 kapljici (0,2 mg), trikrat na dan**).

Ta odmerek bo zdravnik postopoma povečal (vzdrževalni odmerek je običajno med 1,5 mg in 3 mg na dan).

***Pri odmerjanju zdravila Rivotril za majhne otroke in dojenčke upoštevajte zdravnikova navodila, saj zdravila v obliki kapljic v Republiki Sloveniji ni na voljo. Navedeni odmerki v miligramih so informativnega značaja.**

Otroci, stari od 5 do 12 let

Običajni začetni odmerek je 0,5 mg na dan (polovica 0,5-mg tablete dvakrat na dan).

Ta odmerek bo zdravnik postopoma povečal (vzdrževalni odmerek je običajno med 3 mg in 6 mg na dan).

Otroci, starejši od 12 let

Običajni začetni odmerek je 1 mg na dan (ena 0,5-mg tableta dvakrat na dan).

Ta odmerek bo zdravnik postopoma povečal (vzdrževalni odmerek je običajno med 4 mg in 8 mg na dan). Največji odmerek znaša 20 mg na dan.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Rivotril, kot bi smeli

→ **Nemudoma poiščite zdravniško pomoč** ali pojdite v bolnišnico. Če je mogoče, škatlico zdravila Rivotril vzemite s seboj.

Če ste vzeli preveč tablet, lahko pri vas nastopijo pomanjkanje refleksov, začasno prenehanje dihanja, nizek krvni tlak, zaviranje dihalnega in srčno-žilnega sistema, krči in koma.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Rivotril

- Pozabljeni odmerek izpustite. Naslednji odmerek vzemite ob običajnem času.
- **Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.**

Če ste prenehali jemati zdravilo Rivotril

- **Tablet ne smete nehati jemati, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom.** Če jemanje zdravila Rivotril naglo prekinete, lahko s tem sprožite hud epileptični napad.
- Če je treba zdravljenje prekiniti ali zmanjšati odmerek, je treba to storiti postopoma. Upoštevajte navodila vašega zdravnika.
- **Odtegnitveni sindrom:**

Jemanje benzodiazepinov, med katere sodi tudi zdravilo Rivotril, lahko povzroči fizično in psihološko odvisnost. Če jemanje prekinete nenadoma oziroma odmerek zmanjšate prehitro, lahko pri vas nastopi odtegnitveni sindrom, katerega znaki so:

- nekontrolirano tresenje (tremor),
- znojenje,
- huda tesnoba, katere posledica je motorični nemir (agitacija),
- motnje spanja,
- prestrašenost,
- glavoboli,
- driska,
- motnje koncentracije,
- bolečine v mišicah,
- krči v mišicah in prebavilih,
- pretiran strah, napetost, nemir, spremembe razpoloženja, zmedenost, razdražljivost,
- epileptični napadi, ki so lahko povezani z obstoječo boleznijo.

V hujših primerih se lahko pojavijo naslednji simptomi:

- motnje zaznavanja,
- občutek, da izgubljate stik z realnostjo (depersonalizacija),
- preobčutljivost za neznatno glasnost (hiperakuzija),
- otrplost,
- mravljinčenje v okončinah,
- preobčutljivost za svetlobo, hrup in fizični stik,
- zaznavanje stvari, ki jih v resnici ni (halucinacije).

V redkih primerih se lahko pojavijo tudi bledež in hudi krči.

→ Če se pri vas pojavijo simptomi odtegnitvenega sindroma, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Pomembni neželeni učinki, na katere bodite posebno pozorni:

Alergijske reakcije

→ Če se pri vas pojavijo simptomi alergijske reakcije, **nemudoma** poiščite zdravniško pomoč.

Simptomi lahko vključujejo:

- nenadno oteklost grla, obraza, ustnic in ust (zaradi tega je oteženo dihanje ter požiranje),
- nenadno oteklost dlani, stopal in gležnjev,
- kožne izpuščaje in srbenje.

Vpliv na vedenje

→ Če se pri vas pojavi katerikoli od naslednjih znakov, se **posvetujte z zdravnikom**, saj boste morda morali prenehati jemati zdravilo Rivotril. Večja verjetnost za pojav teh znakov je pri otrocih in starejših.

Med temi znaki so: nemir, razdražljivost, agresivnost, nervoza, sovražnost, tesnoba, motnje spanja, blodnje, jeza, nočne more, nenormalne sanje, halucinacije, psihoze, hiperaktivnost, neprimerno vedenje in druge oblike vedenjskih motenj.

Dojenčki in majhni otroci

→ Če zdravilo Rivotril uporabljamo pri dojenčkih ali majhnih otrocih, jih je treba pozorno opazovati. Zaradi povečanega tvorjenja slina lahko namreč pride do težav pri dihanju, kašljanja ali davljenja.

Ostali neželeni učinki:

Pogosti neželeni učinki (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov) **zlasti na začetku zdravljenja**, so: utrujenost, zaspanost, omotica, šibke ali ohlapne mišice, motena usklajenost mišičnih gibov, opotekanje pri hoji in upočasnjene reakcije.

→ **Če opazite kar koli od navedenega, se posvetujte z zdravnikom.**

Ti učinki so blažji in manj pogosti, če zdravljenje začnemo z nizkimi odmerki, ki jih postopoma povečujemo. V nadaljevanju zdravljenja navedeni neželeni učinki večinoma izginejo sami od sebe ali po zmanjšanju odmerka.

Naslednji neželeni učinki se lahko pojavijo kadarkoli med zdravljenjem z zdravilom Rivotril:

Neželeni učinki, ki se lahko pojavijo **pogosto** (pri največ 1 od 10 bolnikov):

- zmanjšana koncentracija,
- depresija (ki pa je lahko povezana tudi s prej obstoječo boleznijo),
- reverzibilne motnje (motnje govora, zmanjšana koordinacija gibov in motnja gibanja ter nehoteni ritmični gibi zrkla),
- motnje vida (dvojni vid, nehoteni ritmični gibi zrkla),
- oteženo dihanje.

Neželeni učinki, ki se lahko pojavijo **občasno** (pri največ 1 od 100 bolnikov):

- motnje čustvovanja in razpoloženja, zmedenost, dezorientiranost.

Neželeni učinki, ki se lahko pojavijo **redko** (pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- zmanjšano število trombocitov (krvnih ploščic),
- glavobol,
- anterogradna amnezija (časovno omejena spominska vrzel) in amnezija, ki je lahko povezana z neprimernim vedenjem,
- slabost, tiščanje v žlički,
- uhajanje urina,
- koprivnica, srbenje, kožni izpuščaji, prehodna izguba las, spremembe pigmentacije,
- spremembe libida, težave z erekcijo.

Neželeni učinki, ki se lahko pojavijo **zelo redko** (pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

- povečana pogostnost napadov pri nekaterih oblikah epilepsije.

Neželeni učinki, katerih **pogostnost ni znana** (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- srčno popuščanje, vključno s srčnim infarktom.

Pri bolnikih, ki jemljejo benzodiazepine (med katere sodi tudi zdravilo Rivotril), so poročali o primerih padcev in zlomov. Tveganje je povečano pri tistih, ki sočasno jemljejo sedative (kar vključuje tudi uživanje alkoholnih pijač), in pri starejših.

Glede pojava odvisnosti in odtegnitvenega sindroma glejte odstavek »Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Rivotril« v poglavju 2 in odstavek »Če ste prenehali jemati zdravilo Rivotril« v poglavju 3.

Dodatni neželeni učinki pri otrocih in mladostnikih

Zelo redko so poročali o primerih reverzibilnega prezgodnjega razvoja sekundarnih spolnih znakov pri otrocih (nepopolna prezgodnja puberteta).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks: +386 (0)8 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si
S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Rivotril

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Rivotril

- Učinkovina je klonazepam. Ena tableta zdravila Rivotril 0,5 mg vsebuje 0,5 mg klonazepama. Ena tableta zdravila Rivotril 2 mg vsebuje 2 mg klonazepama.
- Pomožne snovi v zdravilu Rivotril 0,5 mg tablete so koruzni škrob, laktoza monohidrat, predgelirani krompirjev škrob, smukec, magnezijev stearat (E 470b), rdeči in rumeni železov oksid (E 172). Pomožne snovi v zdravilu Rivotril 2 mg tablete so laktoza, predgelirani škrob, magnezijev stearat (E 470b), mikrokristalna celuloza.

Izgled zdravila Rivotril in vsebina pakiranja

Tablete Rivotril 0,5 mg so blede oranžne barve, okrogle in ploščate, z razdelilno zarezo na eni strani in vtisnjnim napisom 0,5 na drugi strani. Na voljo so v škatli s stekleničko po 50 tablet. Tableta Rivotril 0,5 mg se lahko deli na enaka odmerka.

Tablete Rivotril 2 mg so bele do svetlo rumenkaste barve, okrogle in ploščate, s križno razdelilno zarezo na eni strani in vtisnjnim napisom .2. na drugi strani. Na voljo so v škatli s stekleničko po 30 tablet. Tableta Rivotril 2 mg se lahko deli na dva ali štiri enake odmerke.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Rivotril

Rp – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Nemčija

Proizvajalec

Recipharm Leganés S.L.U.
Calle Severo Ochoa 13
Leganés
28914 Madrid
Španija

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 18. 1. 2022.