

Navodilo za uporabo

Telmisartan HCT Teva 80 mg/12,5 mg tablete **Telmisartan HCT Teva 80 mg/25 mg tablete**

telmisartan/hidroklorotiazid

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Telmisartan HCT Teva in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Telmisartan HCT Teva
3. Kako jemati zdravilo Telmisartan HCT Teva
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Telmisartan HCT Teva
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Telmisartan HCT Teva in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Telmisartan HCT Teva je kombinacija dveh zdravilnih učinkovin, telmisartana in hidroklorotiazida v eni tableti. Obe učinkovini pomagata uravnati visok krvni tlak.

- Telmisartan spada v skupino zdravil, ki jo imenujemo antagonisti receptorjev angiotenzina II. Angiotenzin II je snov, ki nastaja v telesu in povzroča, da se krvne žile zožijo, kar zviša krvni tlak. Telmisartan prepreči učinek angiotenzina II, žile se sprostijo in krvni tlak se zniža.
- Hidroklorotiazid je zdravilo iz skupine tiazidnih diuretikov. Poveča izločanje seča, kar znižuje krvni tlak.

Če visokega krvnega tlaka ne zdravimo, lahko poškoduje krvne žile v različnih organih. Posledice takšnih poškodb so lahko srčni napad, popuščanje srca ali odpoved ledvic, možganska kap ali slepota. Visok krvni tlak običajno ne povzroča simptomov, dokler se ne pojavijo okvare. Torej je treba krvni tlak redno meriti, da bi lahko preverili, ali je v normalnem območju.

Zdravilo Telmisartan HCT Teva 80 mg/12,5 mg je namenjeno zdravljenju visokega krvnega tlaka (esencialne hipertenzije) pri odraslih, pri katerih s samim telmisartanom krvnega tlaka ne moremo dovolj uravnati.

Zdravilo Telmisartan HCT Teva 80 mg/25 mg je namenjeno zdravljenju visokega krvnega tlaka (esencialne hipertenzije) pri odraslih, pri katerih krvnega tlaka ne moremo dovolj uravnati z zdravilom Telmisartan HCT Teva 80 mg/12,5 mg ali pri bolnikih, katerih krvni tlak je bil pred tem ustrezno stabiliziran z ločenim dajanjem telmisartana in hidroklorotiazida.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Telmisartan HCT Teva

Ne jemljite zdravila Telmisartan HCT Teva

- če ste alergični na telmisartan ali katero koli drugo sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če ste alergični na hidroklorotiazid ali katero koli drugo sulfonamidno zdravilo,

- če ste noseči več kot 3 mesece (zdravilo Telmisartan HCT Teva se je bolje izogibati tudi v zgodnji nosečnosti - glejte poglavje o nosečnosti),
- če imate hude težave z jetri, kot sta holestaza ali zapora žolčevoda (težave z odtekanjem žolča iz žolčnika), ali katero koli drugo hudo jetrno bolezen,
- če imate hudo ledvično bolezen,
- če vaš zdravnik odkrije, da imate nizko raven kalija ali visoko raven kalcija v krvi in da tega stanja zdravljenje ne izboljša,
- če imate sladkorno bolezen ali okvaro delovanja ledvic in se zdravite z zdravilom, ki vsebuje alskiren.

Če imate katero od naštetih stanj, povejte svojemu zdravniku ali farmacevtu, preden boste vzeli zdravilo Telmisartan HCT Teva.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Obvestite svojega zdravnika, če imate ali ste kdaj koli imeli katero koli od naslednjih bolezenskih stanj ali bolezni:

- nizek krvni tlak (hipotenzijo), ki se pojavi, če ste dehidrirani (prevelika izguba vode v telesu) ali imate pomanjkanje soli zaradi diuretičnega zdravljenja (tablet za odvajanje vode), dieto z majhno vsebnostjo soli, drisko, ste bruhal ali imeli hemodializo,
- ledvično bolezen ali presajeno ledvico,
- stenozo ledvične arterije (zožitev krvnih žil v eni ali obeh ledvicah),
- jetrno bolezen,
- težave s srcem,
- sladkorno bolezen,
- protin,
- zvišano raven aldosterona (zadrževanje vode in soli v telesu ter neravnovesje različnih mineralov v krvi),
- sistemski eritematozni lupus (poimenovan tudi "lupus" ali "SLE"), bolezen, pri kateri telesni imunski sistem napade telo,
- učinkovina hidroklorotiazid lahko povzroči neobičajno reakcijo, katere posledica sta poslabšan vid in bolečina v očesu. Oba sta lahko tudi simptoma zvišanja očesnega tlaka, ki se pojavita nekaj ur do nekaj tednov po začetku jemanja zdravila Telmisartan HCT Teva. Brez zdravljenja lahko pride do trajne izgube vida.

Pred začetkom jemanja zdravila Telmisartan HCT Teva se posvetujte z zdravnikom:

- če jemljete zdravilo, ki vsebuje alskiren in se uporablja za zdravljenje visokega krvnega tlaka,
- če jemljete digoksin.

Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali bi lahko zanosili). Uporaba zdravila Telmisartan HCT Teva ni priporočljiva v zgodnjem obdobju nosečnosti in ga ne smete jemati, če ste noseči več kot 3 mesece, ker lahko v tem obdobju resno škoduje vašemu otroku (glejte poglavje o nosečnosti).

Zdravljenje s hidroklorotiazidom lahko povzroči neravnovesje elektrolitov v telesu. Značilni simptomi neravnovesja tekočine ali elektrolitov so suha usta, šibkost, letargija, dremavost, nemir, mišična bolečina ali krči, slabost (siljenje na bruhanje), bruhanje, utrujene mišice in nenormalno hitro bitje srca (več kot 100 utripov na minuto). Če opazite kateri koli pojav od naštetih, obvestite svojega zdravnika.

Zdravnika prav tako obvestite, če se poveča občutljivost kože na sončne žarke in se znaki sončnih opeklin (rdečica, srbenje, oteklina, mehurji) pojavijo prej kot običajno.

Če boste operirani ali boste dobili anestetike, morate zdravniku povedati, da jemljete zdravilo Telmisartan HCT Teva.

Zdravilo Telmisartan HCT Teva lahko pri bolnikih črne rase manj učinkovito znižuje krvni tlak.

Otroci in mladostniki

Uporabe zdravila Telmisartan HCT Teva pri otrocih in mladostnikih do 18. leta ne priporočamo.

Druga zdravila in zdravilo Telmisartan HCT Teva

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo. Zdravnik bo morda moral spremeniti odmerek teh zdravil ali uvesti druge previdnostne ukrepe. V nekaterih primerih boste morda morali katero od teh zdravil prenehati jemati. To velja zlasti za spodaj naštetá zdravila, ki jih jemljete hkrati z zdravilom Telmisartan HCT Teva:

- zdravila z litijem za zdravljenje nekaterih oblik depresije,
- zdravila, ki jih povezujejo z znižanjem vrednosti kalija v krvi (hipokaliemijo), kot so drugi diuretiki (tablete za odvajanje vode), odvajala (npr. ricinusovo olje), kortikosteroidi (npr. prednizon), adrenokortikotropni hormon (ACTH), amfotericin (zdravilo proti glivicam), karbenoksolon (uporablja se za zdravljenje razjed v ustih), natrijev penicilin G (antibiotik) ter salicilna kislina in njeni derivati,
- diuretike, ki zadržujejo kalij, kalijeve nadomestke, nadomestke soli s kalijem, zaviralce ACE, ki lahko zvišajo krvno raven kalija,
- zdravila za srce (npr. digoksin) ali za uravnavanje srčnega utripa (npr. kinidin, dizopiramid),
- zdravila za zdravljenje duševnih motenj (npr. tioridazin, klorpromazin, levomepromazin),
- druga zdravila za zdravljenje visokega krvnega tlaka, steroide, protibolečinska zdravila, zdravila za zdravljenje raka, protina ali artritisa in nadomestke vitamina D,
- zdravilo, ki vsebuje alskiren in se uporablja za zdravljenje visokega krvnega tlaka,
- digoksin.

Zdravilo Telmisartan HCT Teva lahko poveča učinek drugih zdravil, ki znižujejo krvni tlak ali zdravil z možnim učinkom na znižanje krvnega tlaka (npr. baklofen, amifostin). Poleg tega lahko nizek krvni tlak dodatno znižajo alkohol, barbiturati, narkotiki ali antidepresivi. Ta učinek boste opazili kot omotico med vstajanjem. z zdravnikom se morate posvetovati, ali je treba med jemanjem zdravila Telmisartan HCT Teva tablete prilagoditi odmerek vašega drugega zdravila.

Učinek zdravila Telmisartan HCT Teva se lahko zmanjša, če jemljete NSAR (nesteroidne antirevmatike, npr. acetilsalicilno kislino ali ibuprofen).

Nosečnost in dojenje

Nosečnost

Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali bi lahko zanosili). Zdravnik vam bo praviloma svetoval, da zdravilo Telmisartan HCT Teva prenehate jemati, preden boste zanosili ali takoj, ko boste vedeli, da ste noseči, in vam svetoval, da namesto zdravila Telmisartan HCT Teva jemljete drugo zdravilo. Zdravila Telmisartan HCT Teva ni priporočljivo jemati med nosečnostjo; ne smete pa ga jemati, ko boste noseči več kot 3 mesece, ker lahko po tretjem mesecu nosečnosti resno škoduje vašemu otroku.

Dojenje

Povejte zdravniku, če dojite ali nameravate začeti dojiti. Zdravilo Telmisartan HCT Teva se ne priporoča doječim materam. Če boste želeli dojiti, bo zdravnik za vas izbral drugo zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Nekateri ljudje so med zdravljenjem z zdravilom Telmisartan HCT Teva omotični ali utrujeni. Če ste omotični ali utrujeni, ne vozite ali upravljajte strojev.

Zdravilo Telmisartan HCT Teva vsebuje mlečni sladkor (laktozo) in sorbitol.

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo zdravila Telmisartan HCT Teva posvetujte s svojim zdravnikom.

3. Kako jemati zdravilo Telmisartan HCT Teva

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Priporočeni odmerek zdravila Telmisartan HCT Teva je ena tableta na dan. Poskusite jemati tablete vsak dan ob isti uri. Zdravilo Telmisartan HCT Teva lahko jemljete s hrano ali brez nje. Tablete morate pogoltniti z nekaj vode ali brezalkoholne pijače. Zdravilo Telmisartan HCT Teva morate jemati vsak dan, dokler vam zdravnik ne naroči drugače.

Če vaša jetra ne delujejo kot bi morala, običajni odmerek ne sme preseči 40 mg/12,5 mg enkrat na dan.

Telmisartan HCT Teva 80 mg/12,5 mg tablete: Razdelilna zareza tablete je namenjena le delitvi tablete za lažje požiranje in ne delitvi na enaka odmerka.

Telmisartan HCT Teva 80 mg/25 mg tablete: Tableto je mogoče razdeliti na enaka odmerka.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Telmisartan HCT Teva, kot bi smeli

Če pomotoma vzamete preveč tablet, morate nemudoma obiskati svojega zdravnika, farmacevta ali oddelek za nujno pomoč v najbližji bolnišnici.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Telmisartan HCT Teva

Če pozabite vzeti odmerek zdravila, naj vas ne skrbi. Vzemite ga takoj, ko se spomnite, in z jemanjem nadaljujte kot običajno. Če tablete ves dan ne vzamete, vzemite naslednji dan običajni odmerek. *Ne* vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Nekateri neželeni učinki so lahko resni in zahtevajo takojšnjo zdravstveno oskrbo:

Nemudoma morate obiskati zdravnika, če se pojavi kateri od naslednjih simptomov:

sepsa* (pogosto poimenovana tudi »zastрупitev krvi«) je huda okužba, pri kateri pride v celem telesu do vnetega odziva, hitrega otekanja kože in sluznice (angioedem); ti neželeni učinki so redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov), toda zelo resni, zato morajo bolniki takoj prenehati z jemanjem zdravila in nemudoma poiskati zdravniško pomoč. Brez zdravljenja so ti učinki lahko usodni za bolnika. Kljub temu, da so povečano pojavnost sepse opazili pri samostojni uporabi telmisartana, je med jemanjem zdravila Telmisartan HCT Teva ni možno izključiti.

Možni neželeni učinki zdravila Telmisartan HCT Teva:

Pogosti neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):
omotica.

Občasni neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):
znižana raven kalija v krvi, tesnoba, omedlevica (sinkopa), ščemenje, mravljinčenje (parestezija), vrtoglavica, hiter srčni utrip (tahikardija), motnje srčnega ritma, nizek krvni tlak, nenadno znižanje krvnega tlaka med vstajanjem, zasoplost (dispneja), driska, suha usta, napenjanje, bolečina v hrbtu, mišični krč, bolečina v mišicah, erektilna disfunkcija (nezmožnost erekcije ali vzdrževanja erekcije), bolečina v prsnem košu, zvišana raven sečne kisline v krvi.

Redki neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):
vnetje pljuč (bronhitis), aktiviranje ali poslabšanje sistemskega eritematoznega lupusa (bolezni, pri kateri telo napade človekov lastni imunski sistem, kar povzroči bolečine v sklepih, kožni izpuščaji in vročino), boleče žrelo, vnetje sinusov, občutek žalosti (depresija), težave z uspavanjem (nespečnost),

motnje vida, težave z dihanjem, bolečina v trebuhu, zaprtje, napenjanje (dispepsija), slabost, vnetje želodca (gastritis), motnje delovanja jeter (pri japonskih bolnikih obstaja večja verjetnost pojavljanja teh neželenih učinkov), hitro otekanje kože in sluznice, ki lahko povzroči tudi smrt (angioedem tudi s smrtnim izidom), rdečica na koži (eritem), alergijske reakcije, na primer srbenje ali izpuščaj; povečano znojenje, koprivnica (urtikarija), bolečine v sklepih (artralgijska) in v okončinah, mišični krči, gripi podobna bolezen, bolečina, zvišana raven sečne kisline, nizka raven natrija, zvišane ravni kreatinina, jetrnih encimov ali kreatin-fosfokinaze v krvi.

Neželeni učinki, o katerih so poročali pri eni od posameznih sestavin, se lahko pojavijo tudi pri zdravlilu Telmisartan HCT Teva, četudi jih v kliničnem preskušanju tega zdravila niso zasledili.

Telmisartan

Pri bolnikih, ki so jemali samo telmisartan, so poročali še o naslednjih neželenih učinkih:

Občasni neželeni učinki (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

okužba zgornjih dihal (npr. boleče žrelo, vnetje sinusov, prehlad), okužbe sečil, pomanjkanje rdečih krvničk (anemija), visoka raven kalija, počasen srčni utrip (bradikardija), ledvična okvara, tudi akutna ledvična odpoved; oslabelost, kašelj.

Redki neželeni učinki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

sepsa* (pogosto poimenovana tudi »zastrupitev krvi« je huda okužba, pri kateri pride v vsem telesu do vnetnega odziva in je lahko usodna), majhno število trombocitov (trombocitopenija), povečanje števila nekaterih belih krvničk (eozinofilija), resne alergijske reakcije (npr. preobčutljivost, anafilaktična reakcija, medikamentni izpuščaj), nizka raven krvnega sladkorja (pri bolnikih s sladkorno boleznijo), želodčne težave, ekcem (kožna bolezen), artroza, vnetje kit, znižana raven hemoglobina (krvne beljakovine), zaspanost.

Zelo redki neželeni učinki (pojavi se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

progressivno brazgotinjenje pljučnega tkiva (intersticijska pljučna bolezen)**.

* Morebiti gre za naključje ali pa je pojav povezan z mehanizmom, ki še ni znan.

** Poročali so o primerih napredujočega brazgotinjenja pljučnega tkiva med jemanjem telmisartana, vendar ni znano ali je vzrok telmisartan.

Hidroklorotiazid

Pri bolnikih, ki so jemali samo hidroklorotiazid, so poročali še o naslednjih neželenih učinkih:

Neželeni učinki neznane pogostnosti (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

vnetje žleze slinavke, zmanjšanje števila krvnih celic, ki vključuje tudi majhno število rdečih in belih krvničk; nizko število trombocitov (trombocitopenija), resne alergijske reakcije (npr. preobčutljivost, anafilaktična reakcija), zmanjšan tek ali izguba teka, nemir, omotica, zamegljen vid ali rumenkasta obarvanost vida, poslabšan vid in bolečina v očeh (možna znaka akutnega glavkoma zaprtega zakotja), vnetje žil (nekrotizirajoči vaskulitis), vnetje trebušne slinavke, želodčne težave (razdražen želodec), porumenelost kože ali oči (zlatenica), lupusu podoben sindrom (bolezensko stanje, ki je podobno sistemskemu eritematoznemu lupusu, pri katerem telo napade človekov lastni imunski sistem), boleznii kože, kot so vnetje žil v koži; povečana občutljivost za sončno svetlobo ali nastajanje mehurjev in luščenje kožne povrhnjice (toksična epidermalna nekroliza), oslabelost, vnetje ledvic ali okvara delovanja ledvic, glukoza v urinu (glikozurija), zvišana telesna temperatura, moteno elektrolitsko ravnovesje, visoka raven holesterola v krvi, zmanjšan volumen krvi, zvišana raven glukoze ali maščob v krvi.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika

Center za zastrupitve
Zaloška cesta 2
SI-1000 Ljubljana
faks: + 386 (0)1 434 76 46
e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Telmisartan HCT Teva

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »EXP:«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Telmisartan HCT Teva

Telmisartan HCT Teva 80 mg/12,5 mg tablete

Zdravilni učinkovini sta telmisartan in hidroklorotiazid. Ena tableta vsebuje 80 mg telmisartana in 12,5 mg hidroklorotiazida.

Druge sestavine zdravila so: natrijev hidroksid, hipromeloza, sorbitol (E420), meglumin, manitol (E421), smukec, magnezijev stearat, laktoza monohidrat, hidroksipropilceluloza, rdeči železov oksid (E172).

Telmisartan HCT Teva 80 mg/25 mg tablete

Zdravilni učinkovini sta telmisartan in hidroklorotiazid. Ena tableta vsebuje 80 mg telmisartana in 25 mg hidroklorotiazida.

Druge sestavine zdravila so: natrijev hidroksid, hipromeloza, sorbitol (E420), meglumin, manitol (E421), smukec, magnezijev stearat, laktoza monohidrat, hidroksipropilceluloza, rumeni železov oksid (E172).

Izgled zdravila Telmisartan HCT Teva in vsebina pakiranja

Telmisartan HCT Teva 80 mg/12,5 mg tablete

Tablete so rdeče in bele do umazano bele dvoslojne tablete v obliki kapsule z razdelilno zarezo na rdeče obarvani strani (dimenzija: približno 16,5×8,0 mm).

Razdelilna zareza je namenjena le delitvi tablete za lažje požiranje in ne delitvi na dva enaka odmerka.

Telmisartan HCT Teva 80 mg/25 mg tablete

Tablete so rumene in bele do umazano bele dvoslojne tablete v obliki kapsule z razdelilno zarezo na rumeno obarvani strani (dimenzija: približno 18,0×8,0 mm).

Tableta se lahko deli na enaka odmerka.

Zdravilo Telmisartan HCT Teva je na voljo v pakiranjih po 7, 10, 14, 28, 28x1, 30, 30x1, 50x1, 56, 60, 84, 90, 90x1, 98, 100, 112, 120, 156 ali 300 tablet v pretisnih omotih.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila Telmisartan HCT Teva

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Teva Pharma B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nizozemska

Izdelovalci

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13,
4042 Debrecen
Madžarska

TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park,
Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG
Velika Britanija

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5,
2031 GA Haarlem
Nizozemska

Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravska 29, c.p. 305,
74770 Opava-Komarov
Češka

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80.
31-546 Krakow
Poljska

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 25,
99-300 Kutno
Poljska

TEVA PHARMA S.L.U.
C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica,
50016 Zaragoza
Španija

TEVA SANTE
Rue Bellocier,
89100 Sens
Francija

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Str. 3
89143 Blaubeuren
Nemčija

PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10000 Zagreb

Hrvaška

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Francija	Telmisartan - Hydrochlorothiazide Teva 80 mg/12,5 mg, comprimé Telmisartan - Hydrochlorothiazide Teva 80 mg/25 mg, comprimé
Avstrija	Telmisartan/HCT ratiopharm 80 mg/12,5 mg Tabletten Telmisartan/HCT ratiopharm 80 mg/25 mg Tabletten
Belgija	Telmisartan/HCTZ Teva 80mg/12,5mg tabletten Telmisartan/HCTZ Teva 80mg/25mg tabletten
Bolgarija	Telmisartan/Hydrochlorothiazide Teva 80 mg/12,5 mg tablets Telmisartan/Hydrochlorothiazide Teva 80 mg/25 mg tablets
Ciper	Telmisartan/HCTZ Teva 80 mg/12,5 mg δισκία Telmisartan/HCTZ Teva 80 mg/25 mg δισκία
Češka	Telmisartan/Hydrochlorothiazid ratiopharm 80 mg/12,5 mg Telmisartan/Hydrochlorothiazid ratiopharm 80 mg/25 mg
Nemčija	Telmisartan comp. ratiopharm 80 mg/12,5 mg Tabletten Telmisartan comp. ratiopharm 80 mg/25 mg Tabletten
Estonija	Telmisartan/Hydrochlorothiazide Teva
Grčija	Telmisartan/HCTZ Teva 80 mg/12,5 mg δισκία Telmisartan/HCTZ Teva 80 mg/25 mg δισκία
Španija	Telmisartan/Hidroclorotiazida ratiopharm 80 mg /12,5 mg comprimidos EFG Telmisartan/Hidroclorotiazida ratiopharm 80 mg /25 mg comprimidos EFG
Finska	Sanluper 80 mg/12,5 mg tabletti Sanluper 80 mg/25 mg tabletti
Madžarska	Telmisartan/HCT-ratiopharm 80 mg/12,5 mg tableta Telmisartan/HCT-ratiopharm 80 mg/25 mg tableta
Irska	Telmisartan - Hydrochlorothiazide Teva 80 mg/12.5 mg Tablets Telmisartan - Hydrochlorothiazide Teva 80 mg/25 mg Tablets
Italija	Telmisartan e Idroclorotiazide Teva Telmisartan e Idroclorotiazide Teva
Litva	Telmisartan/ Hydrochlorothiazide Teva 80mg/12,5mg tabletės Telmisartan/ Hydrochlorothiazide Teva 80mg/25mg tabletės
Luksemburg	Telmisartan/HCTZ ratiopharm 80 mg/12,5 mg Telmisartan/HCTZ ratiopharm 80 mg/25 mg
Latvija	Telmisartan/ Hydrochlorothiazide Teva 80mg/12,5mg tabletes Telmisartan/ Hydrochlorothiazide Teva 80mg/25mg tabletes
Nizozemska	Telmisartan/HCT 80/12,5 mg Teva, tabletten Telmisartan/HCT 80/25 mg Teva, tabletten
Norveška	Telmisartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm
Poljska	Telmisartan HCT Teva
Portugalska	Telmisartan + Hidroclorotiazida remfep
Romunija	Telmisartan/Hidroclorotiazidă Teva 80 mg/12,5 mg comprimate Telmisartan/Hidroclorotiazidă Teva 80 mg/25 mg comprimate
Slovenija	Telmisartan HCT Teva 80 mg/12,5 mg tablete Telmisartan HCT Teva 80 mg/25 mg tablete
Slovaška	Telmisartan Hydrochlorotiazid Teva 80/12,5 mg Telmisartan Hydrochlorotiazid Teva 80/25 mg
Združeno kraljestvo	Telmisartan/Hydrochlorothiazide 80 mg/12.5 mg tablets Telmisartan/Hydrochlorothiazide 80 mg/25 mg tablets

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 27. 07. 2015.