

Navodilo za uporabo

Glimepirid Lek 1 mg tablete
Glimepirid Lek 2 mg tablete
Glimepirid Lek 4 mg tablete

glimepirid

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Glimepirid Lek in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Glimepirid Lek
3. Kako jemati zdravilo Glimepirid Lek
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Glimepirid Lek
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Glimepirid Lek in za kaj ga uporabljamo

Glimepirid Lek je zdravilo za zmanjševanje ravni krvnega sladkorja (peroralno antidiabetično zdravilo). Spada v skupino zdravil za zniževanje krvnega sladkorja, imenovanih sulfonilsečnine. Zdravilo Glimepirid Lek deluje tako, da poveča količino izločanja insulina iz trebušne slinavke. Insulin nato zniža koncentracijo sladkorja v krvi.

Za kaj uporabljamo zdravilo Glimepirid Lek

- Zdravilo Glimepirid Lek se uporablja za zdravljenje posebne vrste sladkorne bolezni (tip 2) v primerih, ko dieta, telesna dejavnost in znižanje telesne teže ne zadoščajo.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Glimepirid Lek

Ne jemljite zdravila Glimepirid Lek in povejte zdravniku če

- ste alergični na glimepirid ali druge sulfonilsečnine (zdravila za zniževanje ravni krvnega sladkorja, kot je glibenklamid) ali sulfonamide (zdravila za zdravljenje bakterijskih okužb, kot je sulfametoksazol) ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- imate sladkorno bolezen tipa 1,
- imate diabetično ketoacidozo (zaplet pri sladkorni bolezni, pri kateri je povečana raven kislin v vašem telesu in se pri vas lahko pojavijo naslednji znaki: utrujenost, občutek slabosti (slabost), pogosto uriniranje in mišična togost),
- v primeru diabetične kome,
- imate hudo bolezen ledvic,
- imate hude bolezni jeter.

Če kar koli od naštetega velja za vas, ne jemljite tega zdravila. Če niste prepričani, se pred uporabo zdravila Glimepirid Lek posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Glimepirid Lek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, če:

- okrevate po poškodbi, operaciji, okužbi s povišano telesno temperaturo ali drugih oblikah stresa. O teh stanjih obvestite zdravnika, ker bo morda potrebno začasno spremeniti zdravljenje.
- imate hude nepravilnosti v delovanju jeter ali ledvic.

Če ste negotovi, da kaj od tega velja za vas, se preden vzamete zdravilo Glimepirid Lek posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Znižanje ravni hemoglobina in razpad rdečih krvnih celic (hemolitična anemija) se lahko pojavita pri bolnikih s pomanjkanjem encima glukoza-6-fosfat-dehidrogenaza.

Podatki za uporabo zdravila Glimepirid Lek pri ljudeh mlajših od 18 let so omejeni. Zato uporaba pri teh bolnikih ni priporočljiva.

Pomembne informacije o hipoglikemiji (nizek krvni sladkor)

Pri uporabi zdravila Glimepirid Lek lahko nastopi hipoglikemija (nizek krvni sladkor). Za dodatne informacije o hipoglikemiji, njenih znakih in zdravljenju preberite sledeče informacije.

Dejavniki, ki lahko povečajo možnost za pojav hipoglikemije pri vas so:

- podhranjenost, neredna prehrana, izpuščeni ali zakasneli obroki ali post;
- sprememba diete;
- prekomerno odmerjanje zdravila Glimepirid Lek;
- zmanjšano delovanje ledvic;
- huda jetrna bolezen;
- če imate nekatere hormonske motnje (npr. motnje v delovanju ščitnice, hipofize ali skorje nadledvične žleze);
- pitje alkohola (še posebno, če izpuščate obroke hrane);
- jemanje nekaterih drugih zdravil (glejte spodaj »Druga zdravila in zdravilo Glimepirid Lek«);
- če povečate telesno dejavnost in ne jeste dovolj ali če jeste hrano, ki vsebuje manj ogljikovih hidratov kot normalno.

Znaki hipoglikemije vključujejo:

- Hudo lakoto, glavobol, slabost, bruhanje, utrujenost, zaspanost, motnje spanja, nemir, razdražljivost, slabšo sposobnost koncentracije, zmanjšano budnost in slabšo odzivnost, depresijo, zmedenost, motnje govora in vida, nejasno govorjenje, tresenje, delno paralizo, motnje čutnega zaznavanja, omotičnost in občutek nemoči.
- Pojavijo se lahko tudi naslednji znaki: znojenje, lepljiva koža, tesnoba, pospešen srčni utrip, povišan krvni tlak, palpitacije, nenadna huda bolečina v prsnem košu, ki se lahko širi v sosednje predele (angina pectoris in srčne aritmije).

Če koncentracija krvnega sladkorja še naprej pada, lahko postanete zelo zmedeni (delirij), razvijejo se krči, izgubite samonadzor, dihanje je lahko plitvo in bitje srca se upočasni, lahko tudi izgubite zavest. Klinična slika zelo znižane koncentracije krvnega sladkorja je podobna kapi.

Zdravljenje hipoglikemije

V večini primerov znaki znižane ravni krvnega sladkorja zelo hitro izginejo, ko zaužijete katero od oblik sladkorja, npr. kocko sladkorja, sladek sok, sladkan čaj. Zato morate imeti vedno pri sebi nekaj sladkega (npr. kocko sladkorja). Ne pozabite, da umetna sladila ne učinkujejo. Če tudi po zaužitju sladkorja ne pride do izboljšanja, oziroma se simptomi ponovijo, takoj pokličite zdravnika ali pojdite v najbližjo bolnišnico.

Laboratorijski testi

Koncentracijo sladkorja v vaši krvi ali urinu je treba redno preverjati. Zdravnik bo morda opravil tudi preiskave krvi, da bo preveril število krvnih celic in delovanje jeter.

Otroci in mladostniki

Uporaba zdravila Glimepirid Lek ni priporočljiva pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let.

Druga zdravila in zdravilo Glimepirid Lek

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Zdravnik bo lahko želel spremeniti vaš odmerek zdravila Glimepirid Lek, če jemljete druga zdravila, ki lahko zmanjšajo ali povečajo učinek zdravila Glimepirid Lek na koncentracijo sladkorja v vaši krvi.

Naslednja zdravila lahko povečajo učinek zdravila Glimepirid Lek in povzročijo znake nizkega krvnega sladkorja (hipoglikemije):

- druga zdravila za zdravljenje **sladkorne bolezni** (kot sta insulin ali metformin);
- zdravila za **lajšanje bolečin in vnetja** (fenilbutazon, azapropazon, oksifenbutazon, acetilsalicilna kislina);
- zdravila za zdravljenje **okužb sečil** (kot so nekateri dolgo delujoči sulfonamidi);
- zdravila za zdravljenje **okužb z bakterijami in glivicami** (tetraciklini, kloramfenikol, flukonazol, mikonazol, kinoloni, klaritromicin);
- zdravila za **preprečevanje strjevanja krvi** (kumarinski derivati, kot je varfarin)
- zdravila, ki **pospešujejo rast mišic** (anaboliki);
- zdravila, ki se uporabljajo za **hormonsko nadomestno zdravljenje** pri moških
- zdravila za zdravljenje **depresije** (fluoksetin, zaviralci MAO);
- zdravila za zniževanje **visokih koncentracij holesterola** (fibrati);
- zdravila za zniževanje **visokega krvnega tlaka** (zaviralci ACE);
- zdravila, ki jih imenujemo antiaritmiki in se uporabljajo za nadzorovanje **nenormalnega srčnega utripa** (dizopiramid);
- zdravila za zdravljenje **protina** (alopurinol, probenecid, sulfinpirazon);
- zdravila za zdravljenje **raka** (ciklofosamid, ifosfamid, trofosfamid);
- zdravila, ki se uporabljajo za **zmanjševanje telesne mase** (fenfluramin);
- zdravila za **povečanje obtoka**, če se uporabljajo v velikem odmerku z intravensko infuzijo (pentoksifilin);
- zdravila za zdravljenje **alergijskega nahoda**, kot je seneni nahod (tritokvalin);
- zdravila, ki se imenujejo **simpatikolitiki** in se uporabljajo za zdravljenje visokega krvnega tlaka, srčnega popuščanja ali za zdravljenje simptomov povečane prostate.

Naslednja zdravila lahko zmanjšajo učinek zdravila Glimepirid Lek in povzročijo znake visokega krvnega sladkorja (hiperglikemije):

- zdravila, ki vsebujejo **ženske spolne hormone** (estrogeni in progestageni);
- zdravila, ki spodbujajo **nastajanje urina** (tiazidni diuretiki);
- zdravila, ki se uporabljajo za **spodbujanje ščitnice** (kot je levotiroksin);
- zdravila za zdravljenje **alergij in vnetja** (glukokortikoidi);
- zdravila za zdravljenje **hudih duševnih motenj** (klorpromazin in drugi derivati fenotiazina);

- zdravila, ki se uporabljajo za pospešitev **bitja srca**, za zdravljenje **astme** ali zamašenega nosu, **kašlja** in **prehladov**, **zmanjševanje telesne mase** ali ki se uporabljajo v smrtno nevarnih stanjih (adrenalin in simpatikomimetiki);
- zdravila za zdravljenje **visokih koncentracij holesterola** (nikotinska kislina);
- zdravila za zdravljenje **zaprtja**, če se uporabljajo daljši čas (odvajala);
- zdravila za zdravljenje **krčev** (fenitoin);
- zdravila za zdravljenje **živčnosti** in **problemov s spanjem** (barbiturati);
- zdravila za zdravljenje **povečanega tlaka v očesu** (acetazolamid);
- zdravila za zdravljenje **visokega krvnega tlaka** ali nizkega krvnega sladkorja (diazoksid);
- zdravila za zdravljenje **okužb, tuberkuloze** (rifampicin);
- zdravila za zdravljenje zelo nizkih koncentracij krvnega sladkorja (glukagon).

Naslednja zdravila lahko povečajo ali zmanjšajo učinek zdravila Glimepirid Lek na znižanje krvnega sladkorja:

- zdravila za zdravljenje **razjed v želodcu** (antagonisti H2 receptorjev);
- zdravila za zdravljenje **visokega krvnega tlaka** ali **srčnega popuščanja**, kot so zaviralci adrenergičnih receptorjev beta, klonidin, guanetidin in reserpin. Ta zdravila lahko prikrijejo znake hipoglikemije, zato morate biti ob jemanju teh zdravil še posebej pozorni.

Zdravilo Glimepirid Lek lahko poveča ali zmanjša učinke naslednjih zdravil:

- zdravila proti **strjevanju krvi** (kumarinski derivati, kot je varfarin).

Holesevelam, zdravilo, ki znižuje raven holesterola, ima učinek na absorpcijo zdravila Glimepirid Lek. V izogib temu učinku morate vzeti zdravilo Glimepirid Lek vsaj 4 ure pred zaužitjem holesevelama.

Zdravilo Glimepirid Lek skupaj z alkoholom

Uživanje alkohola lahko na nepredvidljiv način poveča ali zmanjša učinke zdravila Glimepirid Lek na znižanje krvnega sladkorja.

Nosečnost in dojenje

Nosečnost

Med nosečnostjo ne smete jemati zdravila Glimepirid Lek.

Dojenje

Zdravilo Glimepirid Lek lahko prehaja v materino mleko. Če dojite, ne jemljite zdravila Glimepirid Lek.

Če ste noseči ali dojite, menite da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Vaša sposobnost koncentracije ali reagiranja se vam lahko poslabša, če se vaš krvni sladkor zniža (hipoglikemija) ali zviša (hiperglikemija) ali če se vam kot posledica teh stanj razvijejo težave z vidom. Upoštevajte, da lahko ogrožate sebe in druge (npr. med vožnjo z motornim vozilom ali upravljanjem stroja). Posvetujte se z zdravnikom, ali lahko vozite avto, če:

- imate pogoste epizode hipoglikemije,
- imate zakrite ali odsotne znake hipoglikemije.

Zdravilo Glimepirid Lek vsebuje laktozo in natrij.

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom.

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na tableto, kar v bistvu pomeni »brez natrija«.

3. Kako jemati zdravilo Glimepirid Lek

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Jemanje tega zdravila

- Zdravilo zaužijte tik pred ali s prvim glavnim obrokom (ponavadi zajtrk). Če ne zajtrkujete, morate zdravilo vzeti po programu, ki vam ga je predpisal zdravnik. Pomembno je, da med zdravljenjem z zdravilom Glimepirid Lek ne izpuščate obrokov.
- Tableta se lahko deli na enake odmerke. Tablete pogoltnite z najmanj polovico kozarca vode. Tablet ne smete drobiti ali žvečiti.

Koliko zdravila morate vzeti

Odmerek določi zdravnik glede na vašo potrebo, stanje in raven sladkorja v krvi in urinu. Ne vzemite več tablet, kot vam jih predpiše zdravnik.

- Običajni začetni odmerek je 1 mg zdravila Glimepirid Lek na dan.
- Če je potrebno, lahko zdravnik zveča odmerek po vsakem 1 – 2 tednih zdravljenja.
- Najvišji priporočeni odmerek je 6 mg zdravila Glimepirid Lek na dan.
- Mogoče je uvesti kombinirano terapijo glimepirida z metforminom ali glimepirida z insulinom. V takšnem primeru bo zdravnik individualno določil primerne odmerke glimepirida, metformina ali insulina za vas.
- Če se spremeni vaša telesna masa ali če spremenite vaše življenjske navade ali če ste pod stresom, bo morda potrebno spremeniti odmerke zdravila Glimepirid Lek, zato o tem obvestite zdravnika.
- Če čutite, da je učinek zdravila prešibek ali premočen, sami ne spreminjajte odmerka, ampak se posvetujte z zdravnikom.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Glimepirid Lek, kot bi smeli

Če se vam zgodi, da ste vzeli prevelik ali dodaten odmerek zdravila Glimepirid Lek, obstaja nevarnost, da pride do hipoglikemije (za znake hipoglikemije glejte poglavje 2), zato morate takoj vzeti dovolj sladkorja (npr. nekaj kock sladkorja, sladek sok, sladkan čaj) in takoj poklicati zdravnika. Če zaradi nenamernega zaužitja zdravila hipoglikemijo pri otrocih, moramo biti zelo pozorni na količino danega sladkorja, da se izognemo možnosti nastanka nevarne hiperglikemije. Osebam, ki so v nezavesti, ne smemo dajati hrane ali pijače.

Ker lahko stanje hipoglikemije traja nekaj časa, je zelo pomembno, da se bolnikovo stanje skrbno nadzoruje, dokler nevarnost ne mine. Morda je potrebno kot previdnostni ukrep tudi bolnišnično zdravljenje. Zdravniku pokažite ovojnino ali tablete, ki so vam ostale, tako da bo zdravnik vedel, kaj ste vzeli.

Huda hipoglikemija, ki jo spremljajo izguba zavesti in hude nevrološke okvare, velja za nujno medicinsko stanje, ki zahteva takojšnje zdravljenje in sprejem v bolnišnico. Pomembno je, da predhodno o vašem stanju obvestite koga od svojcev ali prijateljev, da bo v nujnem primeru lahko poklical zdravnika ali reševalce.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Glimepirid Lek

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če ste prenehali jemati zdravilo Glimepirid Lek

Če prekinete ali prenehate zdravljenje z glimepiridom, se morate zavedati, da želeni učinek zniževanja krvnega sladkorja ni bil dosežen ali da se bo bolezen ponovno poslabšala. Jemljite zdravilo Glimepirid Lek dokler vam zdravnik ne reče, da prenehate.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi tega zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Takoj obvestite zdravnika če se vam pojavi kateri od spodaj navedenih simptomov:

- Alergijske reakcije (ki vključujejo vnetje krvnih žil, pogosto s kožnimi izpuščaji), ki se lahko razvijejo v hude reakcije z težavami pri dihanju, padcem krvnega tlaka in včasih razvojem v šok.
- Nepravilno delovanje jeter, vključno s porumenelostjo kože in oči (zlatenica), težavami z žolčevodom (holestaza), vnetjem jeter (hepatitis) ali odpovedjo jeter.
- Alergija (preobčutljivost) kože, ki se kaže kot srbenje, izpuščaji, koprivnica in povečana občutljivost na sonce. Nekatero blage alergijske reakcije se lahko razvijejo v hude reakcije.
- Huda hipoglikemija, ki vključuje izgubo zavesti, krče ali komo.

Pri nekaterih bolnikih so se med jemanjem glimepirida pojavili naslednji neželeni učinki:

Redki neželeni učinki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- Nižji krvni sladkor kot normalno (hipoglikemija) (glejte poglavje 2).
- Zmanjšanje števila krvnih celic:
 - Krvnih ploščic (kar poveča tveganje za krvavitev ali modrice);
 - Belih krvnih celic (kar poveča verjetnost za okužbe);
 - Rdečih krvnih celic (kar lahko povzroči bledo kožo, oslabljenost ali zasoplost).

Po prenehanju jemanja zdravila Glimepirid Lek se te težave na splošno izboljšajo.

- Spremembe v zaznavanju okusa.
- Izpadanje las.
- Povečanje telesne mase.

Zelo redki neželeni učinki (pojavi se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

- Alergijske reakcije (ki vključujejo vnetje krvnih žil, pogosto s kožnimi izpuščaji), ki se lahko razvijejo v hude reakcije s težavami pri dihanju, padcem krvnega tlaka in včasih razvojem v šok. Če se pri vas pojavi kateri koli od teh simptomov, **takoj obvestite zdravnika**.
- Nepravilno delovanje jeter, vključno s porumenelostjo kože in oči (zlatenica), težavami z žolčevodom (holestaza), vnetjem jeter (hepatitis) ali odpovedjo jeter. Če se pri vas pojavi kateri koli od teh simptomov, **takoj obvestite zdravnika**.
- Slabost ali občutek slabosti, driska, občutek polnosti ali napihnjenosti in bolečina v trebuhu.
- Znižanje koncentracije natrija v krvi (vidno iz krvnih preiskav).

Neznana pogostnost (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov)

- Pojavi se lahko alergija (preobčutljivost) kože, ki se kaže kot srbenje, izpuščaji, koprivnica in povečana občutljivost na sonce. Nekatero blage alergijske reakcije se lahko razvijejo v hude reakcije s težavami pri požiranju ali dihanju, otekanjem ustnic, grla ali jezika. Zato, če se pri vas pojavi kateri koli od teh dogodkov, **takoj obvestite zdravnika**.
- Pojavijo se lahko alergijske reakcije na sulfonilsečnine, sulfonamide ali sorodne učinkovine.
- Zaradi spremembe v koncentraciji krvnega sladkorja, se vam na začetku zdravljenja z zdravilom Glimepirid Lek lahko pojavijo težave z vidom, ki pa se hitro izboljšajo.

- Povišanje koncentracije jetrnih encimov.
- Močna nenavadna krvavitev ali modrice pod kožo.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Glimepirid Lek

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na pretisnem omotu, vsebniku in škatli poleg oznake »EXP:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Glimepirid Lek

Učinkovina je glimepirid.

Ena tableta vsebuje 1 mg glimepirida.

Ena tableta vsebuje 2 mg glimepirida.

Ena tableta vsebuje 4 mg glimepirida.

– 1 mg tablete:

Pomožne snovi so laktoza monohidrat, natrijev karboksimetilškrob (vrsta A), povidon K30, rdeči železov oksid (E172), mikrokristalna celuloza, magnezijev stearat.

– 2 mg tablete:

Pomožne snovi so laktoza monohidrat, natrijev karboksimetilškrob (vrsta A), povidon K30, rumeni železov oksid (E172), indigotin (E132), mikrokristalna celuloza, magnezijev stearat.

– 4 mg tablete:

Pomožne snovi so laktoza monohidrat, natrijev karboksimetilškrob (vrsta A), povidon K30, indigotin (E132), mikrokristalna celuloza, magnezijev stearat.

Izgled zdravila Glimepirid Lek in vsebina pakiranja

– 1 mg tablete:

Rožnate, rahlo melirane, podolgovate, ploščate tablete s posnetim robom, z zarezo na obeh straneh; z napisom »G1« na eni strani.

– 2 mg tablete:

Zelene, rahlo melirane, podolgovate, ploščate tablete s posnetim robom, z zarezo na obeh straneh; z napisom »G2« na eni strani.

– 4 mg tablete:

Modre, rahlo melirane, podolgovate, ploščate tablete s posnetim robom, z zarezo na obeh straneh; z napisom »G4« na eni strani.

Tablete so pakirane v PVC/PE/PVDC/Al pretisne omote, ki so vstavljeni v škatlo, ali so pakirane v PP vsebnik za tablete z LDPE ali MDPE zaporko, ki je vstavljen v škatlo.

Velikosti pakiranj:

Pretisni omot: 7, 14, 15, 20 (za jakosti 2 mg in 4 mg), 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 120 tablet in 100x1 tableta.

Vsebnik: 100 in 250 tablet.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Glimepirid Lek

Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

Proizvajalci:

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Nemčija
Lek S.A., Ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, Poljska
Lek S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varšava, Poljska

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Avstrija	Glimepirid Sandoz 1 mg – Tabletten Glimepirid Sandoz 2 mg – Tabletten Glimepirid Sandoz 3 mg – Tabletten
Republika Češka	Glimepirid Sandoz
Danska	Glimepirid "Sandoz"
Finska	Glimepirid Sandoz 1mg tabletti Glimepirid Sandoz 2mg tabletti Glimepirid Sandoz 3mg tabletti Glimepirid Sandoz 4mg tabletti
Slovenija	Glimepirid Lek 1 mg tablete Glimepirid Lek 2 mg tablete Glimepirid Lek 4 mg tablete
Slovaška	Glimepirid Sandoz 1 mg Glimepirid Sandoz 2 mg Glimepirid Sandoz 3 mg Glimepirid Sandoz 4 mg

Španija Glimepirida Sandoz 2 mg comprimidos EFG
 Glimepirida Sandoz 4 mg comprimidos EFG

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 10.01.2020.