

Navodilo za uporabo

Docile 1000 i.e. trde kapsule

Docile 2000 i.e. trde kapsule

Docile 6000 i.e. trde kapsule

holekalciferol (vitamin D₃)

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Docile in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Docile
3. Kako jemati zdravilo Docile
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Docile
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Docile in za kaj ga uporabljamo

Učinkovina zdravila Docile je holekalciferol, ki je znan tudi kot vitamin D₃. Vitamin D₃ lahko najdemo v nekaterih živilih, pod vplivom izpostavljenosti kože sončni svetlobi pa nastaja tudi v telesu. Vitamin D₃ pomaga ledvicam in črevesu pri absorpciji kalcija in pomaga pri izgradnji kosti.

Zdravilo Docile uporabljamo za preprečevanje in zdravljenje pomanjkanja vitamina D₃ pri odraslih in mladostnikih (starih od 12 do 18 let).

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Docile

Ne jemljite zdravila Docile:

- če ste alergični na vitamin D₃ ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6);
- če imate visoke ravni kalcija v krvi ali urinu;
- če imate ledvične kamne ali depozite kalcija v ledvicah;
- če imate hudo okvaro delovanja ledvic;
- če imate visoko raven vitamina D₃ v krvi (hipervitaminoza D).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Docile se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom:

- če se zdravite z nekaterimi zdravili, ki se uporabljajo za zdravljenje bolezni srca (npr. srčni glikozidi, kot je digoksin),
- če imate sarkoidozo (bolezen imunskega sistema, ki lahko povzroči zvišanje ravni vitamina D₃ v telesu),
- če se zdravite z diuretiki (npr. diuretiki tiazidnega tipa),
- če jemljete zdravila, ki vsebujejo vitamin D₃, ali uživate mleko ali druga živila, obogatena z vitaminom D₃,
- če obstaja verjetnost, da boste med jemanjem zdravila Docile veliko izpostavljeni soncu,

- če jemljete prehranska dopolnila s kalcijem. Zdravnik bo spremljal raven kalcija v krvi in tako zagotovil, da le-ta med jemanjem zdravila Docile ne bo previsoka,
- če imate težave z ledvicami ali bolezen ledvic ali ste nagnjeni k nastanku ledvičnih kamnov. Zdravnik bo morda moral določiti ravni kalcija v krvi ali urinu,
- če daljše časovno obdobje jemljete vitamin D₃ v dnevnem odmerku, ki presega 1000 i.e. V tem primeru mora zdravnik z laboratorijskimi preiskavami spremljati raven kalcija v krvi,
- če imate visoko raven fosfatov v krvi. V tem primeru je potrebna previdnost pri jemanju vitamina D₃, saj obstaja tveganje za poapnenje tkiv. Zdravnik bo z laboratorijskimi preiskavami morda moral spremljati raven fosfatov.

Otroci in mladostniki

Zdravilo Docile se uporablja pri mladostnikih, starih od 12 do 18 let. Pri otrocih, mlajših od 12 let, in bolnikih, ki imajo težave s požiranjem, bo morda primernejša uporaba vitamina D₃ v obliki kapljic.

Druga zdravila in zdravilo Docile

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo. To je še posebej pomembno, če jemljete:

- zdravila, ki delujejo na srce ali ledvice, kot so srčni glikozidi (npr. digoksin) ali diuretiki (npr. tiazidi). Če se ta zdravila uporablja sočasno z vitaminom D₃, lahko pride do močnega zvišanja ravni kalcija v krvi in urinu;
- aktinomicin (zdravilo za zdravljenje nekaterih oblik raka) in antimikotike iz skupine derivatov imidazola (npr. klotrimazol in ketokonazol, zdravili za zdravljenje glivičnih bolezni). Ta zdravila lahko vplivajo na proces presnove vitamina D₃ v telesu;
- naslednja zdravila, ki lahko vplivajo na učinek ali absorpcijo vitamina D₃:
 - antiepileptiki (zdravila za zdravljenje in preprečevanje krčev), npr. barbiturati;
 - glukokortikoidi (steroidni hormoni, kot sta hidrokortizon ali prednizolon);
 - zdravila, ki znižujejo raven holesterola v krvi (kot staolestiramin aliolestipol);
 - nekatera zdravila za zmanjševanje prekomerne telesne mase, ki zmanjšujejo količino maščob, ki jih telo absorbira (npr. orlistat);
 - nekatera odvajala (kot je tekoči parafin);
- aluminijev hidroksid. Pri sočasni uporabi aluminijevega hidroksida in vitamina D₃ se lahko zviša raven aluminija v serumu.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ta formulacija se po nasvetu zdravnika lahko uporablja med nosečnostjo in dojenjem.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Docile nima znanega vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

3. Kako jemati zdravilo Docile

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Za peroralno uporabo. Kapsulo pogoltnite celo (npr. skupaj z vodo). Kapsule ne smete žvečiti. Zdravilo Docile po možnosti vzemite skupaj z obrokom, kar pomaga pri absorpciji vitamina D₃ v telo.

Docile 1000 i.e. trde kapsule

Priporočeni odmerek **za odrasle** je:

Za preprečevanje **1 kapsula na dan ali vsak drugi dan.**

Za zdravljenje **1–4 kapsule na dan**, do 3 mesece.

Docile 2000 i.e. trde kapsule

***Za preprečevanje* 1 kapsula vsak drugi dan.**

Za zdravljenje 1–2 kapsuli na dan, do 3 mesece.

Docile 6000 i.e. trde kapsule

Za preprečevanje 1 kapsula na teden.

Za zdravljenje 1 kapsula vsak drugi dan, do 3 mesece.

Temu začetnemu zdravljenju lahko sledi vzdrževalno zdravljenje po navodilih zdravnika.

V primeru hudega pomanjkanja vitamina D₃ je odmerek odvisen od ravni vitamina D₃ in odziva na zdravljenje. Zdravnik bo temu ustrezno prilagodil odmerek.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Uporaba zdravila Docile pri otrocih, mlajših od 12 let, ni priporočljiva.

Docile 1000 i.e. trde kapsule

Priporočeni odmerek **za mladostnike** (stare od 12 do 18 let) je:

Za preprečevanje 1 kapsula na dan ali vsak drugi dan.

Za zdravljenje 1–2 kapsuli na dan, do 3 mesece.

Docile 2000 i.e. trde kapsule

Priporočeni odmerek **za mladostnike** (stare od 12 do 18 let) je:

Za preprečevanje 1 kapsula vsak drugi dan.

Za zdravljenje 1 kapsula na dan ali vsak drugi dan, do 3 mesece.

Docile 6000 i.e. trde kapsule

Priporočeni odmerek **za mladostnike** (stare od 12 do 18 let) je:

Za preprečevanje 1 kapsula na teden.

Za zdravljenje 2 kapsuli v ločenih odmerjanjih v obdobju enega tedna, do 3 mesece.

Temu začetnemu zdravljenju lahko sledi vzdrževalno zdravljenje po navodilih zdravnika.

Zdravnik/zdravnik vašega otroka bo temu ustrezno prilagodil odmerek/odmerek za otroka.

Nosečnost in dojenje

Docile 1000 i.e. trde kapsule

Za preprečevanje 1 kapsula na dan ali vsak drugi dan.

Za zdravljenje 2 kapsuli na dan.

Zdravnik bo mogoče prilagodil odmerek.

Docile 2000 i.e. trde kapsule

Za preprečevanje 1 kapsula vsak drugi dan.

Za zdravljenje 1 kapsula na dan.

Zdravnik bo mogoče prilagodil odmerek.

Docile 6000 i.e. trde kapsule

Uporaba zdravila Docile med nosečnostjo in dojenjem ni priporočljiva.

Starostniki

Pri starejših bolnikih odmerka ni treba prilagajati.

Okvara ledvic

Pri bolnikih z blago ali zmerno okvaro delovanja ledvic bo odmerek morda treba prilagoditi.

Pri bolnikih s hudo okvaro delovanja ledvic se zdravila Docile ne sme uporabljati.

Okvara jeter

Pri bolnikih z blago do zmerno okvaro delovanja jeter odmerka ni treba prilagajati. Bolniki s hudo okvaro delovanja jeter bodo morda potrebovali večji odmerek.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Docile, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek zdravila od priporočenega, zdravilo prenehajte jemati in se posvetujte z zdravnikom. Če s svojim zdravnikom ne morete priti v stik, pojdite v najbližji urgentni center in s seboj vzemite škatlo zdravila.

Najpogostejši simptomi prevelikega odmerjanja so oslabeledost, huda utrujenost, zaspanost, glavobol, pomanjkanje ali izguba apetita, siljenje na bruhanje, bruhanje, pretirana žeja, kovinski priokus v ustih, izločanje velike količine urina v 24 urah, bolečina v področju trebuha, zaprtje, driska, občutek vrtenja in izguba ravnotežja, zvenenje ali šumenje v ušesih, motnje, ki vplivajo na koordinacijo, ravnotežje in govor, kožni izpuščaj, ohlapen mišični tonus (pri dojenčkih), bolečina v mišicah, bolečina v kosteh, občutek hude tesnobe in nemira, dehidracija ter visoke ravni kalcija v krvi in urinu, ki se jih ugotovi z laboratorijskimi preiskavami.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Docile

Če ste pozabili vzeti odmerek zdravila Docile, pozabljeni odmerek vzemite čim prej, nato pa nadaljujte z jemanjem odmerka zdravila ob predvidenem času. Če pa je že skoraj čas, da vzamete naslednji odmerek, pozabljenega odmerka ne vzemite, vzemite le naslednji odmerek ob predvidenem času.

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Pozabljenega odmerka tako ne morete nadomestiti, poveča pa se tveganje za preveliko odmerjanje. Nadaljujte z zdravljenjem, kot je priporočeno.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Možni neželeni učinki so:

Občasni (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov)

- zvišane ravni kalcija v krvi,
- zvišane ravni kalcija v urinu.

Redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov)

- preobčutljivostne reakcije,
- oslabeledost, huda utrujenost, pomanjkanje apetita, žeja,
- zaspanost, zmedenost,
- zaprtje, nastajanje plinov, bolečina v trebuhu, siljenje na bruhanje, driska,
- kožni izpuščaj, hudo srbenje kože.

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- glavobol,
- bruhanje, kovinski priokus v ustih, suha usta, vnetje trebušne slinavke,
- depoziti kalcija v ledvicah, izločanje velike količine urina v 24 urah, močna žeja, odpoved ledvic, pogosto uriniranje ponoči, visoka ali zvišana vrednost krvnega tlaka, motnje srčnega ritma, okvara cirkulatornega sistema, zvišanje ravni beljakovin v urinu, zvišanje ravni fosfatov v krvi.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si.

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Docile

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in pretisnem omotu poleg oznake "EXP". Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C. Ne zamrzujte.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Docile

Učinkovina je holekalciferol (vitamin D₃).

Docile 1000 i.e. trde kapsule

Ena kapsula vsebuje 25 mikrogramov vitamina D₃, kar ustreza 1000 i.e.

Druge sestavine zdravila so:

- olivno olje, rafinirano
- želatina
- titanov dioksid (E171)
- železov oksid, rdeči (E172)

Docile 2000 i.e. trde kapsule

Ena kapsula vsebuje 50 mikrogramov vitamina D₃, kar ustreza 2000 i.e.

Druge sestavine zdravila so:

- olivno olje, rafinirano
- želatina
- titanov dioksid (E171)

Docile 6000 i.e. trde kapsule

Ena kapsula vsebuje 150 mikrogramov vitamina D₃, kar ustreza 6000 i.e.

Druge sestavine zdravila so:

- olivno olje, rafinirano
- želatina
- titanov dioksid (E171)
- železov oksid, rumeni (E172)

Izgled zdravila Docile in vsebina pakiranja

Docile 1000 i.e. trde kapsule

Zdravilo Docile je na voljo v obliki trde kapsule s prozornim telesom, belim pokrovčkom in roza črto, ki je napolnjena z oljno raztopino. Dimenzije kapsule so 15,9 mm x 5,8 mm. Zdravilo Docile je na voljo v kartonskih škatlah. Ena škatla vsebuje 30 kapsul v pretisnih omotih iz aluminija-PVC/PVDC.

Docile 2000 i.e. trde kapsule

Zdravilo Docile je na voljo v obliki trde kapsule s prozornim telesom, belim pokrovčkom in belo črto, ki je napolnjena z oljno raztopino. Dimenzije kapsule so 15,9 mm x 5,8 mm. Zdravilo Docile je na voljo v kartonskih škatlah. Ena škatla vsebuje 30 kapsul v pretisnem omotu iz aluminija-PVC/PVDC.

Docile 6000 i.e. trde kapsule

Zdravilo Docile je na voljo v obliki trde kapsule s prozornim telesom, belim pokrovčkom in rumeno črto, ki je napolnjena z oljno raztopino. Dimenzije kapsule so 15,9 mm x 5,8 mm. Zdravilo Docile je na voljo v kartonskih škatlah. Ena škatla vsebuje 12 kapsul v pretisnem omotu iz aluminija-PVC/PVDC.

Način in režim izdaje zdravila

Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

ABIOGEN PHARMA S.p.A.,
Via Meucci, 36 – 56121,
Ospedaletto (PI),
Italija

Proizvajalec

Abiogen Pharma S.p.A.
Via Meucci, 36
Piza
Italija

Zdravilo je v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Bolgarija – Доциле 1 000 IU капсула, твърда, Доциле 2 000 IU капсула, твърда, Доциле 6 000 IU капсула, твърда/Доциле

Hrvaška – Docile 1 000 IU kapsula, tvrda, Docile 2 000 IU kapsula, tvrda, Docile 6 000 IU kapsula, tvrda

Estonija – Docile 1 000 IU kõvakapsel, Docile 2 000 IU kõvakapsel, Docile 6 000 IU kõvakapsel

Madžarska – Docile 1 000 IU kemény kapszula, Docile 2 000 IU kemény kapszula, Docile 6 000 IU kemény kapszula

Latvija – Docile 1 000 SV cietās kapsulas, Docile 2 000 SV cietās kapsulas, Docile 6 000 SV cietās kapsulas

Litva – Docile 1 000 TV kietosios kapsulės, Docile 2 000 TV kietosios kapsulės, Docile 6 000 TV kietosios kapsulės

Slovenija – Docile 1000 i.e. trde kapsule, Docile 2000 i.e. trde kapsule, Docile 6000 i.e. trde kapsule

Navodilo je bilo nazadnje revidirano 12. 09. 2023.