

NAVODILO ZA UPORABO

VIMOVO 500 mg/20 mg tablete s prirejenim sproščanjem

naproksen in esomeprazol

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo VIMOVO in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo VIMOVO
3. Kako jemati zdravilo VIMOVO
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila VIMOVO
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo VIMOVO in za kaj ga uporabljamo

Kaj je zdravilo VIMOVO

Zdravilo VIMOVO vsebuje dve zdravilni učinkovini. Imenujeta se naproksen in esomeprazol. Vsaka od njiju ima drugačno delovanje.

- Naproksen spada v skupino zdravil, imenovanih "nesteroidna protivnetna zdravila" (NSAID - *Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs*). Zmanjšuje bolečine in vnetje.
- Esomeprazol spada v skupino zdravil, imenovanih "zaviralci protonske črpalke". Zmanjšuje količino kisline v želodcu.

Esomeprazol pomaga zmanjšati tveganje za nastanek razjed in težav z želodcem pri bolnikih, ki morajo jemati NSAID.

Za kaj uporabljamo zdravilo VIMOVO

Zdravilo VIMOVO se uporablja za olajšanje simptomov:

- osteoartritisa,
- revmatoidnega artritisa,
- ankilozirajočega spondilitisa.

Zdravilo VIMOVO pomaga zmanjšati bolečine, oteklost, pordelost in toploto (vnetje).

To zdravilo boste dobili, če zdravnik meni, da manjši odmerek NSAID ne bi olajšal vaših bolečin in pri vas obstaja tveganje za nastanek razjede na želodcu ali razjede na začetnem delu tankega črevesa (dvanajstniku), ki jo lahko povzroči jemanje NSAID.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo VIMOVO

Ne jemljite zdravila VIMOVO:

- če ste alergični (preobčutljivi) na naproksen.
- če ste alergični na esomeprazol ali kakšno drugo zdravilo iz skupine zaviralcev protonske črpalke.

- če ste alergični na katerokoli drugo sestavino tega zdravila (naštete so v poglavju 6).
- če jemljete zdravilo, ki se imenuje "atazanavir" ali "nelfinavir" (ti zdravili se uporabljata za zdravljenje HIV).
- če so vam acetilsalicilna kislina, naproksen ali druga NSAID, npr. ibuprofen, diklofenak ali zaviralci COX-2 (npr. celekoksib, etorikoksib) kdaj povzročili astmo (piskajoče dihanje) ali alergijsko reakcijo, npr. srbenje ali izpuščaj na koži (koprivnico).
- če ste v zadnjih 3 mesecih nosečnosti.
- če imate **hude** težave z jetri, ledvicami ali srcem.
- če imate razjedo na želodcu ali črevesu.
- če imate motnjo strjevanja krvi ali hudo in nepričakovano krvavitev.

Ne vzemite zdravila VIMOVO, če kaj od zgoraj naštetega velja za vas. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete zdravilo VIMOVO.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Vimovo se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Ne vzemite zdravila VIMOVO in se takoj posvetujte z zdravnikom, če se vam kaj od naštetega zgodi pred začetkom jemanja zdravila VIMOVO ali med njegovim jemanjem; to zdravilo namreč lahko prikrije simptome druge bolezni:

- brez razloga precej shujšate in imate težave s požiranjem.
- začnete bruhati hrano ali kri.
- iztrebljate črno blato (kri v blatu).

Če kaj od naštetega velja za vas (ali če niste prepričani), se pred jemanjem tega zdravila posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Preden vzamete to zdravilo, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom:

- če imate vnetje črevesja (Crohnovo bolezen ali ulcerozni kolitis).
- če imate kakšne druge težave z jetri ali ledvicami, ali če ste starejša oseba.
- če prejemate zdravila, kot so kortikosteroidi (peroralni), varfarin, klopidogrel, selektivni zaviralci privzema serotonina (SSRI), acetilsalicilna kislina ali NSAID, vključno z zaviralci COX-2 (glejte poglavje Druga zdravila in zdravilo VIMOVO).

Če kaj od naštetega velja za vas (ali če niste prepričani), se pred jemanjem tega zdravila posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravniku morate povedati, če ste kdaj imeli razjedo na želodcu ali krvavitev v želodcu. Zdravnik vam bo naročil, da ga obvestite o vseh neobičajnih želodčnih simptomih (npr. bolečinah).

Uporabo zdravila, kot je VIMOVO, lahko spremlja nekoliko večje tveganje za srčni infarkt (miokardni infarkt) ali možgansko kap. Vsako tveganje je večje med uporabo velikih odmerkov in med dolgotrajnim zdravljenjem. Ne prekoračite priporočenega odmerka in trajanja zdravljenja.

Zdravilo VIMOVO vsebuje nesteroidno protivnetno zdravilo (NSAID) naproksen. Da bi zmanjšali tveganje za neželene učinke, je treba tudi naproksen (tako kot vsa NSAID) uporabljati v najmanjšem učinkovitem odmerku in najkrajši možni čas. Zato bo vaš zdravnik v rednih presledkih ocenil, ali je zdravilo VIMOVO še primerno za vas.

Zdravilo VIMOVO ni primerno za hitro olajšanje akutnih bolečin: traja namreč več ur, preden protibolečinska učinkovina naproksen pride v kri.

Prav tako se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom, če imate kakšne težave s srcem, če ste kdaj imeli možgansko kap, ali mislite, da vas ogrožajo takšne težave. Takšne težave vas lahko ogrožajo:

- če imate visok krvni tlak.
- če imate težave s krvnim obtokom ali strjevanjem krvi.
- če imate sladkorno bolezen.

- če imate visok holesterol.
- če kadite.

Jemanje zaviralca protonske črpalke (ki je sestavni del zdravila VIMOVO), zlasti v obdobju več kot eno leto, lahko rahlo poveča tveganje za zlom kolka, zapestja ali hrbtenice. Svojemu zdravniku morate povedati, če imate osteoporozo ali če jemljete kortikosteroide (ki lahko povečajo tveganje za osteoporozo).

Otroci in mladostniki

Zdravila VIMOVO ni priporočljivo uporabljati pri otrocih in mladostnikih starih 18 let ali manj.

Druga zdravila in zdravilo VIMOVO

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli drugo zdravilo. To velja tudi za zdravila, ki ste jih kupili brez recepta, vključno z zeliščnimi pripravki. Zdravilo VIMOVO namreč lahko vpliva na delovanje nekaterih drugih zdravil. Tudi nekatera druga zdravila lahko vplivajo na delovanje zdravila VIMOVO.

Ne vzemite tega zdravila in zdravniku ali farmacevtu povejte, če jemljete:

- zdravilo "atazanavir" ali "nelfinavir" (uporabljata se za zdravljenje HIV).

Svojemu zdravniku ali farmacevtu morate povedati, če jemljete katero od naslednjih zdravil:

- acetilsalicilna kislina. Če jemljete majhne odmerke acetilsalicilne kisline, lahko uporabljate zdravilo VIMOVO.
- druge NSAID (vključno z zaviralci COX-2).
- določena zdravila npr. ketokonazol, itrakonazol, posakonazol ali vorikonazol (uporabljajo se za zdravljenje glivičnih okužb).
- erlotinib (ali drugo zdravilo proti raku iz iste skupine).
- holestiramin (uporablja se za znižanje holesterola).
- klaritromicin (uporablja se za zdravljenje okužb).
- "kinolonski antibiotik" (za okužbe), npr. ciprofloksacin ali moksifloksacin.
- diazepam (uporablja se za zdravljenje tesnobe, za sproščanje mišic ali pri epilepsiji).
- hidantoine, npr. fenitoin (uporabljajo se za zdravljenje epilepsije).
- litij (uporablja se za zdravljenje nekaterih vrst depresije).
- metotreksat (uporablja se za zdravljenje revmatoidnega artritisa, psoriaze in raka).
- probenecid (za protin).
- "selektivne zaviralce privzema serotonina" (SSRI) (uporabljajo se za zdravljenje velike depresije ali anksiozne motnje).
- ciklosporin ali takrolimus (zdravila, ki se uporabljata za zaviranje imunskih reakcij telesa).
- digoksin (uporablja se za zdravljenje srčnih motenj).
- sulfonilsečnine, npr. glimepirid (peroralno zdravilo, ki se uporablja za uravnavanje krvnega sladkorja pri sladkorni bolezni).
- zdravila za zdravljenje visokega krvnega tlaka, imenovana diuretiki (npr. furosemid ali hidroklorotiazid), zaviralci ACE (npr. enalapril), antagonisti receptorjev angiotenzina II (npr. losartan) in zaviralci beta (npr. propranolol).
- kortikosteroidna zdravila, npr. hidrokortizon ali prednizolon (uporabljajo se kot protivnetna zdravila).
- zdravilo proti strjevanju krvi, npr. varfarin, dikumarol, heparin ali klopidoogrel.
- rifampicin (uporablja se za zdravljenje tuberkuloze).
- šentjanževko (*Hypericum perforatum*) (uporablja se za zdravljenje blage depresije).
- cilostazol (uporablja se proti bolečinam v nogah, ki so posledica slabega pretoka krvi).

Če kaj od naštetega velja za vas (ali če niste prepričani), se pred jemanjem zdravila VIMOVO posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Zdravilo VIMOVO skupaj s hrano in pijačo

Zdravila VIMOVO ne jemljite s hrano, kajti ta lahko zmanjša in/ali upočasni učinek zdravila VIMOVO. Tablete vzemite vsaj 30 minut pred jedjo.

Nosečnost, dojenje in plodnost

- Zdravila VIMOVO ne jemljite, če ste v zadnjih 3 mesecih nosečnosti.
- Če ste v prvem ali drugem trimesečju nosečnosti, se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete to zdravilo. Zdravnik bo presodil, ali lahko jemljete zdravilo VIMOVO.
- Ne dojite, če jemljete zdravilo VIMOVO. Majhna količina se namreč lahko izloči v materino mleko. Če nameravate dojit, ne smete jemati zdravila VIMOVO.

Če ste noseči, če bi lahko zanosili ali če dojite, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo. Zdravilo VIMOVO lahko oteži zanositev. Zdravnika morate obvestiti, če načrtujete nosečnost ali če imate težave z zanositvijo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Med jemanjem zdravila VIMOVO se vam lahko pojavi omotica ali zamegljen vid. Če se vam to zgodi, ne vozite in ne uporabljajte orodij oziroma strojev.

Zdravilo VIMOVO vsebuje metilparahidroksibenzoat (E218) in propilparahidroksibenzoat (E216). Ti sestavini lahko povzročita alergijske reakcije. Takšne reakcije so lahko zapoznele.

3. Kako jemati zdravilo VIMOVO

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Jemanje tega zdravila

- Tablete zaužijte cele z nekaj vode. Ne grizite jih, ne lomite in ne drobite. Tablete morate zaužiti cele, da bodo delovale ustrezno.
- Tablete vzemite vsaj 30 minut pred jedjo. Hrana lahko zmanjša varovalni učinek zdravila VIMOVO na želodec in črevo. Hrana lahko tudi močno upočasni ublažitev bolečin in vnetja.
- Če to zdravilo jemljete dolgo časa, vas bo zdravnik kontroliral (zlasti če zdravilo jemljete več kot eno leto).

Koliko zdravila morate vzeti

- Jemljite po eno tableto dvakrat na dan, in sicer toliko časa, kot vam je naročil zdravnik.
- Zdravilo VIMOVO je na voljo samo v odmerku 500 mg/20 mg. Če bo zdravnik presodil, da ta odmerek ni primeren za vas, vam lahko predpiše drugo zdravljenje.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila VIMOVO, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek zdravila VIMOVO, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Simptomi prevelikega odmerjanja so lahko omotica, zaspanost, bolečina in/ali nelagodje v zgornjem predelu trebuha, zgaga, siljenje na bruhanje, zmedenost, bruhanje, krvavitve v želodcu ali črevesu, izguba zavesti, hudo otekanje obraza, alergijske reakcije in nenadzorovani premiki telesa.

Če ste pozabili vzeti zdravilo VIMOVO

- Če pozabite vzeti odmerek, ga vzemite, čim se spomnite. Če pa je že skoraj čas za naslednji odmerek, preskočite izpuščeni odmerek.
- Ne vzemite dvojnega odmerka (dveh odmerkov hkrati), če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Med uporabo tega zdravila se lahko pojavijo naslednji neželeni učinki.

Če opazite katerega od naslednjih resnih neželenih učinkov, nehajte jemati zdravilo VIMOVO in nemudoma pojdite k zdravniku. Morda boste potrebovali nujno zdravniško pomoč.

- Nenadno piskajoče dihanje, oteklost ustnic, jezika in žrela ali telesa, izpuščaj, omedlevico ali težave s požiranjem (huda alergijska reakcija).
- Pordelost kože z mehurji ali lupljenjem. Pojavijo se lahko tudi hudi mehurji in krvavitve na ustnicah, očeh, ustih, nosu in spolovilih.
- Porumenelost kože ali očesnih beločnic, temen urin in utrujenost; to so lahko simptom težav z jetri.
- Zdravila, kakršno je VIMOVO, lahko spremlja nekoliko večje tveganje za srčni infarkt (miokardni infarkt) ali možgansko kap. Med znaki so bolečina v prsih, ki se širi v vrat in rame ter navzdol po levi roki, zmedenost ali mišična šibkost ali omrtvičenost, lahko samo na eni strani telesa.
- Iztrebljanje črnega, lepljivega blata ali krvava driska.
- Bruhate lahko kri ali temne delce, ki so na pogled podobni kavnim zrnom.

Čim prej se posvetujte z zdravnikom, če se vam pojavi karkoli od naslednjega:

Zdravilo VIMOVO lahko v redkih primerih neugodno vpliva na bele krvne celice in povzroči imunsko pomanjkljivost.

Če imate okužbo s simptomi, kot sta npr. povišana telesna temperatura in zelo slabo splošno stanje, ali povišana telesna temperatura s simptomi lokalne okužbe, npr. bolečinami v vratu, žrelu ali ustih, ali s težavami pri uriniranju, se morate čim prej posvetovati z zdravnikom, da bo lahko s preiskavo krvi izključil pomanjkanje belih krvnih celic (agranulocitozo). Povedati mu morate za zdravila, ki jih jemljete.

Med drugimi možnimi neželenimi učinki so:

Pogosti (pojavi se pri 1 do 10 bolnikov od 100 bolnikov)

- glavobol
- utrujenost
- žeja
- potrtost
- občutek kratke sape
- močnejše znojenje
- srbenje kože in izpuščaj na koži
- vrtoglavica
- rdeče ali vijoličaste pege, podplutbe ali pike na koži
- siljenje na bruhanje (navzea) ali bruhanje
- občutek razbijanja srca (palpitacije)
- motnje spanja ali težave s spanjem (nespečnost)
- težave s sluhom, npr. zvonjenje v ušesih
- omotica, zaspanost in občutek omočičnosti oziroma omedlevice
- oteklost rok, stopal in gležnjev (edemi)
- vnetje v ustih, pekoč občutek v ustih ali razjede v ustih
- težave z vidom, npr. zamegljen vid, vnetje veznice (konjunktivitis) ali bolečine v očeh
- driska, bolečine v trebuhu, zgaga, težave z želodcem, zaprtost, spahovanje ali vetrovi (flatulenca)

Občasni, redki ali zelo redki (pojavi se pri 1 do 10 bolnikov od 1.000 bolnikov ali manj)

- povišana telesna temperatura
- omedlevica
- suhost ust
- agresivnost
- poslabšanje sluha
- napad astme
- napadi krčev ali napadi, podobni epileptičnim

- težave z menstruacijo
- sprememba telesne mase
- izpadanje las (alopecija)
- bulast izpuščaj (koprivnica)
- bolečine v sklepih (artralgija)
- povečanje prsi pri moških
- vnet ali otekel jezik
- trzanje ali tresenje mišic
- težave z apetitom ali spremembe okusa
- mišična šibkost ali bolečina (mialgija)
- upočasnjeno strjevanje krvi
- pri ženskah težave z zanositvijo
- povišana telesna temperatura, pordelost ali drugi znaki okužbe
- neredno, počasno ali zelo hitro bitje srca
- mravljinčenje
- težave s spominom ali zbranostjo
- občutek vznemirjenosti, zmedenost, tesnoba ali živčnost
- splošno slabo počutje, šibkost in pomanjkanje energije
- oteklost ali bolečnost delov telesa zaradi zastajanja vode
- visok ali nizek krvni tlak. Pojavita se lahko omedlevica ali omotica.
- izpuščaj ali mehurji na koži, večja občutljivost kože po izpostavljenosti sončni svetlobi.
- videnje, občutenje ali slišanje stvari, ki jih ni (halucinacije)
- spremembe v izvidih preiskav krvi, npr. preiskav delovanja jeter. Zdravnik vam lahko pojasni več o tem.
- okužba, ki jo imenujemo "gobice" in lahko prizadene črevo; povzročajo jo glivice.
- kri v urinu (seču) ali druge težave z ledvicami. Pojavijo se vam lahko bolečine v hrbtu.
- težko dihanje, ki se lahko polagoma slabša. To je lahko znak, da se razvija pljučnica ali oteklina pljuč.
- nizka koncentracija soli (natrija) v krvi. Povzroči lahko šibkost, bruhanje in krče.
- simptomi meningitisa, npr. povišana telesna temperatura, siljenje na bruhanje ali bruhanje, togost vratu, glavobol, občutljivost na močno svetlobo in zmedenost.
- težave s trebušno slinavko. Med znaki so hude bolečine v trebuhu, ki se širijo v hrbet.
- svetlo blato; to je znak resnih težav z jetri (hepatitis). Resne težave z jetri lahko povzročijo odpoved jeter in vnetje možganov.
- kolitis ali poslabšanje vnetne črevesne bolezni, npr. Crohnove bolezni ali ulceroznega kolitisa. Med znaki so bolečine v trebuhu, driska, bruhanje in hujšanje.
- težave s krvjo, npr. zmanjšano število rdečih krvnih celic (anemija), belih krvnih celic ali krvnih ploščic. To lahko povzroči šibkost, podplutbe, povišano telesno temperaturo, hudo mrzlico in vnetje žrela ali poveča verjetnost okužb.
- težave s tem, kako srce črpa kri po telesu, ali prizadetost žil. Med znaki so lahko utrujenost, težko dihanje, občutek omedlevice, bolečina v prsih ali splošne bolečine.

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti)

- Če zdravilo VIMOVO jemljete več kot tri mesece, se vam lahko zniža koncentracija magnezija v krvi. Nizka koncentracija magnezija se lahko kaže z utrujenostjo, nehotnim krčenjem mišic, dezorientiranostjo, konvulzijami (napadi krčev), omotico in hitrim bitjem srca. Če se vam pojavi kateri od teh simptomov, o tem takoj obvestite svojega zdravnika. Nizka koncentracija magnezija lahko povzroči tudi znižanje koncentracije kalija ali kalcija v krvi. Zdravnik se bo morda odločil za redne preiskave krvi, s katerimi vam bo kontroliral koncentracijo magnezija.

Vendar naj vam ta seznam možnih neželenih učinkov ne zbuja skrbi. Morda se vam ne bo pojavil nobeden od njih.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika
Center za zastrupitve
Zaloška cesta 2
SI-1000 Ljubljana
Faks: + 386 (0)1 434 76 46
e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila VIMOVO

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli, steklenički ali pretisnem omotu poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Plastenka: Shranjujte v originalni ovojnini. Plastenka naj bo tesno zaprta za zagotovitev zaščite pred vlago.

Pretisni omot: Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo VIMOVO

- Zdravilni učinkovini sta naproksen 500 mg in esomeprazol 20 mg.
- Druge sestavine zdravila (pomožne snovi) v jedru tablete so premreženi natrijev karmelozat, magnezijev stearat, povidon, koloidni silicijev dioksid in v filmski oblogi karnauba vosek, glicerilmonostearat 40-55, hipromeloza, železov oksid (E172, rumeni, črni), makrogol 8000, kopolimer metakrilne kisline in etilakrilata, metilparahidroksibenzoat (E218), polidekstroza, polisorbata 80, propilenglikol, propilparahidroksibenzoat (E216), natrijev lavrilsulfat, titanov dioksid (E171), trietilcitrat.

Izgled zdravila VIMOVO in vsebina pakiranja

To so ovalne rumene tablete, ki imajo s črnim črnilom izpisano oznako 500/20.

Plastenka:

Velikosti pakiranja – 6, 20, 30, 60, 100, 180 ali 500 tablet s prirejenim sproščanjem.

Plastenke vsebujejo sušilo s silikagelom (da ostanejo tablete suhe). Blazinica, ki vsebuje sušilo, ni namenjena zaužitju.

Aluminijski pretisni omot:
Velikosti pakiranj – 10, 20, 30, 60 ali 100 tablet s prirejenim sproščanjem.
Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdajanja zdravila

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet

AstraZeneca UK Limited
2 Kingdom Street
London, W2 6BD
Velika Britanija

Izdelovalec

AstraZeneca AB
Gärtnavägen
SE-151 85 Södertälje
Švedska

To zdravilo je odobreno v državah članicah EGP pod naslednjimi imeni:

Avstrija: Vimovo
Belgija: Vimovo
Bolgarija: Vimovo
Češka: Vimovo
Danska: Vimovo
Estonija: Vimovo
Finska: Vimovo
Nemčija: Vimovo
Francija: Vimovo
Grčija: Vimovo
Madžarska: Vimovo
Irska: Vimovo
Italija: Vimovo
Latvija: Vimovo
Litva: Vimovo
Luksemburg: Vimovo
Malta: Vimovo
Nizozemska: Vimovo
Norveška: Vimovo
Poljska: Vimovo
Portugalska: Vimovo
Romunija: Vimovo
Slovaška: Vimovo
Slovenija: Vimovo
Španija: Vimovo
Švedska: Vimovo
Velika Britanija: Vimovo

Navodilo je bilo odobreno dne 24.07.2013