

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

1. IME ZDRAVILA

neo-angin

1,20 mg/0,60 mg/5,90 mg pastile

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena pastila vsebuje:

Učinkovine:

2,4-diklorobenzilalkohol	1,20 mg
amilmetakrezol	0,60 mg
levomentol	5,90 mg

Pomožne snovi z znanim učinkom:

saharoza	1422,70 mg
tekoča glukoza (suha snov)	1138,15 mg
rdeče 4R 80 % (E124)	0,35 mg

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

pastila

Okrogla, rdeča, bikonveksna, rahlo prosojna pastila.

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Zdravilo neo-angin je antiseptik in blag analgetik za usta in žrelo.

Namenjeno je za zgodnje lokalno zdravljenje blagih okužb ustne votline in žrela, kar lahko pripomore tudi k manjši porabi antibiotikov. Te okužbe povzročijo različna vnetja, npr. tonzilitis, faringitis in laringitis s simptomi, kot so bolečine v žrelu in hripavost, ter vnetja ustne sluznice (stomatitis, aftozni stomatitis, afte) in vnetja dlesni (gingivitis).

Zdravilo neo-angin je indicirano pri odraslih, mladostnikih in otrocih, starih 6 let in več.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Odrasli, mladostniki in otroci, stari 6 let in več, naj na vsake 2 do 3 ure, v ustih počasi raztopijo po eno pastilo. Največji dnevni odmerek zdravila je 6 pastil. Brez priporočila zdravnika, zdravila neo-angin ne smete jemati dlje kot 3-4 dni.

Na voljo ni podatkov, ki bi dokazovali, da hrana ali pijača vplivata na delovanje zdravila. Neposredno po uporabi zdravila naj bolnik ne uživa hrane ali pijače, da le-ta ne bi pospešila odstranjevanja zdravila z ustne sluznice in žrela.

Pediatrična populacija

Zdravila neo-angin se ne sme uporabljati pri otrocih, mlajših od 6 let.

4.3 Kontraindikacije

Preobčutljivost na učinkovine ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Zdravilo ni primerno za otroke, mlajše od 6 let.

Če ima bolnik katerega od simptomov, kot sta kronični kašelj ali hripavost, se mora posvetovati z zdravnikom, da ne bi spregledali morebitnih malignih obolenj, ki imajo prav tako lahko navedene simptome.

To zdravilo vsebuje barvilo rdeče 4R (E124), ki lahko povzroči alergijske reakcije.

Zdravilo neo-angin vsebuje tudi 1,14 g glukoze in 1,42 g saharoze v eni pastili, kar ustreza približno 10 kcal (42 kJ). To morajo upoštevati bolniki s sladkorno boleznijo.

Bolniki z redko dedno intoleranco za fruktozo, malabsorbcijo glukoze/galaktoze ali pomanjkanjem saharoza-izomaltaze ne smejo jemati tega zdravila. Glukoza in saharoza lahko škodujeta zobem.

To zdravilo lahko vsebuje žveplov dioksid ali sulfite, ki lahko redko povzročijo resne preobčutljivostne reakcije in bronhospazem.

Barvilo v tem zdravilu vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na pastilo, kar v bistvu pomeni "brez natrija".

Za zdravljenje z neo-anginom morajo biti otroci zmožni nadzorovanega lizanja pastil.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Pri lokalnem oralnem zdravljenju s tem zdravilom, ni znanih pomembnejših interakcij z drugimi zdravili. Sočasna uporaba drugih zdravil za oralno uporabo ni priporočljiva.

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Nosečnost

Podatkov o uporabi zdravila neo-angin pri nosečnicah ni oziroma so omejeni. Študije na živalih ne kažejo neposrednih ali posrednih škodljivih učinkov na sposobnost razmnoževanja (glejte poglavje 5.3). Ker ni dovolj podatkov, tveganja za plod ni mogoče povsem izključiti, zato uporaba tega zdravila med nosečnostjo ni priporočljiva.

Dojenje

Ni dovolj podatkov o izločanju učinkovin/presnovkov v materino mleko, zato se zdravila neo-angin med dojenjem ne sme uporabljati.

Plodnost

Študije za oceno vpliva na plodnost niso bile izvedene.

4.7 Vplivi na sposobnost vožnje in upravljanja strojev

Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

4.8 Neželeni učinki

Neželeni učinki so navedeni po organskem sistemu in pogostnosti:

zelo pogosti ($\geq 1/10$)

pogosti ($\geq 1/100$ do $< 1/10$)

občasni ($\geq 1/1000$ do $< 1/100$)

redki ($\geq 1/10\,000$ do $< 1/1000$)

zelo redki ($< 1/10\,000$)

neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov)

Po uporabi zdravila neo-angin so poročali o naslednjih neželenih učinkih:

Bolezni imunskega sistema

Neznana: alergijske reakcije kot so otekanje ust, jezika in ustnic, izpuščaj.

Bolezni prebavil

Zelo redki: draženje ustne in želodčne sluznice, kot sta dispepsija, navzea.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500

Faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

4.9 Preveliko odmerjanje

Ni znanih primerov prevelikega odmerjanja tega zdravila.

Največji dnevni odmerek zdravila je 6 pastil. V zelo malo verjetnem primeru prevelikega odmerjanja se lahko opisani neželeni učinki okrepijo. V tem primeru je priporočljivo simptomatsko zdravljenje.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: antiseptiki, oznaka ATC: R02AA20

Farmakodinamični učinki

Zdravilo neo-angin je antiseptik in blag analgetik za žrelo, ki vsebuje kombinacijo 2,4-diklorobenzilalkohola, amilmetakrezola in levomentola. Zdravilo omogoča zgodnje ukrepanje, s čimer lahko zmanjšamo potrebo po antibiotikih.

Okužbe ustne votline in žrela povzročijo različne vrste vnetij, npr. stomatitis, gingivitis, tonzilitis, faringitis in laringitis.

Zdravilo neo-angin vsebuje tri učinkovine, tj. 2,4-diklorobenzilalkohol, amilmetakrezol in levomentol. 2,4-diklorobenzilalkohol sodi med derivate benzena, amilmetakrezol med derivate fenola, levomentol pa je ciklični monoterpen. Vse tri snovi so lipofilne. Prvi dve sta antiseptika, ki delujeta baktericidno

proti številnim patogenim mikroorganizmom, ki povzročajo okužbe ust in žrela, imata pa tudi blag antimikotičen učinek.

Med najpogostejšimi povzročitelji so grampozitivne in gramnegativne bakterije, npr. stafilokoki, pnevmokoki, fuzobakterije (*Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Haemophilus influenzae* in *Branchamella catarrhalis*). Včasih so udeležene tudi patogene glive, zlasti *Candida albicans*.

Mehanizem delovanja

Mehanizem delovanja amilmetakrezola in 2,4-diklorobenzilalkohola še ni pojasnjen v celoti, vendar menijo, da temelji na njuni površinski aktivnosti. Obe snovi delujeta na celično membrano, oziroma na membranske lipide, to pa pojasnjuje učinkovitost zdravila proti bakterijam in glivicam.

Delovanje obeh antiseptikov dopolnjuje še levomentol s svojim blagim analgetičnim delovanjem prek stimulacije receptorjev za hladno v sluznici.

Z opisanim delovanjem zdravilo neo-angin odpravlja simptome blagih okužb ust in žrela.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija

Zdravilo neo-angin se počasi raztopi v ustih. Adhezija učinkovin na sluznico je dobra zaradi njihovih dobrih površinsko aktivnih lastnosti, kar omogoča daljše delovanje učinkovin na sluznico. Vse absorbirane učinkovine se hitro izločijo iz telesa.

Izločanje

Razgradnja 2,4-diklorobenzilalkohola poteka prek 2,4-diklorobenzojske kisline, ki se izloči bodisi v obliki kisline (npr. benzojska kislina) ali kot konjugat z glicinom skozi ledvica. Amilmetakrezol se delno oksidira v ustrezno karboksilno kislino in izloči skozi ledvica kot glukuronid. Levomentol se izloči z urinom in žolčem, prav tako v obliki glukuronida.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Pri uporabi navedene kombinacije učinkovin ni znanih specifičnih tveganj.

Izsledki opravljenih raziskav toksičnosti z uporabo 2,4-diklorobenzilalkohola in amilmetakrezola kažejo, da ta dva antiseptika v terapevtskih odmerkih nimata toksičnih ali mutagenih učinkov, niti pri samostojni uporabi, niti v kombinaciji. Raziskave toksičnosti 2,4-diklorobenzilalkohola in amilmetakrezola niso pokazale mutagenega delovanja teh učinkovin.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

eterično olje zvezdastega janeža
eterično olje poprove mete
saharoza
tekoča glukoza
vinska kislina
rdeče 4R (E124), vsebuje natrij

6.2 Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3 Rok uporabnosti

3 leta

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

Zdravilo je na voljo v škatlah s 24 pastilami v pretisnih omotih iz PVC/PVDC in aluminijaste folije. V vsakem pretisnem omotu je 12 pastil.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Ni posebnih zahtev.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

DIVAPHARMA GmbH
Motzener Straße 41
D-12277 Berlin
Nemčija

8. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

HN/98/01772/002

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 20. 02. 1998
Datum zadnjega podaljšanja: 28. 10. 2011

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

18. 4. 2024