

NAVODILO ZA UPORABO

Lamotrigin Arrow 25 mg tablete
Lamotrigin Arrow 50 mg tablete
Lamotrigin Arrow 100 mg tablete
Lamotrigin Arrow 200 mg tablete
(lamotrigin)

- Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo!
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Lamotrigin Arrow tablete in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Lamotrigin Arrow tablete
3. Kako jemati zdravilo Lamotrigin Arrow tablete
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Lamotrigin Arrow tablete
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO LAMOTRIGIN ARROW TABLETE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Lamotrigin Arrow tablete spada v skupino zdravil, imenovanih *antiepileptiki*. Uporabljamo ga za zdravljenje dveh bolezni – **epilepsije** in **bipolarne motnje**.

Zdravilo Lamotrigin Arrow tablete zdravi epilepsijo tako, da v možganih zavre signale, ki sprožijo epileptični napad (napad krčev).

- Odrasli in otroci od 13. leta naprej lahko jemljejo zdravilo Lamotrigin Arrow tablete samo ali skupaj z drugimi zdravili za zdravljenje epilepsije. Zdravilo Lamotrigin Arrow tablete se lahko jemlje skupaj z drugimi zdravili tudi za zdravljenje napadov krčev, ki se pojavljajo pri motnji, imenovani Lennox-Gastautov sindrom.
- Pri otrocih od 2. do 12. leta starosti se lahko zdravilo Lamotrigin Arrow tablete uporablja za zdravljenje teh bolezni skupaj z drugimi zdravili. Samega ga je mogoče uporabljati za zdravljenje posebne vrste epilepsije, t.i. tipičnih absenčnih napadov.

Zdravilo Lamotrigin Arrow tablete zdravi tudi bipolarno motnjo

Ljudje z bipolarno motnjo (včasih imenovano *manično depresivno motnjo*) doživljajo izredna nihanja razpoloženja, tako da se jim obdobja manije (vznemirjenja ali eufrije) izmenjujejo z obdobji depresije (globoke žalosti ali obupa). Pri odraslih od 18. leta dalje je mogoče zdravilo Lamotrigin Arrow tablete uporabljati samo ali skupaj z drugimi zdravili za preprečevanje obdobji depresije, ki se pojavljajo pri bipolarni motnji. Ni še znano, kako zdravilo Lamotrigin Arrow tablete v možganih doseže ta učinek.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO LAMOTRIGIN ARROW TABLETE

Ne jemljite zdravila Lamotrigin Arrow tablete:

- če ste alergični (preobčutljivi) na lamotrigin ali katerikoli sestavino zdravila Lamotrigin Arrow tablete (pomožne snovi so navedene v poglavju 6).

Če to velja za vas:

➔ **Povejte svojemu zdravniku** in ne vzemite zdravila Lamotrigin Arrow tablete.

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Lamotrigin Arrow tablete

Preden vzamete zdravilo Lamotrigin Arrow tablete, morate zdravniku povedati:

- če imate težave z ledvicami,
- če se vam je kdaj pojavil izpuščaj med jemanjem lamotrigina ali drugih zdravil proti epilepsiji,
- če že jemljete kakšno zdravilo, ki vsebuje lamotrigin.

Če kaj od tega velja za vas:

➔ **Povejte svojemu zdravniku;** morda vam bo zmanjšal odmere, ali bo presodil, da zdravilo Lamotrigin Arrow tablete za vas ni primerno.

Pomembne informacije o možnih resnih reakcijah

Maloštevilnim bolnikom se med jemanjem zdravila Lamotrigin Arrow tablete pojavi alergijska reakcija ali potencialno resna kožna reakcija, ki se lahko razvije v resnejše težave, če ni zdravljena. Poznati morate simptome, na katere morate biti pozorni med jemanjem zdravila Lamotrigin Arrow tablete.

➔ **Preberite opis teh simptomov v poglavju 4 tega navodila,** pod naslovom "*Potencialno resne reakcije: nemudoma poiščite zdravniško pomoč*".

Razmišljanje o samopoškodovanju ali samomoru

Antiepileptiki se uporabljajo za zdravljenje različnih stanj, med njimi tudi epilepsije in bipolarni motnje. Pri bolnikih z bipolarno motnjo se občasno lahko pojavijo samomorilne misli ali misli na samopoškodovanje. Pri bipolarni motnji je pojav takšnih misli verjetnejši:

- ko prvič začnete zdravljenje
- če ste že kdaj razmišljali o samopoškodovanju ali o samomoru
- če ste mlajši od 25 let

Če se vam med jemanjem zdravila Lamotrigin Arrow tablete pojavijo takšne misli ali ravnanje, ali če opazite poslabšanje počutja ali se vam pojavijo novi simptomi:

➔ **se nemudoma posvetujte s svojim zdravnikom ali poiščite pomoč v najbližji bolnišnici.**

Pri majhnem številu bolnikov, ki so se zdravili z antiepileptiki kot je zdravilo Lamotrigin Arrow tablete, so se pojavile misli na samopoškodovanje ali samomor. Če kadarkoli začnete razmišljati o tem, se nemudoma posvetujte s svojim zdravnikom.

Če jemljete zdravilo Lamotrigin Arrow tablete za epilepsijo

Občasno se lahko med jemanjem zdravila Lamotrigin Arrow tablete napadi krčev pri nekaterih vrstah epilepsije poslabšajo ali postanejo pogostejši. Nekaterim bolnikom se lahko pojavijo hudi napadi, ki lahko povzročijo resne zdravstvene težave. Če se vam med zdravljenjem z zdravilom Lamotrigin Arrow tablete napadi pojavljajo pogosteje kot ponavadi, ali če se pojavi hud napad:

➔ **čim prej pojdite k zdravniku.**

Zdravila Lamotrigin Arrow tablete za zdravljenje bipolarni motnje ne smejo dobivati bolniki, mlajši od 18 let. Zdravila za zdravljenje depresije in druge težave z duševnim zdravjem povečujejo tveganje za samomorilne misli in samomorilno vedenje pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete, če ste pred kratkim jemali, ali če začnete na novo jemati katerokoli zdravilo – to velja tudi za zeliščne pripravke in zdravila, ki ste jih dobili brez recepta.

Vaš zdravnik mora vedeti, če jemljete druga zdravila za zdravljenje epilepsije ali težav z duševnim zdravjem. Namen tega je zagotoviti, da boste jemali pravi odmerek zdravila Lamotrigin Arrow tablete. Med takšna zdravila spadajo:

- **okskarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramet ali zonisamid,** ki se uporabljajo za zdravljenje **epilepsije,**
- **litij ali olanzapin,** ki se uporablja za zdravljenje **težav z duševnim zdravjem,**

- **bupropion**, ki se uporablja za zdravljenje **težav z duševnim zdravjem** ali za **opustitev kajenja**

➔ **Povejte svojemu zdravniku**, če jemljete katero od teh zdravil.

Nekatera zdravila medsebojno delujejo z zdravilom Lamotrigin Arrow tablete ali povečajo verjetnost neželenih učinkov. Med takšna spadajo:

- **valproat**, ki se uporablja za zdravljenje **epilepsije** in **težav z duševnim zdravjem**,
- **karbamazepin**, ki se uporablja za zdravljenje **epilepsije** in **težav z duševnim zdravjem**,
- **fenitoin**, **primidon** ali **fenobarbiton**, ki se uporabljajo za zdravljenje **epilepsije**,
- **risperidon**, ki se uporablja za zdravljenje **težav z duševnim zdravjem**,
- **rifampicin**, ki je **antibiotik**,
- kombinacija **lopinavirja** in **ritonavirja** ali kombinacija **atazanavirja** in **ritonavirja**, ki se uporablja za zdravljenje okužbe z **virusom človeške imunske pomanjkljivosti (HIV)**,
- **hormonska kontracepcija**, npr. **kontracepcijske tablete** (glejte spodaj).

➔ **Zdravniku morate povedati**, če jemljete ali če začnete ali nehate jemati katero od teh zdravil.

Hormonska kontracepcija (npr. kontracepcijske tablete) lahko vpliva na delovanje zdravila Lamotrigin Arrow tablete

Zdravnik vam bo morda svetoval določeno vrsto hormonske kontracepcije ali uporabo kakšnega drugega načina kontracepcije, npr. kondomov, cervikalne kapice ali materničnega vložka. Če uporabljate hormonsko kontracepcijo, npr. kontracepcijske tablete, vas bo zdravnik morda napotil na preglede krvi, da bo preveril koncentracijo zdravila Lamotrigin Arrow tablete. Če nameravate začeti uporabljati hormonsko kontracepcijo:

➔ **Z zdravnikom se posvetujte** o ustreznih načinih kontracepcije.

Zdravilo Lamotrigin Arrow tablete lahko tudi vpliva na delovanje hormonske kontracepcije, čeprav ni verjetno, da bi zmanjšalo njeno učinkovitost. Če uporabljate hormonsko kontracepcijo in opazite kakšne spremembe v menstruaciji, npr. vmesne krvavitve ali krvav izcedek med eno in drugo menstruacijo:

➔ **Povejte zdravniku**. To so lahko znaki, da zdravilo Lamotrigin Arrow tablete vpliva na delovanje vaše hormonske kontracepcije.

Nosečnost in dojenje

Znano je, da je lahko pri otrocih, katerih matere med nosečnostjo jemljejo zdravilo Lamotrigin Arrow tablete, povečano tveganje za prirojene hibe. Med takšnimi hibami sta zajčja ustnica (heilosha) in volčje žrelo (palatosha). Zdravnik vam bo morda svetoval, da jemljete dodatno **folno kislino**, če nameravate zanositi in med nosečnostjo. Nosečnost lahko vpliva na učinkovitost zdravila Lamotrigin Arrow tablete, zato boste morda napoteni na preglede krvi in vaš odmerek zdravila Lamotrigin Arrow tablete bo morda prilagojen.

➔ **Posvetujte se z zdravnikom**, če ste noseči, če domnevate, da ste noseči, ali načrtujete nosečnost. Zdravljenja ne smete prekiniti, ne da bi se posvetovali s svojim zdravnikom. To je še posebej pomembno, če imate epilepsijo.

➔ **Če dojite ali nameravate dojiti, se posvetujte z zdravnikom**. Zdravilna učinkovina zdravila Lamotrigin Arrow tablete prehaja v materino mleko in lahko vpliva na otroka. Zdravnik se bo z vami pogovoril o tveganjih in koristih dojenja med zdravljenjem z zdravilom Lamotrigin Arrow tablete. Če se odločite za dojenje, bo od časa do časa pregledal otroka.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Lamotrigin Arrow tablete lahko povzroči omotico in dvojen vid.

➔ **Ne vozite in ne upravljajte strojev, dokler niste prepričani, da zdravilo na vas nima takega vpliva.**

Če imate epilepsijo, se morate z zdravnikom posvetovati o upravljanju vozil in strojev.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Lamotrigin Arrow tablete

Tablete Lamotrigin Arrow vsebujejo majno količino sladkorja, imenovanega laktoza. Če imate intoleranco za laktozo ali kakšne druge sladkorje:

➔ **Povejte svojemu zdravniku** in ne vzemite zdravila Lamotrigin Arrow tablete.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO LAMOTRIGIN ARROW TABLETE

Natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Koliko zdravila Lamotrigin Arrow tablete morate vzeti

Preden se bo izkazalo, kateri odmerek zdravila Lamotrigin Arrow tablete je za vas najprimernejši, lahko traja nekaj časa. Odmerek, ki ga boste jemali, bo odvisen od:

- vaše starosti,
- tega, ali jemljete zdravilo Lamotrigin Arrow tablete z drugimi zdravili,
- tega, ali imate kakšne težave z ledvicami ali jetri.

Zdravnik vam bo sprva predpisal majhen odmerek, potem pa ga bo v teku nekaj tednov postopoma povečeval, dokler ne boste dosegli za vas *učinkovitega odmerka*. **Nikoli ne vzemite več zdravila Lamotrigin Arrow tablete, kot vam je predpisal zdravnik.**

Običajni učinkoviti odmerek zdravila Lamotrigin Arrow tablete za odrasle in otroke, starejše od 12 let, je med 100 in 400 mg na dan.

Pri otrocih od 2. do 12. leta starosti je učinkoviti odmerek odvisen od njihove telesne teže; ponavadi je med 1 in 15 mg na kilogram otrokove telesne teže, do največ 400 mg na dan.

Uporaba zdravila Lamotrigin Arrow tablete se ne priporoča pri otrocih, mlajših od 2 let.

Kako vzeti odmerek zdravila Lamotrigin Arrow tablete

Odmerek zdravila Lamotrigin Arrow tablete vzemite enkrat ali dvakrat na dan, kot vam je svetoval zdravnik. Vzamete ga lahko s hrano ali brez nje.

Zdravnik vam bo morda tudi svetoval začetek ali prenehanje jemanja drugih zdravil, odvisno od bolezni, zaradi katere se zdravite, in od vašega odziva na zdravljenje.

- **Tablete pogoltnite cele.** Ne lomite jih, ne žvečite in ne drobite.
- **Vedno vzemite celotni odmerek,** ki vam ga je predpisal zdravnik. Nikdar ne vzemite le dela tablete.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Lamotrigin Arrow tablete, kot bi smeli:

Če kdorkoli vzame preveč zdravila Lamotrigin Arrow tablete:

➔ **Nemudoma se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.** Če je mogoče, mu pokažite škatlico zdravila Lamotrigin Arrow tablete.

Če vzamete preveč zdravila Lamotrigin Arrow tablete, se vam lahko pojavi kateri od naslednjih simptomov:

- hitro, neobvladljivo gibanje zrkla (*nistagmus*),
- okornost in pomanjkljiva usklajenost gibov, ki prizadene ravnotežje (*ataksija*),
- izguba zavesti ali koma.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Lamotrigin Arrow tablete

Ne vzemite dodatnih tablet ali dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

➔ **Z zdravnikom se posvetujte, kako naj znova začnete jemati zdravilo.** Pomembno je, da to storite.

Ne nehajte jemati zdravila Lamotrigin Arrow tablete, ne da bi vam to naročil zdravnik.

Zdravilo Lamotrigin Arrow tablete jemljite toliko časa, kot vam svetuje zdravnik. Ne nehajte ga jemati, če vam tega ne naroči zdravnik.

Če jemljete zdravilo Lamotrigin Arrow tablete za epilepsijo

Pri prenehanju jemanja zdravila Lamotrigin Arrow tablete **je pomembno, da odmerek zmanjšujete postopoma** približno 2 tedna. Če zdravilo Lamotrigin Arrow tablete nehate jemati nenadoma, se vam lahko epilepsija povrne ali poslabša.

Če jemljete zdravilo Lamotrigin Arrow tablete za bipolarno motnjo

Pri zdravlju Lamotrigin Arrow tablete lahko mine nekaj časa, preden začne delovati, zato ni verjetno, da se boste takoj počutili bolje. Če prenehate jemati zdravilo Lamotrigin Arrow tablete, vam odmerka ni treba zmanjševati postopoma. Kljub temu se morate najprej posvetovati z zdravnikom, če želite opustiti jemanje zdravila Lamotrigin Arrow tablete.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi zdravilo Lamotrigin Arrow tablete neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Potencialno resna kožna reakcija: nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Maloštevilnim bolnikom se lahko med jemanjem zdravila Lamotrigin Arrow tablete pojavi alergijska reakcija ali potencialno resna kožna reakcija, ki se lahko razvije v še resnejšo in celo smrtno nevarno, če ni zdravljena.

Verjetnost pojava teh simptomov je večja v prvih mesecih zdravljenja z zdravilom Lamotrigin Arrow tablete, zlasti če je začetni odmerek prevelik, če je povečanje odmerka prehitro, ali če je zdravilo Lamotrigin Arrow tablete uporabljeno skupaj z drugim zdravilom, imenovanim *valproat*. Nekateri od teh simptomov so pogostejši pri otrocih, zato morajo biti starši posebej pozorni nanje.

Med simptomi teh reakcij so:

- **izpuščaj ali pordelost kože**, ki se lahko razvije v hude kožne reakcije, vključno z razširjenim izpuščajem z mehurji in lupljenjem kože, zlasti okrog ust, nosu, oči in spolovil (*Stevens–Johnsonov sindrom*), obsežno lupljenje kože (več kot 30 % telesne površine – *toksična epidermalna nekroliza*)
- **vnetje ust ali oči**
- **zvišana telesna temperatura**, gripi podobni simptomi ali zaspanost
- **oteklost obraza ali oteklost bezgavk** na vratu, v pazduhah ali dimljah
- **nepričakovana krvavitev ali podplutbe**, ali pomodrelost prstov
- **vnetje žrela** ali pogostejše pojavljanje okužb (npr. prehladov) kot ponavadi

V številnih primerih so naštetih simptomi sicer znaki manj resnih neželenih učinkov. **Vendar se morate zavedati, da so lahko resni in se lahko razvijejo v resnejše težave** (npr. odpoved organov), če niso zdravljeni. Če opazite katerega od teh simptomov:

➔ **Se čim prej posvetujte z zdravnikom.** Zdravnik bo morda naročil preiskave jeter, ledvic ali krvi, ali vam bo naročil, da nehate jemati zdravilo Lamotrigin Arrow tablete.

Zelo pogosti neželeni učinki

Pojavijo se lahko **pri več kot 1 od 10 oseb**:

- glavobol
- omotica
- zaspanost
- okornost in pomanjkljiva usklajenost gibov (*ataksija*)
- dvojen vid ali zamegljen vid
- slabost v želodcu (*navzeja*) ali bruhanje
- izpuščaj

Pogosti neželeni učinki

Pojavijo se lahko **pri največ 1 od 10** oseb:

- napadalnost ali razdražljivost
- hitro, neobvladljivo gibanje zrkla (*nistagmus*)
- grobo ali drobno tresenje
- težave s spanjem
- driska
- suha usta
- utrujenost
- bolečine v hrbtu, sklepih ali drugje

Redki neželeni učinki

Pojavijo se lahko **pri največ 1 od 1.000** oseb:

- srbenje oči z izcedkom in krastami na vekah (*konjunktivitis*)
- hudo kožno reakcijo (*Stevens–Johnsonov sindrom*): glejte tudi informacije na začetku poglavja 4)

Zelo redki neželeni učinki

Pojavijo se lahko **pri največ 1 od 10.000** oseb:

- halucinacije ("videnje" ali "slišanje" stvari, ki jih v resnici ni)
- zmedenost ali vznemirjenost
- občutek "majavosti" ali negotovosti, pri premikanju
- neobvladljivi gibi telesa (*tiki*), neobvladljivi mišični spazmi, ki prizadenejo oči, glavo in trup (*horeoatetoz*), ali drugi nenavadni gibi telesa, npr. trzanje, tresenje ali togost
- huda kožna reakcija (*toksična epidermalna nekroliza*): glejte tudi informacije na začetku poglavja 4)
- pogostejši epileptični napadi pri bolnikih, ki imajo epilepsijo
- spremenjeno delovanje jeter, ki se kaže s spremenjenimi izvidi preiskav krvi, odpoved jeter
- spremembe, ki se lahko pokažejo pri preiskavah krvi, med njimi zmanjšano število rdečih krvnih celic (*anemija*), zmanjšano število belih krvnih celic (*levkopenija*, *nevtropenija*, *agranulocitoza*), zmanjšano število krvnih ploščic (*trombocitopenija*), zmanjšano število vseh teh vrst celic (*pancitopenija*) in bolezen kostnega mozga, ki jo imenujemo *aplastična anemija*
- motnja strjevanja krvi, ki lahko povzroči nepričakovane krvavitve ali podplutbe (*diseminirana intravaskularna koagulacija*)
- zvišana telesna temperatura (*vročina*)
- oteklost (*edem*) obraza ali oteklost bezgavk na vratu, v pazduhah ali dimljah (*limfadenopatija*)
- poslabšanje simptomov pri bolnikih, ki imajo Parkinsonovo bolezen

Drugi neželeni učinki

Drugi neželeni učinki so se pojavili pri majhnem številu bolnikov, a njihova natančna pogostnost ni znana. Skupina simptomov, ki se pojavljajo skupaj vključujejo:

- zvišano telesno temperaturo, slabost v želodcu, bruhanje, glavobol, tog vrat in izredno občutljivost za močno svetlobo. To je lahko posledica vnetja oči, ki prekrivajo možgane in hrbtne možgane (*meningitis*).

Če se vam pojavijo neželeni učinki

➔ Če katerikoli neželeni učinek postane hud ali moteč, ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, **obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.**

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA LAMOTRIGIN ARROW TABLETE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Lamotrigin Arrow tablete ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na pretisnih omotih ali škatli poleg oznake "Uporabno do". Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Za shranjevanje zdravila Lamotrigin Arrow tablete niso potrebna posebna navodila.

Neporabljeno zdravilo Lamotrigin Arrow tablete ne smete odvreči v odpadne vode ali gospodinjske odpadke. Zdravilo vrnite farmacevtu, ki ga bo odstranil tako, da to ne bo škodovalo okolju.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Lamotrigin Arrow tablete

Zdravilna učinkovina je lamotrigin (ena tableta vsebuje 25 mg, 50 mg, 100 mg ali 200 mg lamotrigina).

Pomožne snovi so laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza, rumeni železov oksid (E172), povidon K30, natrijev karboksimetilškrob (vrsta A), magnezijev stearat, smukec in brezvodni koloidni silicijev dioksid.

Izgled zdravila Lamotrigin Arrow tablete in vsebina pakiranja

25 mg tablete - tablete so ploščate, okrogle oblike, svetlo rumene barve z vtisom L | 25 na eni strani in logotipom Arrow na drugi strani.

50 mg tablete - tablete so ploščate, okrogle oblike, svetlo rumene barve z vtisom L | 50 na eni strani in logotipom Arrow na drugi strani.

100 mg tablete - tablete so ploščate, okrogle oblike, svetlo rumene barve z vtisom L | 100 na eni strani in logotipom Arrow na drugi strani.

200 mg tablete - tablete so ploščate, okrogle oblike, svetlo rumene barve z vtisom L | 200 na eni strani in logotipom Arrow na drugi strani.

Na eni strani tablete je zareza. Zareza je namenjena razpolavljanju tablet zaradi lažjega požiranja in ne za delitev tablet na enake dele.

Tablete so na voljo v pretisnih omotih.

Lamotrigin Arrow 25 mg in 50 mg tablete

Tablete so na voljo v škatlah s pretisnimi omoti po 14, 21, 30, 42, 50, 56, 100 in 200 tablet.

Lamotrigin Arrow 100 mg tablete

Tablete so na voljo v škatlah s pretisnimi omoti po 21, 42, 50, 56, 60, 100 in 200 tablet.

Lamotrigin Arrow 200 mg tablete

Tablete so na voljo v škatlah s pretisnimi omoti po 21, 42, 50, 56, 100 in 200 tablet.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdajanje zdravila Lamotrigin Arrow tablete

Rp – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Arrow Generics Limited

Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4SZ

Velika Britanija

Izdelovalci

Arrow Generics Limited

Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4SZ

Velika Britanija

Juta Pharma GmbH
Gutenbergstraße 13, 24941 Flensburg
Nemčija

Selamine Limited T/A Arrow Generics Limited
Unit 4/5 Willborough Cluster, Clonshaugh Industrial Estate, Clonshaugh, Dublin 17
Irska

Arrow Pharm (Malta) Limited
HF 62, Hal Industrial Estate, Birzebbugia BBG06
Malta

Medicofarma S.A.
Ul. Żelazna 58, 00-866 Varšava
Poljska

Akmon farmacevtske industrije d.o.o.
Industrijska cesta 1J, 1290 Grosuplje
Slovenija

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Velika Britanija	Lamotrigine 25mg, 50mg, 100mg in 200mg Tablets
Belgija	Lamotrigine Arrow Generics 25mg, 50mg, 100mg in 200mg Tabletten
Češka	Lamotrigin Arrow 25mg, 50mg in 100mg
Nemčija	Lamo-Q 25mg, 50mg, 100mg in 200mg Tabletten
Danska	Lamotrigin Arrow
Madžarska	Lamotrigine Arrow 25mg, 50mg in 100mg tabletta
Italija	Lamotrigina Breath 25mg, 50mg, 100mg in 200mg compresse
Malta	Lamotrigine 25mg, 50mg, 100mg in 200mg Tablets
Poljska	Lamotrigine Arrow 25mg, 50mg in 100mg tabletki
Portugalska	Lamotrigina arrowblue 25mg, 50mg, 100mg in 200mg Comprimidos
Slovenija	Lamotrigin Arrow 25mg, 50mg, 100mg in 200mg tablete

Navodilo je bilo odobreno 25. 2. 2011.