

NAVODILO ZA UPORABO

Corsodyl Mint 20 mg/10 ml raztopina za izpiranje ust klorheksidinijev diglukonat

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo, se v roku sedmih dni posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Corsodyl Mint in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Corsodyl Mint
3. Kako uporabljati zdravilo Corsodyl Mint
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Corsodyl Mint
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO CORSODYL MINT IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Corsodyl Mint je raztopina za izpiranje ust, ki vsebuje učinkovino **klorheksidinijev diglukonat**.

Zdravilo deluje protimikrobno in pomaga uničiti raznovrstne bakterije in kvasovke pa tudi nekatere glivice in viruse, ki povzročajo okužbe in vnetje v ustih.

Zdravilo Corsodyl Mint uporabljamo za:

- preprečevanje nastajanja zobnih oblog;
- kot pomoč pri zdravljenju in preprečevanju vnetja dlesni (gingivitisa), ki povzroči pordelost, otekanje in tudi krvavitve dlesni;
- za vzdrževanje ustne higiene, še posebej v okoliščinah, ko ščetkanje ni mogoče (npr. po kirurških posegih v ustni votlini, pri telesno ali duševno prizadetih bolnikih);
- za pospeševanje celjenja dlesni po periodontalnem kirurškem posegu v ustih;
- za zdravljenje ustnih razjed;
- za zdravljenje glivičnih okužb (kandidoznih okužb) in vnetja ustne sluznice (stomatitisa) pri uporabi zobnih protez.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO CORSODYL MINT

Ne uporabljajte zdravila Corsodyl Mint

- če ste alergični (preobčutljivi) na klorheksidin ali katerikoli drugo sestavino zdravila Corsodyl Mint, navedeno v poglavju 6.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Corsodyl Mint

- Zdravilo je namenjeno le za uporabo v ustni votlini, zato raztopine ne smete pogoltniti.
- Pazite, da raztopina **ne pride v stik z očmi ali ušesi**. Če raztopina pride v stik z očmi, jo takoj in temeljito izperite z vodo.

- Ne uporabljajte zobne paste ter zdravila Corsodyl Mint istočasno, saj običajne zobne paste pogosto vsebujejo sestavine (anionska sredstva), ki niso združljive s tem zdravilom (glejte tudi poglavje 3).

Uporaba drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Zdravilo Corsodyl Mint ni združljivo z anionskimi snovmi, kot je na primer natrijev lavril sulfat, ki je pogosto prisoten v zobnih pastah (glejte tudi poglavje 3).

Uporaba zdravila Corsodyl Mint skupaj s hrano in pijačo

Sočasno uživanje čaja, kave in rdečega vina lahko povzroči površinsko obarvanje zob in jezika. Ti madeži niso trajni in jih lahko v veliki meri preprečite z zmanjšanjem uživanja čaja, kave in rdečega vina.

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Pri uporabi zdravila Corsodyl Mint v obdobju nosečnosti in dojenja niso potrebni posebni previdnostni ukrepi.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Študij o vplivu zdravila Corsodyl Mint na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Corsodyl Mint

Zdravilo vsebuje makrogolglicerol hidrosistearat, ki lahko povzroči kožne reakcije.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO CORSODYL MINT

Pri uporabi zdravila Corsodyl Mint natančno upoštevajte navodila v nadaljevanju. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Pri uporabi zdravila Corsodyl Mint upoštevajte naslednje:

- Zdravilo je namenjeno za uporabo v ustni votlini. **Ne pogoltnite** raztopine po izpiranju!
- **Izogibajte se stiku raztopine z očmi ali ušesi.** V primeru, da raztopina pride v stik z očmi, jo takoj in temeljito izperite.
- Pred uporabo zdravila si umijte zobe z običajno zobno pasto in usta dobro izperite z vodo. Zdravilo je nezdružljivo z anionskimi sredstvi (npr. natrijev lavrilsulfat), ki so pogosto prisotna v zobnih pastah. Zato najprej uporabite zobno pasto, nato si izperite usta z vodo in šele potem uporabite zdravilo. Lahko pa uporabite zdravilo ob drugem času dneva. Umivanje zob neposredno po uporabi zdravila lahko zmanjša njegovo učinkovitost.

Uporaba pri odraslih

Izpirajte si usta z **10 ml** raztopine za izpiranje ust. Usta izpirajte **dvakrat na dan** za približno **1 minuto**. Pri odmerjanju si pomagajte z navojno zaporko, ki je tudi odmerni pripomoček in ima črto, ki označuje 10 ml.

Če imate načrtovan kirurški poseg v ustni votlini, si 1 minuto izpirajte usta z 10 ml ustne vode.

Če uporabljate zobno protezo in zdravite vnetje ustne sluznice, redno čistite zobno protezo in jo namakajte v raztopini za izpiranje ust dvakrat na dan po 15 minut.

Za zdravljenje vnetja dlesni uporabljajte raztopino za izpiranje ust približno en mesec.

Pri ustnih razjedah in glivičnih okužbah v ustni votlini nadaljujte z zdravljenjem še 48 ur po ugotovljenem kliničnem izboljšanju.

V primeru, da simptomi ne izginejo, se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.

Uporaba pri starostnikih

Starostniki upoštevajte navodila glede odmerjanja, ki veljajo za uporabo pri odraslih, razen če sta zobozdravnik ali zdravnik predpisala drugače.

Uporaba pri otrocih, starejših od 12 let

Pri otrocih, starejših od 12 let, se upoštevajo enaka navodila glede odmerjanja, ki veljajo za uporabo pri odraslih, razen če sta zobozdravnik ali zdravnik predpisala drugače.

Uporaba pri otrocih, mlajših od 12 let

Uporaba zdravila Corsodyl Mint pri otrocih, mlajših od 12 let, ni priporočljiva, razen če tako predlaga strokovni zdravstveni delavec.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Corsodyl Mint, kot bi smeli

Če ste nenamerno zaužili večje količine raztopine za izpiranje ust ali jih je zaužil otrok, se posvetujte z zobozdravnikom ali z zdravnikom.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Corsodyl Mint

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi zdravilo Corsodyl Mint neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Zelo redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

- preobčutljivost
- takojšnja preobčutljivostna reakcija (anafilaksa)

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- površinsko obarvanje zob in jezika (tudi silikatnih ali kompozitnih prevlek na zobeh)
- občutljivost in draženje v ustni votlini
- luščenje, občutljivost in otekanje ustne sluznice
- otekanje obušesne slinavke
- na začetku zdravljenja se lahko pojavijo prehodne motnje okusa, otrplost, mravljinčenje in pekoč občutek na jeziku

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA CORSODYL MINT

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila Corsodyl Mint ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Corsodyl Mint

Zdravilna učinkovina je klorheksidinijev diglukonat. 10 ml raztopine za izpiranje ust vsebuje 20 mg klorheksidinijevega diglukonata.

Pomožne snovi so: 96% etanol, makrogolglicerol hidroksistearat, tekoči nekristalizirajoči sorbitol, aroma poprove mete in prečiščena voda.

Izgled zdravila Corsodyl Mint in vsebina pakiranja

Zdravilo Corsodyl Mint je bistra ali rahlo opalescentna, brezbarvna raztopina z vonjem poprove mete. Na voljo je v 300 ml plastenki z navojno zaporko, ki služi tudi kot odmerni pripomoček, s črto, ki označuje 10 ml.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

GSK d.o.o., Ljubljana, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana

Izdelovalca

SmithKline Beecham Consumer Healthcare, Norreys Drive, Maidenhead, Berkshire, SL6 4BL, Velika Britanija

in

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG, Benzstraße 25, D-71083 Herrenberg, Nemčija

Navodilo je bilo odobreno 30.10.2014.

Corsodyl Mint je zaščitena blagovna znamka skupine podjetij GlaxoSmithKline.