

## Navodilo za uporabo

**Etorikoksib STADA 60 mg filmsko obložene tablete**

**Etorikoksib STADA 90 mg filmsko obložene tablete**

**Etorikoksib STADA 120 mg filmsko obložene tablete**

etorikoksib

### **Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

### **Kaj vsebuje navodilo**

1. Kaj je zdravilo Etorikoksib STADA in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Etorikoksib STADA
3. Kako jemati zdravilo Etorikoksib STADA
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Etorikoksib STADA
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

## **1. Kaj je zdravilo Etorikoksib STADA in za kaj ga uporabljamo**

### **Kaj je zdravilo Etorikoksib STADA?**

- Zdravilo Etorikoksib STADA vsebuje učinkovino etorikoksib. Etorikoksib spada v skupino zdravil, imenovanih selektivni zaviralci COX-2. Ti spadajo v družino zdravil, ki jih imenujemo nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID – *non-steroidal anti-inflammatory drugs*).

### **Za kaj se uporablja zdravilo Etorikoksib STADA?**

- Zdravilo Etorikoksib STADA pomaga ublažiti bolečino in otekanje (vnetje) sklepov in mišic pri bolnikih, starih 16 let ali več, z osteoartrozo, revmatoidnim artritisom, ankilozirajočim spondilitisom ali s protinom.
- Zdravilo Etorikoksib STADA se uporablja tudi za kratkotrajno zdravljenje zmerne bolečine po kirurških posegih na zobeh pri bolnikih, starih 16 let ali več.

### **Kaj je osteoartraza?**

Osteoartraza je bolezen sklepov. Je posledica postopne obrabe hrustanca, ki prekriva končne dele kosti. To povzroči otekanje (vnetje), bolečino, občutljivost, okornost in neuporabnost sklepov.

### **Kaj je revmatoidni artritis?**

Revmatoidni artritis je dolgotrajna vnetna bolezen sklepov. Povzroča bolečino, okornost, otekanje in vedno slabšo gibljivost sklepov. Povzroča lahko tudi vnetje v drugih delih telesa.

### **Kaj je protin?**

Protin je bolezen, za katero so značilni nenadni, ponavljajoči se napadi zelo bolečega vnetja sklepov in rdečina sklepov.

Povzročajo jo kristali, ki se kopičijo v sklepih.

### **Kaj je ankilozirajoči spondilitis?**

Ankilozirajoči spondilitis je vnetna bolezen hrbtenice in večjih sklepov.

## **2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Etorikoksib STADA**

### **Ne jemljite zdravila Etorikoksib STADA:**

- če ste alergični na etorikoksib ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6),
- če ste alergični na nesteroidna protivnetna zdravila, vključno z acetilsalicilno kislino in zaviralci COX-2 (glejte poglavje 4 Možni neželeni učinki),
- če imate želodčno razjedo ali krvavitev iz želodca ali črevesa,
- če imate hudo bolezen jeter,
- če imate hudo bolezen ledvic,
- če ste ali bi lahko bili noseči ali če dojite (glejte ‘Nosečnost, dojenje in plodnost’),
- če ste mlajši od 16 let,
- če imate vnetno črevesno bolezen, kot so Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis ali kolitis,
- če imate visok krvni tlak, ki kljub zdravljenju ni nadzorovan (če niste prepričani, ali je vaš krvni tlak ustrezno nadzorovan, se posvetujte s svojim zdravnikom),
- če je zdravnik pri vas ugotovil bolezen srca, vključno s srčnim popuščanjem (zmerno ali hudo obliko), angino pectoris (bolečina v prsnem košu),
- če ste imeli srčni infarkt, obvodno operacijo koronarnih arterij (“bypass”), bolezen perifernih arterij (slabo prekrvavitev v nogah ali stopalih zaradi zožanih ali zamašenih arterij),
- če ste imeli katero koli vrsto možganske kapi (vključno z malo možgansko kapjo ali prehodno možgansko ishemijo (TIA)). Etorikoksib lahko rahlo poveča tveganje za pojav srčnega infarkta in možganske kapi, zato ga bolniki, ki so že imeli težave s srcem ali doživeli možgansko kap, ne smejo uporabljati.

Če menite, da kar koli od navedenega velja za vas, tablet ne jemljite, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom.

### **Opozorila in previdnostni ukrepi**

Pred začetkom jemanja zdravila Etorikoksib STADA se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, če:

- ste kdaj imeli krvavitve ali razjede v želodcu,
- ste dehidrirani, na primer zaradi dolgotrajnega bruhanja ali driske,
- imate otekline zaradi zadrževanja tekočine v telesu,
- ste kdaj imeli srčno popuščanje ali katero koli drugo bolezen srca,
- ste kdaj imeli visok krvni tlak. Zdravilo Etorikoksib STADA lahko pri nekaterih ljudeh poviša krvni tlak, še posebej pri zdravljenju z velikimi odmerki. Zato vam bo zdravnik želel občasno preveriti krvni tlak,
- ste kdaj imeli katero koli bolezen jeter ali ledvic,
- se zdravite zaradi okužbe. Zdravilo Etorikoksib STADA lahko prikrije zvišano telesno temperaturo, ki je znak okužbe,

- imate sladkorno bolezen, povišano vrednost holesterola ali kadite. Ti dejavniki lahko povečajo tveganje za bolezni srca,
- ste ženska in se trudite zanositi,
- ste stari nad 65 let.

Če niste prepričani, ali kaj od naštetega velja za vas, **se, preden začnete jemati zdravilo Etorikoksib STADA, posvetujte z zdravnikom**, da se prepričate, če je zdravilo primerno za vas.

Pri starejših odraslih bolnikih je zdravilo Etorikoksib STADA enako učinkovito kot pri mlajših odraslih bolnikih. Če ste starejši od 65 let, vas bo zdravnik temu primerno nadzoroval. Pri bolnikih, starejših od 65 let, odmerjanja ni treba prilagoditi.

### **Otroci in mladostniki**

Tega zdravila ne dajte otrokom in mladostnikom, mlajšim od 16 let.

### **Druga zdravila in zdravilo Etorikoksib STADA**

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Še posebej če jemljete katero od spodaj navedenih zdravil, bo zdravnik po začetku zdravljenja z zdravilom Etorikoksib STADA morda želel spremljati vaše zdravstveno stanje, da bi ugotovil, če zdravila pravilno delujejo:

- zdravila za redčenje krvi (antikoagulanti), kot je varfarin,
- rifampicin (antibiotik),
- metotreksat (zdravilo za zaviranje imunskega sistema, ki se pogosto uporablja pri zdravljenju revmatoidnega artritisa),
- ciklosporin ali takrolimus (zdravila za zaviranje imunskega sistema),
- litij (zdravilo za zdravljenje nekaterih oblik depresije),
- zdravila za zdravljenje visokega krvnega tlaka in srčnega popuščanja, imenovana zaviralci ACE in antagonisti receptorjev angiotenzina, na primer enalapril in ramipril ter losartan in valsartan,
- diuretike (zdravila za odvajanje vode iz telesa),
- digoksin (zdravilo za zdravljenje srčnega popuščanja in motenj srčnega ritma),
- minoksidil (zdravilo za zdravljenje visokega krvnega tlaka),
- salbutamol v obliki tablet ali peroralne raztopine (zdravilo za zdravljenje astme),
- kontracepcijske tablete (kombinacija lahko poveča tveganje za neželene učinke),
- hormonsko nadomestno zdravljenje (kombinacija lahko poveča tveganje za neželene učinke),
- acetilsalicilno kislino; tveganje za želodčne razjede je večje, če jemljete zdravilo Etorikoksib STADA skupaj z acetilsalicilno kislino,
  - *acetilsalicilno kislino za preprečevanje srčnega infarkta ali možganske kapi:*  
zdravilo Etorikoksib STADA lahko jemljete z majhnimi odmerki acetilsalicilne kisline. Če trenutno jemljete majhne odmerke acetilsalicilne kisline za preprečevanje srčnega infarkta ali možganske kapi, s tem ne prekinite, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom,
  - *acetilsalicilno kislino in druga nesteroidna protivnetna zdravila:*  
skupaj z zdravilom Etorikoksib STADA ne smete jemati večjih odmerkov acetilsalicilne kisline ali drugih protivnetnih zdravil.

### **Zdravilo Etorikoksib STADA skupaj s hrano**

Pričetek delovanja zdravila Etorikoksib STADA je lahko hitrejši, če se ga jemlje brez hrane.

JAZMP-R/001-23.12.2020

## **Nosečnost, dojenje in plodnost**

### *Nosečnost*

Tablet zdravila Etorikoksib STADA med nosečnostjo ne smete jemati. Če ste noseči, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, teh tablet ne jemljite. Če zanosite, prenehajte jemati zdravilo Etorikoksib STADA in se posvetujte z zdravnikom. Če ste negotovi ali potrebujete dodaten nasvet, se posvetujte z zdravnikom.

### *Dojenje*

Ni znano, ali se etorikoksib izloča v materino mleko. Če dojite ali nameravate dojiti, se pred začetkom jemanja zdravila Etorikoksib STADA posvetujte z zdravnikom. Med jemanjem zdravila Etorikoksib STADA ne smete dojiti.

### *Plodnost*

Če nameravate zanositi, se uporabe zdravila Etorikoksib STADA ne priporoča.

## **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Pri nekaterih bolnikih, ki so jemali zdravilo Etorikoksib STADA, so poročali o omotici in zaspanosti. Če se pri vas pojavita omotica ali zaspanost, ne smete voziti. Če se pri vas pojavita omotica ali zaspanost, ne delajte z orodji ali stroji.

## **Zdravilo Etorikoksib STADA vsebuje laktozo**

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom.

## **Zdravilo Etorikoksib STADA vsebuje natrij**

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na tableto, kar v bistvu pomeni 'brez natrija'.

## **3. Kako jemati zdravilo Etorikoksib STADA**

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Ne vzemite večjega odmerka od priporočenega za vašo bolezen. Zdravnik se bo občasno želel pogovoriti z vami o vašem zdravljenju. Pomembno je, da jemljete najmanjši odmerek, ki vam ublaži bolečino, in da zdravila Etorikoksib STADA ne jemljete dlje, kot je potrebno. To je zaradi tveganja za srčni infarkt in možgansko kap, ki se pri daljšem zdravljenju lahko poveča, še posebej pri velikih odmerkih.

Na razpolago so različne jakosti tega zdravila in glede na vašo bolezen, vam bo zdravnik predpisal jakost tablet, ki bo ustrezna za vas.

### **Priporočeni odmerek je:**

#### *Osteoartrza*

Priporočeni odmerek je 30 mg enkrat na dan, po potrebi se poveča na največ 60 mg enkrat na dan.

#### *Revmatoidni artritis*

Priporočeni odmerek je 60 mg enkrat na dan, po potrebi se poveča na največ 90 mg enkrat na dan.

JAZMP-R/001-23.12.2020

#### *Ankilozirajoči spondilitis*

Priporočeni odmerek je 60 mg enkrat na dan, po potrebi se poveča na največ 90 mg enkrat na dan.

#### *Stanja z akutno bolečino*

Zdravilo Etorikoksib STADA se lahko uporablja samo v obdobju akutne bolečine.

#### *Protin*

Priporočeni odmerek je 120 mg enkrat na dan. Uporablja se lahko le pri akutni bolečini in največ 8 dni.

#### *Bolečine po operaciji zob*

Priporočeni odmerek je 90 mg enkrat na dan in največ 3 dni.

#### **Bolniki z boleznimi jeter**

- Če imate blago bolezen jeter, ne smete jemati odmerka, večjega od 60 mg na dan.
- Če imate **zmerno** bolezen jeter, ne smete jemati odmerka, večjega od **30 mg na dan**.

#### **Uporaba pri otrocih in mladostnikih**

Otroci in mladostniki, mlajši od 16 let, ne smejo jemati zdravila Etorikoksib STADA.

#### **Starejši**

Pri starejših bolnikih prilagoditev odmerka ni potrebna. Tako kot pri drugih zdravilih, je pri starejših bolnikih potrebna previdnost.

#### **Način uporabe**

Zdravilo Etorikoksib STADA je za peroralno uporabo. Tablete vzemite enkrat na dan. Zdravilo Etorikoksib STADA lahko vzamete s hrano ali brez nje.

#### **Če ste vzeli večji odmerek zdravila Etorikoksib STADA, kot bi smeli**

Nikoli ne vzemite več tablet, kot vam je priporočil zdravnik. Če ste pomotoma vzeli preveč tablet, takoj poiščite zdravniško pomoč.

#### **Če ste pozabili vzeti zdravilo Etorikoksib STADA**

Pomembno je, da zdravilo Etorikoksib STADA jemljete tako, kot vam je predpisal zdravnik. Če ste izpustili odmerek, nadaljujte z jemanjem zdravila naslednji dan ob običajnem času. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjo tableto.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

#### **4. Možni neželeni učinki**

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

**Če se pri vas pojavi kateri od spodnjih znakov, morate prenehati jemati zdravilo Etorikoksib STADA in se takoj posvetujte z zdravnikom (glejte poglavje 2 Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Etorikoksib STADA):**

- zasoplost, bolečine v prsnem košu ali otekanje gležnjev (če se pojavijo na novo ali se poslabšajo),
- porumenitev kože in oči (zlatenica) – to so znaki težav z jetri,

JAZMP-R/001-23.12.2020

- močne ali vztrajne bolečine v trebuhu ali črno blato,
- alergijska reakcija, ki lahko vključuje težave s kožo, kot so razjede ali mehurji, ali otekanje obraza, ustnic, jezika ali žrela, kar lahko povzroči težave pri dihanju.

Med zdravljenjem z zdravilom Etorikoksib STADA se lahko pojavijo naslednji neželeni učinki:

**Zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov):**

- bolečina v trebuhu.

**Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):**

- alveolarni osteitis (vnetje in bolečina po izdrtju zoba),
- otekanje nog in/ali stopal zaradi zadrževanja tekočine v telesu (edemi),
- omotica, glavobol,
- palpitacije (hiter ali nepravilen srčni utrip), nepravilen srčni ritem (aritmija),
- zvišan krvni tlak,
- piskanje ali zasoplost (bronhospazem),
- zaprtje, vetrovi (povečano nastajanje plinov), gastritis (vnetje želodčne sluznice), zgaga, driska, slaba prebava (dispepsija)/neugodje v trebuhu, siljenje na bruhanje, slabost (bruhanje), vnetje požiralnika, razjede v ustih,
- spremembe v izvidih krvnih testov za delovanje jeter,
- modrice,
- šibkost in utrujenost, gripi podobna bolezen.

**Občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):**

- gastroenteritis (vnetje prebavnega trakta, ki zajema tako želodec kot tanko črevo/trebušna gripa), okužba zgornjih dihal, okužba sečil,
- spremembe vrednosti laboratorijskih izvidov (zmanjšano število rdečih krvnih celic, zmanjšano število belih krvnih celic, zmanjšano število trombocitov),
- preobčutljivost (alergijska reakcija, vključno s koprivnico, ki je lahko tako resna, da zahteva takojšnjo zdravniško pomoč),
- zmanjšan ali povečan apetit, povečanje telesne mase,
- tesnoba, depresija, zmanjšana sposobnost jasnega mišljenja, videnje, čutenje ali slišanje stvari, ki jih ni (halucinacije),
- spremembe okušanja, nespečnost, odrevenelost ali mravljinčenje, zaspanost,
- zamegljen vid, draženje in rdečina oči,
- zvonjenje v ušesih, vrtoglavica (občutek vrtenja, čeprav ste pri miru),
- nenormalni srčni ritem (atrijska fibrilacija), hiter srčni utrip, srčno popuščanje, občutek tiščanja, stiskanja ali teže v prsnem košu (angina pectoris), srčni infarkt,
- zardevanje, možganska kap, mala možganska kap (prehodna možganska ishemija), hudo zvišanje krvnega tlaka, vnetje krvnih žil,
- kašelj, zasoplost, krvavitev iz nosu,
- napihnjenost v predelu želodca ali črevesja, spremembe v prebavi, suha usta, želodčna razjeda, vnetje želodčne sluznice, ki je lahko resno in lahko vodi do krvavitev, sindrom razdraženega črevesja, vnetje trebušne slinavke,
- otekanje obraza, izpuščaj na koži ali srbenje kože, rdečina kože,
- mišični krč/spazem, mišična bolečina/okorelost,

- visoke vrednosti kalija v krvi, spremembe v izvidih krvnih ali urinskih testov za delovanje ledvic, hude težave z ledvicami,
- bolečina v prsnem košu.

**Redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):**

- angioedem (alergijska reakcija z otekanjem obraza, ustnic, jezika in/ali žrela, kar lahko povzroči težave pri dihanju ali požiranju in je lahko tako resna, da zahteva takojšnjo zdravniško pomoč)/anafilaktične/anafilaktoidne reakcije, vključno s šokom (huda alergijska reakcija, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč),
- zmedenost, nemir,
- težave z jetri (hepatitis),
- nizke vrednosti natrija v krvi,
- odpoved jeter, porumenitev kože in/ali oči (zlatenica),
- hude kožne reakcije.

**Poročanje o neželenih učinkih**

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na  
 Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke  
 Sektor za farmakovigilanco  
 Nacionalni center za farmakovigilanco  
 Slovenčeva ulica 22  
 SI-1000 Ljubljana  
 Tel: +386 (0)8 2000 500  
 Faks: +386 (0)8 2000 510  
 e-pošta: [h-farmakovigilanca@jazmp.si](mailto:h-farmakovigilanca@jazmp.si)  
 spletna stran: [www.jazmp.si](http://www.jazmp.si)  
 S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

**5. Shranjevanje zdravila Etorikoksib STADA**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake "EXP". Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

**6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije**

**Kaj vsebuje zdravilo Etorikoksib STADA**

- Učinkovina je etorikoksib.
  - Etorikoksib STADA 60 mg: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 60 mg etorikoksiba.
  - Etorikoksib STADA 90 mg: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 90 mg etorikoksiba.
  - Etorikoksib STADA 120 mg: Ena filmsko obložena tableta vsebuje 120 mg etorikoksiba.
- Druge sestavine zdravila so: brezvodni kalcijev hidrogenfosfat, mikrokristalna celuloza, povidon K29-32, magnezijev stearat, premreženi natrijev karmelozat, hipromeloza, laktoza monohidrat, titanov dioksid (E171), triacetin.
  - 60- in 120-miligramske tablete vsebujejo tudi indigotin (E132) in rumeni železov oksid (E172).

### **Izgled zdravila Etorikoksib STADA in vsebina pakiranja**

Zdravilo Etorikoksib STADA filmsko obložene tablete je na voljo v treh jakostih:

60-miligramske tablete so temno zelene, okrogle filmsko obložene tablete, izbočene na obeh straneh.  
 90-miligramske tablete so bele, okrogle filmsko obložene tablete, izbočene na obeh straneh.  
 120-miligramske tablete so svetlo zelene, okrogle filmsko obložene tablete, izbočene na obeh straneh.

[60 mg]

Pakiranja po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100 filmsko obloženih tablet v pretisnih omotih.  
 Pakiranje po 100 filmsko obloženih tablet v vsebniku z zamaškom in sušilnim sredstvom (silikagel).  
 Sušilno sredstvo je v vsebniku zato, da tablete ostanejo suhe in ga ne smete pogoltniti.

[90 mg]

Pakiranja po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100 filmsko obloženih tablet v pretisnih omotih.  
 Pakiranje po 100 filmsko obloženih tablet v vsebniku z zamaškom in sušilnim sredstvom (silikagel).  
 Sušilno sredstvo je v vsebniku zato, da tablete ostanejo suhe in ga ne smete pogoltniti.

[120 mg]

Pakiranja po 5, 7, 14, 20, 28, 30, 98 filmsko obloženih tablet v pretisnih omotih.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

### **Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Etorikoksib STADA**

Rp – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

### **Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec**

#### **Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom**

STADA Arzneimittel AG  
 Stadastrasse 2–18  
 61118 Bad Vilbel  
 Nemčija

#### **Proizvajalci**

Pharmacare Premium Ltd.  
 HHF 003, Hal Far Industrial Estate  
 Birzebbuga, BBG 3000  
 Malta



Delorbis Pharmaceuticals Ltd.  
17 Athinon Street, Ergates Industrial Area  
2643 Ergates, Nicosia  
Ciper

STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2–18  
61118 Bad Vilbel  
Nemčija

Centrafarm Services B.V.  
Nieuwe Donk 9  
NL-4879 Ac Etten-Leur  
Nizozemska

**Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:**

Belgija	Etoricoxib EG 30/60/90/120 mg comprimé pelliculé
Finska	Etoricoxib STADA 30/60/90/120 mg tabletit, kalvopäällysteiset
Italija	ETORICOXIB EG
Luksemburg	Etoricoxib EG 30/60/90/120 mg comprimés pelliculés sécables
Nemčija	Etoricoxib AL 30/60/90/120 mg Filmtabletten
Nizozemska	Etoricoxib CF 60/90 mg filmomhulde tabletten
Portugalska	Etoricoxib Ciclum
Romunija	Toricoxal
Slovenija	Etorikoksib STADA 60/90/120 mg filmsko obložene tablete
Španija	Etoricoxib STADA 30/60/90/120 mg comprimidos recubiertos con película
Švedska	Etoricoxib STADA 30/60/90/120 mg filmdragerade tabletter

**Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 23.12.2020.**