

HEPARON JUNIOR

Dietno (dieteti no) flivilo za posebne zdravstvene namene.

Za dietetsko uravnavanje pri akutni in kroni ni holestati ni jetrni odpovedi pri dojen kih in malih otrocih.

Heparon Junior je prehransko popolno flivilo v prahu, ki vsebuje beljakovine kravjega mleka, ogljikove hidrate, ma– obe, minerale in elemente v sledovih. Za izdelek je zna ilna znatno pove ana vsebnost vitaminov A, D, E in K ter pove ana vsebnost aminokislin z razvejano verigo in cinka. Izdelek ima nizko vsebnost natrija in zelo nizko vsebnost bakra.

POMEMBNO OBVESTILO:

Izdelek se uporablja izklju no pod zdravni–kim nadzorom.

Izdelek je primeren za dojen ke in male otroke.

Izdelek je primeren kot edini vir prehrane.

Izdelek ni primeren za parenteralno uporabo.

Opozorilo:

Heparon Junior je kontraindiciran pri galaktozemiji.

Ob hranjenju s Heparonom Junior je potrebno pri otroku kontrolirati nivo v ma– obah topnih vitaminov in bakra.

Priprava in doziranje:

Koli ino obroka in razred itev mora dolo iti zdravnik in je odvisna od starosti, telesne tefe in zdravstvenega stanja otroka.

ZA ZDRAVJE DOJEN KA JE POTREBNO NATAN NO UPOTMTEVATI NAVODILA ZA PRIPRAVO IN DOZIRANJE.

Priporo ena koncentracija obroka je 18% m/v. Pri tej koncentraciji (t.j. 18 g Heparon Junior na 100 ml obroka) je osmolarnost 357 mosm/kg. Za dosego tolerance se na za etku lahko uporabljajo nifje koncentracije obroka.

Vedno uporabite **4 merice izdelka za vsakih 90 ml vode**. Do vrha napolnjena in z noflem do roba poravnana prilofena merica vsebuje 4,5 g izdelka. Vedno uporabite prilofeno merico.

Priprava obroka:

1. Temeljito si umijte roke z milom pod teko o vodo.
2. Prekuhajte stekleni ko in pokrov ek z dudo v vodi. Vre naj 5 ó 10 min.
3. Vodo za pripravo obroka zavrite v pokritem lon ku. Vre naj vsaj 10 min, nato jo pustite v lon ku, da se ohladi na približno 50°C.
4. Merico napolnite z izdelkom in jo poravnajte z noflem do roba. Uporabite vedno le prilofeno merico.
5. V stekleni ko z vodo dodajte to no dolo eno –tevilno meric izdelka. Stekleni ko zaprite z zama–kom in jo mo no stresajte.
6. Temperaturo obroka preverite na svojem zapestju. Idealna temperatura obroka je, ko ne utite ne toplo ne hladno.

Prosimo vas, da vedno pripravite svefl obrok in da ostankov hrane ne uporabljate ponovno. Pripravljen obrok je potrebno porabiti v eni uri. Ne pogrevajte obroka v mikrovalovni pe ici zaradi mofnosti pregretja.

Skrb za otrokove zobke:

Z ustrezno higieno poskrbimo fle za prve otrokove zobke (–e posebej pred spanjem).

Na in shranjevanja:

Izdelek hranite v hladnem in suhem prostoru. Po uporabi plo evinko tesno zaprite. Po odprtju vsebino porabite v 4 tednih.

Popre na hranilna vrednost		Na 100 g izdelka	Na 100 ml obroka			Na 100 g izdelka	Na 100 ml obroka
Energijska vrednost							
	kJ	2016	363	Jod	g	55	9,9
	kcal	480	86,4	Molibden	g	17,2	3,1
Beljakovine	g	11,1	2	Selen	g	13,2	2,4
od teh aminokislina z razvejano verigo	%	30		Krom	g	11,6	2,1
Ogljikovi hidrati	g	64,2	11,6	Vitamini			
od teh sladkorji	g	15,9	2,9	Vitamin A	g RE	567	102
Ma– obe	g	19,9	3,6	Vitamin D3	g	9,7	1,7
od teh nasi ene ma– . k.	g	11	2	Vitamin E	mg -TE	10,7	1,9
enkrat nenasi ene ma– . k.	g	2,9	0,52	Vitamin C	mg	58	10,4
ve krat nenasi ene ma– . k.	g	5,1	0,92	Vitamin K	g	25	4,5
Vlaknine	g	0	0	Vitamin B1	mg	0,32	0,06
Minerali				Vitamin B2	mg	0,55	0,1
Natrij	mg(mmol)	72 (3,1)	13(0,56)	Niacin	mg (mg NE)	4,8 (7,5)	0,86(1,4)
Kalij	mg(mmol)	420(10,8)	75,6(1,9)	Vitamin B6	mg	0,96	0,17
Klorid	mg(mmol)	260 (7,4)	46,8(1,3)	Folat	g	55	9,9
Kalcij	mg	509	91,6	Vitamin B12	g	1,1	0,2
Fosfor	mg	277	50	Biotin	g	8,3	1,5
Magnezij	mg	39	7	Pantotenska			
fielzo	mg	7,2	1,3	kislina	mg	2,4	0,43
Baker	g	220	39,6	Holin	mg	39	7
Cink	mg	7,2	1,3	Inozitol	mg	24	4,3
Mangan	mg	0,48	0,09	L-karnitin	mg	7	0,92
				Tavrin	mg	30	3,9

Uporabno najmanj do: Rok uporabe in serija sta odtisnjena na dnu plo evinke.

Pakiranje: plo evinka 400 g

Proizvajalec: SHS International Ltd., 100 Wavertree Boulevard, Liverpool, Velika Britanija

Zastopnik in distributer: KEFO d.o.o. Brn i eva 29, 1231 Ljubljana- rnu e, tel. zt. 01 563 4143

HEPARON JUNIOR

Dietno (dieteti no) flivilo za posebne zdravstvene namene.

Za dietetsko uravnavanje pri akutni in kroni ni holestati ni jetrni odpovedi pri dojen kih in malih otrocih.

Heparon Junior je prehransko popolno flivilo v prahu, ki vsebuje beljakovine kravjega mleka, ogljikove hidrate, ma– obe, minerale in elemente v sledovih. Za izdelek je zna ilna znatno pove ana vsebnost vitaminov A, D, E in K ter pove ana vsebnost aminokislin z razvejano verigo in cinka. Izdelek ima nizko vsebnost natrija in zelo nizko vsebnost bakra.

POMEMBNO OBVESTILO:

Izdelek se uporablja izklju no pod zdravni–kim nadzorom.

Izdelek je primeren za dojen ke in male otroke.

Izdelek je primeren kot edini vir prehrane.

Izdelek ni primeren za parenteralno uporabo.

Opozorilo:

Heparon Junior je kontraindiciran pri galaktozemiji.

Ob hranjenju s Heparonom Junior je potrebno pri otroku kontrolirati nivo v ma– obah topnih vitaminov in bakra.

Priprava in doziranje:

Koli ino obroka in razred itev mora dolo iti zdravnik in je odvisna od starosti, telesne teffe in zdravstvenega stanja otroka.

ZA ZDRAVJE DOJEN KA JE POTREBNO NATAN NO UPO^{TE}EVATI NAVODILA ZA PRIPRAVO IN DOZIRANJE.

Priporo ena koncentracija obroka je 18% m/v. Pri tej koncentraciji (t.j. 18 g Heparon Junior na 100 ml obroka) je osmolarnost 357 mosm/kg. Za dosego tolerance se na za etku lahko uporabljajo nifje koncentracije obroka.

Vedno uporabite **4 merice izdelka za vsakih 90 ml vode**. Do vrha napolnjena in z noflem do roba poravnana prilojena merica vsebuje 4,5 g izdelka. Vedno uporabite prilojeno merico.

Priprava obroka:

1. Temeljito si umijte roke z milom pod teko o vodo.
2. Prekuhajte stekleni ko in pokrov ek z dudo v vodi. Vre naj 5 ó 10 min.
3. Vodo za pripravo obroka zavrite v pokritem lon ku. Vre naj vsaj 10 min, nato jo pustite v lon ku, da se ohladi na približno 50°C.
4. Merico napolnite z izdelkom in jo poravnajte z noflem do roba. Uporabite vedno le prilojeno merico.
5. V stekleni ko z vodo dodajte to no dolo eno –tevilno meric izdelka. Stekleni ko zaprite z zama–kom in jo mo no stresajte.
6. Temperaturo obroka preverite na svojem zapestju. Idealna temperatura obroka je, ko ne utite ne toplo ne hladno.

Prosimo vas, da vedno pripravite sveži obrok in da ostankov hrane ne uporabljate ponovno. Pripravljen obrok je potrebno porabiti v eni uri. Ne pogrevajte obroka v mikrovalovni peči zaradi možnosti pregretja.

Skrb za otrokove zobke:

Z ustrezno higieno poskrbimo fle za prve otrokove zobke (–e posebej pred spanjem).

Na in shranjevanja:

Izdelek hranite v hladnem in suhem prostoru. Po uporabi plo evinko tesno zaprite. Po odprtju vsebino porabite v 4 tednih.

Popre na hranilna vrednost		Na 100 g izdelka	Na 100 ml obroka			Na 100 g izdelka	Na 100 ml obroka
Energijska vrednost							
	kJ	2016	363	Jod	g	55	9,9
	kcal	480	86,4	Molibden	g	17,2	3,1
Beljakovine	g	11,1	2	Selen	g	13,2	2,4
od teh aminokislina z razvejano verigo	%	30		Krom	g	11,6	2,1
Ogljikovi hidrati	g	64,2	11,6	Vitamini			
od teh sladkorji	g	15,9	2,9	Vitamin A	g RE	567	102
Ma– obe	g	19,9	3,6	Vitamin D3	g	9,7	1,7
od teh nasi ene ma– . k.	g	11	2	Vitamin E	mg -TE	10,7	1,9
enkrat nenasi ene ma– . k.	g	2,9	0,52	Vitamin C	mg	58	10,4
ve krat nenasi ene ma– . k.	g	5,1	0,92	Vitamin K	g	25	4,5
Vlaknine	g	0	0	Vitamin B1	mg	0,32	0,06
Minerali				Vitamin B2	mg	0,55	0,1
Natrij	mg(mmol)	72 (3,1)	13(0,56)	Niacin	mg (mg NE)	4,8 (7,5)	0,86(1,4)
Kalij	mg(mmol)	420(10,8)	75,6(1,9)	Vitamin B6	mg	0,96	0,17
Klorid	mg(mmol)	260 (7,4)	46,8(1,3)	Folat	g	55	9,9
Kalcij	mg	509	91,6	Vitamin B12	g	1,1	0,2
Fosfor	mg	277	50	Biotin	g	8,3	1,5
Magnezij	mg	39	7	Pantotenska			
fielezo	mg	7,2	1,3	kislina	mg	2,4	0,43
Baker	g	220	39,6	Holin	mg	39	7
Cink	mg	7,2	1,3	Inozitol	mg	24	4,3
Mangan	mg	0,48	0,09	L-karnitin	mg	7	0,92
				Tavrin	mg	30	3,9

Uporabno najmanj do: Rok uporabe in serija sta odtisnjena na dnu plo evinke.

Pakiranje: plo evinka 400 g

Proizvajalec: SHS International Ltd., 100 Wavertree Boulevard, Liverpool, Velika Britanija

Zastopnik in distributer: IRIS MEDNARODNA TRGOVINA d.o.o.
Cesta v Gorice 8, Ljubljana
tel.: 01 200 66 79, fax: 01 200 66 60