

NAVODILO ZA UPORABO

Gaviscon 100 mg/20 mg v 1 ml peroralna suspenzija natrijev alginat, kalijev hidrogenkarbonat

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 7 dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Gaviscon in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Gaviscon
3. Kako jemati zdravilo Gaviscon
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Gaviscon
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO GAVISCON IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Gaviscon spada v skupino zdravil, imenovano "zaviralci refluxa".

Zdravilo Gaviscon oblikuje zaščitno plast, ki se zadržuje na površini želodčne vsebine in preprečuje zatekanje vsebine iz želodca v požiralnik, ter olajša simptome zgage in bolečino ter neugodje, ki ga povzroči želodčna kislina.

Zdravilo Gaviscon uporabljamo za zdravljenje simptomov, ki so povezani z zatekanjem želodčne kisline v požiralnik (refluks), kot sta zgaga in prebavne motnje (povezane z refluksom), na primer po obrokih, med nosečnostjo ali pri bolnikih s simptomi, povezanimi z vnetjem požiralnika zaradi refluxa.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO GAVISCON

Ne jemljite zdravila Gaviscon, če ste alergični (preobčutljivi) na katerokoli sestavino zdravila Gaviscon.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Gaviscon:

Zdravilo Gaviscon vsebuje majhne količine natrija (4,6 mmol na 10 ml), kalija (2,0 mmol na 10 ml) in kalcija. Če ste na dieti z omejenim vnosom katerekoli od teh snovi, se pred začetkom jemanja tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

O vsebnosti teh soli v zdravilu se morate s svojim zdravnikom posvetovati tudi, če imate ali ste kdaj imeli hujšo obliko bolezni ledvic ali srca, ker lahko nekatere soli vplivajo na te bolezni.

Zdravilo vsebuje metilparahidroksibenzoat (E218) in propilparahidroksibenzoat (E216), ki lahko povročita alergijske reakcije (te so lahko zapoznele).

Nosečnost in dojenje:

Zdravilo Gaviscon lahko uporabljate tudi med nosečnostjo in dojenjem. Kot pri vseh drugih zdravilih, je treba omejiti trajanje zdravljenja na najkrajši možen čas.

Če imate zmanjšano količino želodčne kisline, se posvetujte s svojim zdravnikom. V tem primeru je učinkovitost zdravila lahko manjša.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO GAVISCON

Odrasli, vključno s starostniki, in otroci, stari 12 let in starejši: 5 do 10 ml (ena do dve polni žlički) po obroku in pred spanjem, oziroma kot vam je bilo predpisano.

Otroci, mlajši od 12 let, lahko zdravilo uporabljajo le po nasvetu zdravnika.

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. Nadaljujte z jemanjem zdravila kot običajno.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se lahko pojavi občutek napihnjenosti trebuha. Najverjetneje vam to ne bo škodilo, vendar se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom, če stanje ne mine.

Pred uporabo zdravilo dobro pretresite.

Po zaužitju zdravila:

Če se znaki vaše bolezni v 7 dneh ne izboljšajo, se posvetujte s svojim zdravnikom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Zelo redko (pojavijo se lahko pri manj kot 1 od 10.000 bolnikov) se pri bolnikih lahko pojavijo znaki alergijske reakcije na sestavine zdravila. Simptomi alergijske reakcije lahko vključujejo kožni izpuščaj, srbenje, težko dihanje, omotico ali otekanje obraza, ustnic, jezika ali žrela. Če se pojavi katerikoli od teh ali katerikoli drug neželeni učinek, prenehajte z jemanjem zdravila in se nemudoma posvetujte s svojim zdravnikom.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA GAVISCON

Zdravila Gaviscon ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake EXP. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravilo porabite v roku 6 mesecev po odprtju.

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Ne shranjujte v hladilniku.

Pred prvo uporabo preverite, če je pečat zaporke nepoškodovan.

Zdravila ne smete odvreči v odpadno vodo ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Zdravilni učinkovini sta natrijev alginat in kalijev hidrogenkarbonat.

En 10 ml odmerok peroralne suspenzije vsebuje 1000 mg natrijevega alginata in 200 mg kalijevega hidrogenkarbonata.

Pomožne snovi so: kalcijev karbonat, karbomer, metilparahidroksibenzoat (E218) in propilparahidroksibenzoat (E216), natrijev saharinat, natrijev hidroksid, aroma komarčka in prečiščena voda. Zdravilo Gaviscon ne vsebuje sladkorja ali glutena.

Gaviscon je na voljo v steklenicah, ki vsebujejo 150 ml, 300 ml ali 500 ml (na voljo le v lekarnah) peroralne suspenzije.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način izdajanja zdravila

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,
Dansom Lane,
Hull, HU8 7DS,
Velika Britanija

Odgovoren za trženje v Sloveniji

PharmaSwiss d.o.o, Ljubljana

Datum revizije navodila:

17.01.2012