

NAVODILO ZA UPORABO

Lamisil CS 10 mg/g dermalno pršilo, raztopina terbinafinijev klorid

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najboljše koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 14 dneh, se posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Lamisil CS in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Lamisil CS
3. Kako uporabljati zdravilo Lamisil CS
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Lamisil CS
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO LAMISIL CS IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Lamisil CS je antimikotik, ki se uporablja na koži. Deluje tako, da uničuje glive, ki povzročajo spremembe na koži.

Zdravilo Lamisil CS se uporablja za zdravljenje:

- atletskega stopala (*tinea pedis*),
- glivične okužbe kože v predelu dimelj (*tinea cruris*),
- krast, lišajev (*tinea corporis*),
- okužba kože, imenovane *pityriasis versicolor*, ki jo povzroča glivica iz skupine kvasovk

Če niste prepričani glede vzroka vaše okužbe, se pred uporabo zdravila Lamisil CS posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO LAMISIL CS

Ne uporabljajte zdravila Lamisil CS

- če ste **alergični** (preobčutljivi) na **zdravilno učinkovino** ali **katerokoli sestavino** zdravila Lamisil CS - glejte seznam sestavin v poglavju 6.

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če to velja za vas in ne uporabljajte zdravila Lamisil CS.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Lamisil CS

- **Otroci in mladostniki, mlajši od 18 let**, ne smejo uporabljati zdravila Lamisil CS.
- Zdravila Lamisil CS ne smete uporabljati **na obrazu** ali **na poškodovani ali otekli koži**, kjer lahko alkohol deluje dražeče.
- Ne vdihujte pršila.

- Zdravilo Lamisil CS vsebuje alkohol, zato ga ne uporabljajte v bližini odprtega ognja.
- Samo za zunanjo uporabo.

Uporaba drugih zdravil

- Sočasno z zdravilom Lamisil CS **na prizadeto področje ne nanašajte drugih zdravil ali zdravljenj** (tudi tistih, ki ste jih dobili brez recepta).
- **Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta**, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Nosečnost in dojenje

- **Če ste noseči ali mislite, da ste noseči, povejte svojemu zdravniku ali farmacevtu.** Zdravila Lamisil CS ne smete uporabljati med nosečnostjo, razen če je to nujno potrebno.
- **Zdravila Lamisil CS med dojenjem ne smete uporabljati.** Dojenčki ne smejo priti v stik z zdravljeno kožo, vključno s prsmi.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Lamisil CS nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Lamisil CS

Zdravilo vsebuje propilenglikol, ki lahko povzroči draženje kože.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO LAMISIL CS

Zdravilo Lamisil CS nanašajte na prizadeta področja, kot sledi v nadaljevanju.

Kako pogosto uporabljati pršilo

Pršilo nanašajte na prizadeto področje enkrat ali dvakrat na dan, kot je napisano spodaj, razen, če vam zdravnik naroči drugače:

- **atletsko stopalo:** nanašajte zdravilo enkrat na dan en teden
- **glivična okužba kože v predelu dimelj in kraste, lišaji:** nanašajte zdravilo enkrat na dan en teden
- **okužba kože, ki jo povzroča glivica iz skupine kvasovk (*pityriasis versicolor*):** nanašajte zdravilo dvakrat na dan en teden

Kako uporabljati zdravilo

Natančno sledite navodilom za uporabo:

- Prizadeto mesto in okolico očistite in osušite ter si umijte roke.
- Odprite tako, da odstranite pokrovček z vsebnika.
- Razpršite zadostno količino raztopine, tako da z njo temeljito navlažite prizadeto mesto in okolico. Vsebnik je oblikovan tako, da omogoča razprševanje pršila v več smeri brez prekinitiv.
- Po vsaki uporabi obrišite presežek raztopine z odprtine na razpršilni šobi s čisto, suho krpo.
- S pokrovčkom zaprite vsebnik.
- Po uporabi pršila si umijte roke, saj lahko drugače razširite okužbo tudi na druge dele kože ali na druge ljudi.

Izboljšanje na koži naj bi se pojavilo v nekaj dneh, vendar pa lahko traja tudi do 4 tedne, da se koža popolnoma obnovi.

Če po dveh tednih zdravljenja z zdravilom Lamisil CS ne opazite nobenih znakov izboljšanja, vprašajte za nasvet svojega zdravnika ali farmacevta.

Pomoč pri zdravljenju

Prizadeto mesto redno umivajte. Osušite ga previdno brez drgnjenja, samo popivajte. Čeprav je prizadeto mesto lahko srbeče, ga ne praskajte, saj lahko s tem povzročite več škode in upočasnite proces zdravljenja ali razširite okužbo.

Uporabljajte svoje brisače in oblačila in jih ne delite z drugimi, saj se okužbe zlahka prenašajo. Da bi se zaščitili pred ponovno okužbo, oblačila in brisače pogosto perite.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Lamisil CS

Če ste pozabili uporabiti dermalno pršilo, ga nanesite takoj, ko je to mogoče in nato nadaljujte z uporabo kot običajno. Če se spomnite šele ob času naslednjega nanosa, nanesite običajno količino zdravila, in normalno nadaljujte z uporabo.

Uporabljajte dermalno pršilo kot je predpisano. To je pomembno, saj se z izpuščanjem odmerkov, poveča tveganje za ponovitev okužbe.

Če ste pomotoma zaužili nekaj zdravila Lamisil CS

O tem takoj obvestite zdravnika, ki vam bo svetoval, kaj storiti.

Če ste zdravilo Lamisil CS pomotoma zanesli v oči

Temeljito izpirajte oči s tekočo vodo. Če še vedno občutite kakršnokoli nelagodje, obiščite svojega zdravnika.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Lamisil CS neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

- V zelo redkih primerih se lahko pojavi alergija na zdravilo Lamisil CS, kar lahko povzroči **oteklino in bolečino, izpuščaje ali koprivnico**. Če se pojavi kateri od teh simptomov, takoj prenehajte z uporabo pršila in o tem obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.
- Po uporabi zdravila Lamisil CS se lahko pri nekaterih ljudeh pojavijo **rdečina, srbenje ali pekoč občutek**. To so neškodljivi, blagi neželeni učinki, ki jih lahko pričakujemo pri nanašanju pršila.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA LAMISIL CS

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravilo Lamisil CS ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in vsebniku poleg oznake EXP. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

To je vsebnik pod tlakom: zaščitite ga pred svetlobo in ne izpostavljajte temperaturi nad 50 °C. Ne prebadajte ali sežigajte, niti po uporabi.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Po uporabi zaprite vsebnik s pokrovčkom.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Lamisil CS

- Zdravilna učinkovina je terbinafinijev klorid. En gram zdravila Lamisil CS vsebuje 10 mg terbinafinijevega klorida (1% w/w).
- Pomožne snovi so prečiščena voda, 96 odstotni etanol, propilenglikol (E1520), makrogol cetil stearileter.

Izgled zdravila Lamisil CS in vsebina pakiranja

To zdravilo je bistro, brezbarvno do rahlo rumeno dermalno pršilo, raztopina.

Zdravilo se nahaja v vsebniku pod tlakom, ki je opremljen z ventilom, zaprtim z aluminijastim laminatnim mošnjičkom in s sprožilom.

Na voljo so pakiranja po 15 ml ali 30 ml.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila Lamisil CS

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Novartis Consumer Health GmbH
Zielstattstrasse 40
81379 München
Nemčija

Izdelovalec

Novartis Consumer Health
Zielstattstrasse 40
81379 München
Nemčija

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Avstrija:	Lamisil Spray
Belgija:	Lamisil Spray 1%, huidspray, oplossing
Bolgarija:	Lamisil Derspray (Ламизил Плюс Спрей)
Ciper:	Lamisil Continuous Spray
Češka:	Lamisil tlakový sprej 10 mg/g
Danska:	Lamisil Aerosol
Estonija:	Lamisil
Finska:	Lamisil Spray 1 % sumute iholle, liuos
Francija:	LAMISILSPRAY 1%, solution pour application cutanée
Nemčija:	Lamisil Spray
Grčija:	Lamisil Continuous Spray
Madžarska:	Lamisil Derma Folytonos szórású 1% külsőleges oldatos spray
Islandija:	Lamisil Aerosol
Latvija:	Lamisil Spray 1% uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums
Litva :	Lamisil 1% odos purškamas tirpalas

Luksemburg:	Lamisil Spray 1%, solution pour pulvérisation cutanée
Nizozemska :	Lamisil Spray 1%, huidspray, oplossing
Norveška:	Lamisil
Poljska:	Lamisilatt Spray
Portugalska:	Lamisil Spray, 10 mg/g, solução para pulverização cutânea
Romunija:	Lamisil Spray 1% spray cutanat, soluție
Slovaška:	Lamisil tlakový sprej
Slovenija:	Lamisil CS 10 mg/g dermalno pršilo, raztopina
Švedska:	Lamisil Dermspray

Navodilo je bilo odobreno 20. julija 2012.