

Navodilo za uporabo

Latanoprost/timolol Pharmathen 0,05 mg/5 mg v 1 ml kapljice za oko, raztopina latanoprost/timolol

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katerekoli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen
3. Kako uporabljati zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen vsebuje dve učinkovini: latanoprost in timolol. Latanoprost sodi v skupino zdravil, ki jih imenujemo analogi prostaglandina. Timolol sodi v skupino zdravil, ki jih imenujemo antagonisti adrenergičnih receptorjev beta. Latanoprost deluje tako, da poveča naravno odtekanje tekočine iz očesa v krvni obtok. Timolol deluje tako, da upočasnjuje nastajanje tekočine v očesu.

Zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen uporabljamo za zniževanje tlaka v očesu, če imate bolezen, imenovano glavkom odprtega zakotja ali očesno hipertenzijo. Obe motnji sta povezani s povišanim tlakom v očesu, kar lahko sčasoma prizadene vaš vid. Zdravnik vam bo običajno predpisal zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen, če druga zdravila niso bila dovolj učinkovita.

Zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen lahko uporabljajo odrasli moški in ženske (vključno s starejšimi bolniki), ni pa ga priporočljivo uporabljati pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let.

Zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen kapljice za oko, raztopina je sterilna raztopina brez konzervansov.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen

Ne uporabljajte zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen

- če ste alergični na latanoprost ali timolol, antagoniste adrenergičnih receptorjev beta ali katerikoli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6);
- če imate ali ste v preteklosti imeli težave z dihanjem, kot so astma, hud kronični obstruktivni bronhitis (huda bolezen pljuč, ki lahko povzroči piskanje pri dihanju, oteženo dihanje in/ali dolgotrajen kašelj);
- če imate hude težave s srcem ali motnje srčnega ritma.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen se posvetujte z zdravnikom, če za vas velja oziroma je v preteklosti veljalo karkoli od naslednjega:

- če imate koronarno bolezen srca (med simptomi so lahko bolečina ali občutek tiščanja v prsnem košu, zadihanost in občutek davljenja), srčno popuščanje, nizek krvni tlak;

- če imate motnje srčnega utripa, kot je počasen srčni utrip;
- če imate težave z dihanjem, astmo ali kronično obstruktivno pljučno bolezen;
- če imate težave z nezadostno prekrvavitvijo (kot je Raynaudova bolezen ali Raynaudov sindrom);
- če imate sladkorno bolezen, saj lahko timolol prikrije znake in simptome prenizke ravni sladkorja v krvi;
- če imate prekomerno delujočo žlezo ščitnico (hipertiroidizem), saj lahko timolol prikrije znake in simptome le-te;
- če imate predvideno kakršnokoli operacijo na očeh (vključno z operacijo sive mreže) ali ste imeli operacijo na očeh v preteklosti;
- če imate težave z očmi (kot je bolečina v očeh, draženje oči, vnetje oči ali zamegljen vid);
- če imate težave zaradi suhih oči;
- če nosite kontaktne leče. Zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen lahko še vedno uporabljate, vendar sledite navodilom za uporabnike kontaktnih leč v poglavju 3.
- če veste, da imate angino pectoris (natančneje tip, ki ga poznamo kot Prinzmetalova angina);
- če imate ali ste kdaj imeli hude alergijske reakcije, ki običajno zahtevajo zdravljenje v bolnišnici;
- če ste kdaj imeli ali trenutno imate virusno okužbo očesa, ki jo povzroča virus herpes simpleksa (HSV).

Pred kakršnokoli operacijo zdravniku povejte, da uporabljate zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen, saj lahko timolol spremeni učinek nekaterih zdravil, ki se uporabljajo med anestezijo.

Otroci in mladostniki

Zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen ni priporočljivo uporabljati pri otrocih in mladostnikih, mlajših od 18 let.

Druga zdravila in zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katerokoli drugo zdravilo, vključno s kapljicami za oko in zdravili, ki ste jih dobili brez recepta.

Zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen lahko vpliva na delovanje drugih zdravil, ki jih uporabljate. Lahko pa ta zdravila vplivajo tudi na delovanje zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen. To vključuje tudi druge kapljice za oko za zdravljenje glavkoma. Obvestite zdravnika, če jemljete ali pa boste morda začeli jemati zdravila za zniževanje krvnega tlaka, zdravila za zdravljenje bolezni srca ali zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni.

Še posebej je pomembno, da se z zdravnikom ali farmacevtom posvetujete, če veste, da uporabljate katero izmed naslednjih vrst zdravil:

- prostaglandine, analoge prostaglandina ali derivate prostaglandina (uprabljajo se za krčenje in sprostitve gladkih mišic, širjenje in zoženje krvnih žil, uravnavanje krvnega tlaka in uravnavanje vnetja),
- antagoniste adrenergičnih receptorjev beta (t.i. beta blokatorje; uporabljajo se za uravnavanje visokega krvnega tlaka, zdravljenje angine pectoris, nekaterih nenormalnih srčnih ritmov, srčnega infarkta, anksioznosti (tesnobe), migrene, glavkoma in simptomov čezmernega delovanja ščitnice),
- adrenalin (uporablja se za zdravljenje življenjsko ogrožajočih alergijskih reakcij, ki jih povzročajo ugrizi ali piki žuželk, hrana, zdravila, lateks in drugi vzroki),
- zdravila za uravnavanje visokega krvnega tlaka, kot so peroralni zaviralci kalcijevih kanalčkov, gvanetidin, antiaritmiki, digitalisovi glikozidi ali parasimpatikomimetiki,
- kinidin (za zdravljenje bolezni srca in nekaterih vrst malarije),
- zdravili za zdravljenje depresije, imenovani fluoksetin in paroksetin.

Zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen skupaj s hrano in pijačo

Normalni obroki, hrana ali pijača nimajo vpliva na čas ali način uporabe zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Nosečnost

Zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen med nosečnostjo ne smete uporabljati, razen če zdravnik meni, da je to potrebno. Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete to zdravilo.

Dojenje

Zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen med dojenjem ne smete uporabljati. Zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen lahko prehaja v materino mleko. Posvetujte se z zdravnikom, preden med dojenjem vzamete katerokoli zdravilo.

Plodnost

V študijah na živalih latanoprost in timolol nista imela vpliva na plodnost samcev ali samic.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Pri uporabi zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen se lahko za kratek čas pojavi zamegljen vid. Če se to zgodi, ne vozite, ne uporabljajte orodij ali upravljajte strojev, dokler se vam vid ne zbistri.

Zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen vsebuje makrogolglicerol hidroksistearat 40

To zdravilo vsebuje makrogolglicerol hidroksistearat 40, ki lahko povzroči kožne reakcije.

Zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen vsebuje fosfatne pufre

Zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen vsebuje 6,54 mg fosfatov v enem mililitru raztopine. Če imate hudo poškodbo prosojnega, sprednjega dela očesa (roženica), lahko fosfati v zelo redkih primerih privedejo do pojava zamegljenih lis na roženici, ki so posledica nalaganja kalcija med zdravljenjem.

3. Kako uporabljati zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Priporočeni odmerek za odrasle (vključno s starejšimi bolniki) je ena kapljica enkrat na dan v obolelo oko (oboleli očesi).

Zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen ne uporabljajte več kot enkrat na dan, ker se lahko pri pogostejši uporabi zmanjša učinkovitost zdravljenja.


Zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen uporabljajte po navodilih zdravnika, dokler vam zdravnik ne naroči, da prenehajte.

Pri uporabi zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen vas bo zdravnik morda napotil na dodatne preiskave delovanja srca in ožilja.

Uporabniki kontaktnih leč

Če nosite kontaktne leče, jih morate pred uporabo zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen odstraniti. Po uporabi zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen počakajte najmanj 15 minut, preden zopet vstavite kontaktne leče.

Navodila za uporabo

 1a  1b	• Plastenko (kapalni vsebnik) (slika 1a) vzemite iz kartonske škatle in na škatlo na označenem mestu zabeležite datum odpiranja. • Pripravite plastenko z zdravilom in ogledalo. • Umijte si roke. • Odstranite zaporko (slika 1b).
 2	• Plastenko obrnite na glavo, tako da s palcem podpirate zgornji rob, z ostalimi prsti pa držite za dno. Pred prvo uporabo 15-krat zaporedoma pritisnite na plastenko (slika 2). Če so kapljice morda videti belkasto, to ni razlog za zaskrbljenost.
 3	• Nagnite glavo nazaj. S čistim prstom veko povlecite navzdol, tako da med veko in očesom nastane »žepek«. Kapljica bo padla vanj (slika 3). • Konico plastenke približajte očesu. Po potrebi si pomagajte z ogledalom.
 4  5	• S kapalko se ne dotikajte očesa, veke, površine okoli njiju ali drugih površin. Tako bi lahko kapljice okužili. • Nežno pritisnite na dno plastenke, da iztisnete po eno kapljico zdravila (slika 4). • Če kapljica pade mimo očesa, poskusite znova. • Po uporabi zdravila za 2 minuti s prstom pritisnite na kotichek očesa ob nosu (slika 5). To pomaga preprečiti prehajanje raztopine kapljic za oko v druge dele telesa.

	• Če kapljice uporabljate v obeh očesih, te korake ponovite še za drugo oko. • Plastenko čvrsto zaprite z zaporko takoj po uporabi. • Istočasno uporabljajte le eno plastenko zdravila. Zaporke ne odpirajte, dokler niste pripravljeni na uporabo plastenke. • Plastenko je treba zavreči 4 tedne po prvem odprtju, da ne bi prišlo do okužb, in začeti uporabljati novo.
--	--

Če zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen uporabljate z drugimi kapljicami za oko

Počakajte, da med uporabo zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen in drugih kapljic za oko mine vsaj 5 minut.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen, kot bi smeli

Če boste v oko kanili preveč kapljic, boste morda občutili rahlo draženje očesa, lahko pride do solzenja in pordečitve oči. To bo minilo, če pa ste zaskrbljeni, za nasvet vprašajte zdravnika.

Če zaužijete zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen

Če pomotoma zaužijete zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen, se morate posvetovati z zdravnikom. Če zaužijete veliko količino zdravila, lahko pride do slabosti, bolečin v želodcu, utrujenosti, vročinskih oblivov, omotice in potenja.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen

Nadaljujte z običajnim odmerkom ob običajnem času. Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek. Če ste glede česa negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Ponavadi lahko nadaljujete z uporabo kapljic, razen če so neželeni učinki resni. Če ste zaskrbljeni, se pogovorite z zdravnikom ali farmacevtom. Ne prenehajte uporabljati zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen, ne da bi se prej pogovorili z zdravnikom.

Spodaj so naštetih znani neželeni učinki, ki se lahko pojavijo pri uporabi kapljic za oko, ki vsebujejo učinkovini latanoprost in timolol. Najpomembnejši neželeni učinek je možnost postopne spremembe barve oči, ki je lahko tudi trajna. Kapljice za oko, ki vsebujejo učinkovini latanoprost in timolol, lahko povzročijo tudi resne spremembe v delovanju vašega srca. Če opazite spremembe v srčnem utripu ali delovanju srca, se posvetujte z zdravnikom in mu povejte, da uporabljate zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen.

Znani so naslednji neželeni učinki uporabe kapljic za oko, ki vsebujejo učinkovini latanoprost in timolol:

Zelo pogosti neželeni učinki (pojavi se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov):

- postopna sprememba barve vaših oči, zaradi povečane količine rjavega barvila v obarvanem delu očesa (ki se imenuje šarenica). Če imate oči mešane barve (modro-rjave, sivo-rjave, rumeno-rjave ali zeleno-rjave), obstaja večja verjetnost, da se pri vas pojavi ta sprememba, kot če imate oči enotne barve (modre, sive, zelene ali rjave). Da pride do morebitne spremembe barve vaših oči, lahko traja tudi nekaj let. Sprememba barve je lahko trajna in je lahko bolj opazna, če zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen uporabljate samo na enem očesu. Ne kaže, da bi bile s spremembo barve oči povezane še kakšne druge težave. Po prekinitvi uporabe zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen se barva oči ne spreminja več.

Pogosti neželeni učinki (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):

- draženje oči (pekoč občutek, praskajoč občutek, srbenje, zbadanje ali občutek tujka v očesu) ter

bolečina v očesu.

Občasni neželeni učinki (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- glavobol.
- rdeče oči, vnetje očesne veznice (konjunktivitis), zamegljen vid, močnejše solzenje, vnetje vek, vnetje ali draženje površine očesa.
- kožni izpuščaj ali srbenje (pruritus).

Ostali neželeni učinki

Kot druga zdravila za uporabo v očeh tudi latanoprost in timolol preideta v kri. Pogostnost neželenih učinkov je pri uporabi kapljic za oči manjša, kot če so zdravila zaužita skozi usta ali injicirana.

Čeprav jih niso opazili pri uporabi kapljic za oko, ki vsebujejo obe učinkovini, latanoprost in timolol, so o naslednjih neželenih učinkih poročali v povezavi s posameznima učinkovinama v zdravilu Latanoprost/timolol Pharmathen in se torej lahko pojavijo tudi pri uporabi zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen. Našteti neželeni učinki vključujejo tudi neželene učinke, opažene pri skupini antagonistov adrenergičnih receptorjev beta (npr. timolol), ko so jih uporabljali pri zdravljenju očesnih bolezni:

- pojav virusne okužbe očesa, ki jo povzroča virus herpes simpleksa (HSV)
- alergijske reakcije, ki zajamejo celo telo in vključujejo otekanje pod kožo, ki se lahko pojavi na obrazu in okončinah ter lahko ovira dihalne poti in tako povzroča težave pri požiranju ali dihanju, koprivnica ali srbeč izpuščaj, izpuščaj, omejen na manjši predel ali razširjen po celem telesu, srbenje, huda nenadna življenjsko ogrožajoča alergijska reakcija
- nizke ravni glukoze (sladkorja) v krvi
- omotica
- težave s spanjem (nespečnost), depresija, nočne more, izguba spomina, halucinacije
- omedlevica, možganska kap, pomanjkanje krvi v možganih, poslabšanje znakov in simptomov miastenije gravis (bolezen mišic), nenavadni občutki, kot je ščemenje ali zbadanje, glavobol
- oteklina na očesnem ozadju (makularni edem), s tekočino napolnjen mehurček v obarvanem delu očesa (cista šarenice), preobčutljivost na svetlobo (fotofobija), videz upadlih oči (poglobitev očesne vdolbine)
- znaki in simptomi draženja očesa (npr. pekoč občutek, zbadanje, srbenje, solzenje, rdečina), vnetje očesne veke, vnetje roženice, zamegljen vid ali odstop plasti očesa, ki vsebuje krvne žile (pod mrežnico), po filtracijski operaciji (kirurški postopek, s katerim se naredi nov kanalček, ki dovoljuje tekočini da odteka iz očesa), kar lahko povzroči motnje vida, zmanjšana občutljivost roženice, suhe oči, poškodbe prednje plasti očesa (erozije roženice), povešena zgornja veka (zaradi česar je oko napol zaprto), dvojni vid
- potemnitev kože okoli oči, spremembe trepalnic in dlačic okoli očesa (zvečano število, podaljšanje, zadebelitev in potemnitev), sprememba smeri rasti trepalnic, oteklina predela okrog oči, vnetje obarvanega dela očesa (iritis/uveitis), brazgotinjenje na očesni površini
- piskanje/zvonjenje v ušesih (tinitus)
- bolečina za prsnico (angina pectoris), poslabšanje angine pectoris pri bolnikih z obstoječo boleznijo srca
- počasen srčni utrip, bolečina v prsnem košu, neprijetni občutki ob hitrem ali močnem utripanju srca (palpitacije), kopičenje tekočine v tkivih (edemi), spremembe ritma ali hitrosti srčnega utripa, kongestivno srčno popuščanje (bolezen srca z zasoplostjo in otekanjem stopal in nog zaradi kopičenja tekočine), vrsta motenj srčnega ritma, srčni infarkt, srčno popuščanje
- nizek krvni tlak, slaba prekrvavitev, ki vodi v otopenost in bledico prstov na rokah in nogah, hladne dlani in stopala
- zasoplost, zoženje dihalnih poti v pljučih (predvsem pri bolnikih s prej obstoječo boleznijo), oteženo dihanje, kašelj, astma, poslabšanje astme
- motnje okusa, slabost s siljenjem na bruhanje, slaba prebava, driska, suha usta, bolečine v trebuhu, bruhanje
- izpadanje las in dlak, kožni izpuščaj belo-srebrnkaste barve (podoben luskavici) ali poslabšanje luskavice, kožni izpuščaj
- bolečine v sklepih, bolečina v mišicah, ki je ne povzroči fizični napor, šibkost mišic, utrujenost
- motnje v spolnosti, zmanjšana želja po spolnosti

V zelo redkih primerih so se pri nekaterih bolnikih s hudo poškodovano roženico (prosojna plast na sprednjem delu očesa), zaradi nalaganja kalcija med zdravljenjem, razvile zamegljene lise na roženici.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite kateregakoli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco

Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22

SI-1000 Ljubljana

Tel: + 386 (0)8 2000 500

Faks: + 386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si

spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in nalepki na plastenki poleg oznake »EXP«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Odprto plastenko morate zavreči po 4 tednih odkar ste jo prvič odprli, da preprečite okužbe. Na označenem mestu na škatli zabeležite datum odpiranja.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjске odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen

– Učinkovini sta latanoprost in timolol.

1 ml raztopine vsebuje 50 mikrogramov latanoprosta in 5 mg timolola (v obliki 6,8 mg timololijevega maleata).

– Druge sestavine zdravila (pomožne snovi) so: makrogolglicerol hidroksistearat 40, natrijev klorid, dinatrijev edetat, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat, klorovodikova kislina ali/in natrijev hidroksid (za uravnavanje pH), voda za injekcije.

Izgled zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen in vsebina pakiranja

Zdravilo Latanoprost/timolol Pharmathen je na voljo v količini 2,5 mililitra bistre, brezbarvne, vodne raztopine, v kartonski škatli, ki vsebuje bel večodmerni kapalni vsebnik (iz HDPE; plastenka) volumna 5 ml, z odmerno črpalko (iz PP, HDPE, LDPE) in zelenim ali oranžnim delom za odmerjanje na pritisk, ter zaporko (iz HDPE).

Velikosti pakiranj:

1 ali 3 plastenke z 2,5 ml raztopine

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila Latanoprost/timolol Pharmathen

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion street

153 51 Pallini, Attiki

Grčija

Proizvajalec

Lomapharm GmbH

Langes Feld 5, 31860 Emmerthal

Nemčija

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Danska Latanoprost/Timolol Pharmathen

Nizozemska Latanotim 0,05mg/ml + 5mg/ml eye drops, solution

Italija Latanoprost e Timololo Pharmathen

Francija Latanoprost/Timolol Pharmathen 50 microgrammes/ml + 5 mg/mL, collyre en solution

Belgija Latanoprost/Timolol Pharmathen 50 microgrammes/ml + 5 mg/mL collyre en solution

Nemčija Latanoprost/Timolol Pharmathen 50 Mikrogramm/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung

Avstrija Latanoprost/Timolol Pharmathen 50 Mikrogramm/ml + 5 mg/ml Augentropfen Lösung

Španija COMBINEST PF 50 microgramos/ml + 5 mg/ml colirio en solución

Grčija Lonata

Ciper Lonata

Slovenija Latanoprost/timolol Pharmathen 0,05 mg/5 mg v 1 ml kapljice za oko, raztopina

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 4.3.2020.