

## Navodilo za uporabo

### **Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete** kalcij/holekalciferol (vitamin D<sub>3</sub>)

#### **Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

#### **Kaj vsebuje navodilo**

1. Kaj je zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete
3. Kako jemati zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

#### **1. Kaj je zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete in za kaj ga uporabljamo**

Zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete vsebuje učinkovini kalcij in vitamin D<sub>3</sub> in je dodatek kalcija in vitamina D<sub>3</sub>.

#### **Zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete uporabljamo za:**

- preprečevanje in zdravljenje pomanjkanja kalcija in vitamina D pri starejših,
- dodajanje vitamina D in kalcija kot podporno zdravljenje osteoporoze (krhkih kosti).

#### **2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete**

#### **Ne jemljite zdravila Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete**

- če ste alergični na kalcij, vitamin D<sub>3</sub> ali katero koli drugo sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6);
- če imate zvišano koncentracijo kalcija v krvi (hiperkalcemijo);
- če imate zvišano koncentracijo kalcija v urinu (hiperkalciurijo);
- če imate preveč dejavno obščitnično žlezo (hiperparatiroidizem);
- če imate raka kostnega mozga (mielom);
- če imate raka, ki lahko prizadene vaše kosti (kostne metastaze);
- če imate imobilizirane ude (daljšo nepokretnost), s spremljajočo hiperkalcemijo in/ali hiperkalciurijo;
- če imate ledvične kamne (nefrolitiazozo);
- če imate depozite kalcija v ledvicah (nefrokalcinozo);
- če imate zvišano raven vitamina D v krvi (hipervitaminoza D);
- če imate hude težave z ledvicami;

- če ste mlajši od 18 let.

### **Opozorila in previdnostni ukrepi**

Preden začnete jemati zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom, če se karkoli od navedenega nanaša na vas:

- **dolgotrajno zdravljenje**  
Med dolgotrajnim zdravljenjem je treba redno spremljati raven kalcija v krvi in urinu ter spremljati delovanje ledvic. To je še zlasti pomembno, če ste nagnjeni k nastajanju ledvičnih kamnov. Glede na raven kalcija v krvi se bo zdravnik morda odločil, da zmanjša odmerek ali zdravljenje z zdravilom ukine.
- sočasno zdravljenje s **srčnimi glikozidi ali tiazidnimi diuretiki (tablete za odvajanje vode)** zaradi težav s srcem.  
V tem primeru je treba redno spremljati raven kalcija v krvi in urinu ter spremljati delovanje ledvic, še posebej če ste starejši. Glede na raven kalcija v krvi bo zdravnik morda zmanjšal odmerek ali zdravljenje prekinil.
- **težave z ledvicami.**  
Če imate okvaro delovanja ledvic, morate zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete uporabljati še posebej previdno, še zlasti, če prejimate tudi pripravke z aluminijem, ker citronska kislina v zdravilu Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete lahko poveča absorpcijo aluminija. Raven kalcija v krvi in urinu vam bodo spremljali. Če imate hude težave z ledvicami morate uporabiti druge oblike vitamina D in ne holekalciferola.
- **dodatni vnos nadomestkov kalcija in vitamina D.**  
Za dodatni vnos nadomestkov kalcija in vitamina D je potreben zdravniški nadzor. Zdravnik vam bo pogosteje spremljal raven kalcija v krvi in urinu.
- **sarkoidoza** (bolezen imunskega sistema, ki lahko vpliva na jetra, pljuča, kožo ali bezgavke).  
Bodite posebno previdni, če jemljete zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete, če imate sarkoidozo. Obstaja tveganje, da postane učinek tega zdravila premočan, kar ima lahko za posledico prevelike količine kalcija v telesu. Potrebno je spremljati raven kalcija v krvi in urinu.
- **nepokretni bolniki z osteoporozo.**  
V takem primeru je treba to zdravilo uporabljati zelo previdno, saj se lahko raven kalcija v krvi zviša.

### **Otroci in mladostniki**

Zdravila Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete ne smejo jemati otroci in mladostniki mlajši od 18 let; glejte poglavje »Ne jemljite zdravila Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete«.

### **Druga zdravila in zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete**

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali boste morda začeli jemati katero koli zdravilo.

- V primeru sočasnega zdravljenja z **glikozidi digitalisa** (srčni glikozidi, pridobljeni iz naprstca) se lahko pojavijo motnje srčnega ritma. Zato je treba skrbno spremljati tako elektrokardiogram (EKG) kot raven kalcija v krvi.
- V primeru sočasnega jemanja **diuretikov iz razreda tiazidov** (imenovanih tudi tablete za odvajanje vode) je treba redno spremljati raven kalcija v krvi, saj lahko tiazidi zmanjšajo izločanje kalcija z urinom.
- Absorpcija in s tem tudi učinkovitost **nekaterih antibiotikov (imenovanih tetraciklini)** je ob sočasni uporabi zdravila Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete zmanjšana. Ta zdravila je treba vzeti najmanj 2 uri pred ali 4-6 ur po zaužitju zdravila Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete.
- V primeru sočasne uporabe **natrijevega fluorida** (uporablja se za krepitev zobne sklenine ali za zdravljenje osteoporoze), **kinolonskih antibiotikov** in **bisfosfonatov** (uporabljajo se za

- zdravljenje osteoporoze) lahko pride do vpliva na delovanje teh zdravil. Ta zdravila je treba vzeti najmanj 3 ure pred zaužitjem zdravila Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete.
- Med uporabo **holestiramina** (zdravila za zniževanje zvišane ravni holesterola), **orlistata** (zdravilo za zdravljenje debelosti) ali **odvajal**, na primer tekočega parafina, ter zdravila Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete mora biti čim daljši časovni razmak, sicer se vitamin D ne absorbira ustrezno.
  - Sočasna uporaba zdravila Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete in **rifampicina** (antibiotik), **fenitoina** (zdravila za zdravljenje epilepsije) ali **barbituratov** (hipnotikov) lahko povzroči zmanjšanje učinka vitamina D.
  - Sočasna uporaba zdravila Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete in **glukokortikoidov** (npr. kortizon) lahko povzroči zmanjšanje učinka vitamina D in znižanje ravni kalcija v krvi.
  - **Dodajanje kalcija in vitamina D** se sme izvajati samo pod zdravniškim nadzorom. Zdravnik vam bo pogosteje spremljal raven kalcija v krvi in urinu.
  - 
  - Kalcij lahko zmanjša absorpcijo **železa, cinka ali stroncijevega ranelata**. Ta zdravila jemljite najmanj dve uri pred ali po tem, ko ste vzeli zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete.
  - Kalcij lahko zmanjša absorpcijo **estramustina** (zdravilo, ki se uporablja pri kemoterapiji) in **ščitničnih hormonov** (uporabljajo se pri zmanjšanem delovanju ščitnice). To zdravilo vzemite najmanj dve uri potem, ko ste vzeli zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete.

### **Zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete skupaj s hrano, pijačo in alkoholom**

Oksalna kislina (najdemo jo npr. v špinaci in rabarbari) in fitinska kislina (najdemo jo npr. v polnozrnatih žitaricah) lahko zmanjšata količino kalcija, ki se absorbira v črevesju. Zdravil, ki vsebujejo kalcij ne smete vzeti dve uri pred in po uživanju hrane, bogate z oksalno ali fitinsko kislino.

### **Nosečnost in dojenje**

#### *Nosečnost*

Zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete se lahko med nosečnostjo uporabljajo v primeru pomanjkanja kalcija in vitamina D.

Dnevnega odmerka, ki znaša pol tablete, ne smete prekoračiti. Med nosečnostjo skupni dnevni odmerek kalcija ne sme preseči 1500 mg, skupni dnevni odmerek vitamina D<sub>3</sub> pa ne sme preseči 600 i.e. (internacionalnih enot).

Dolgotrajnemu prevelikemu odmerjanju kalcija in vitamina D se je treba med nosečnostjo izogibati, saj ima to lahko za posledico visoke ravni kalcija v krvi in lahko škodljivo vpliva na nerojenega otroka.

#### *Dojenje*

Zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete lahko jemljete tudi med dojenjem. Ker kalcij in vitamin D prehajata v materino mleko, se pred uporabo zdravila posvetujte z zdravnikom, če vaš otrok dobiva kakšno drugo zdravilo, ki vsebuje vitamin D.

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

### **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete nima znanega vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

**Zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete vsebuje natrij, aspartam, sorbitol, izomalt, saharozo in benzilalkohol.**

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol natrija (23 mg) na žvečljivo tableto, kar pomeni v bistvu »brez natrija«.

To zdravilo vsebuje 1,00 mg aspartama v eni žvečljivi tableti. Aspartam je vir fenilalanina. Lahko vam škoduje, če imate fenilketonurijo, redko genetsko bolezen pri kateri pride do kopičenja fenilalanina, ker se ne more ustrezno odstranjevati iz telesa.

To zdravilo vsebuje do 152,89 mg sorbitola (E420) v eni žvečljivi tableti. Sorbitol je vir fruktoze. Če vam je zdravnik povedal, da vi (ali vaš otrok) ne prenašate nekaterih sladkorjev ali če so pri vas ugotovili dedno intoleranco za fruktozo, redko genetsko bolezen, pri kateri ne morete razgraditi fruktoze, se posvetujte z zdravnikom preden vi (ali vaš otrok) vzamete ali dobite to zdravilo.

To zdravilo vsebuje tudi izomalt (E 953) in saharozo. Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte s svojim zdravnikom. Lahko škoduje zobem.

To zdravilo vsebuje 0,02 mg benzilalkohola v eni žvečljivi tableti. Benzilalkohol lahko povzroči alergijske reakcije.

### **3. Kako jemati zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete**

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

#### **Priporočeni odmerek je:**

Odrasli in starostniki vzamejo 1 žvečljivo tableto na dan (kar ustreza 1000 mg kalcija in 880 i.e. (internacionalnih enot) vitamina D<sub>3</sub>).

Nosečnice lahko vzamejo le pol žvečljive tablete na dan (kar ustreza 500 mg kalcija in 440 i.e. (internacionalnih enot) vitamina D<sub>3</sub>). Dnevni odmerek za nosečnice ne sme preseči pol tablete.

#### **Uporaba pri otrocih in mladostnikih**

Zdravila Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete ne smejo jemati otroci in mladostniki, mlajši od 18 let; glejte zgoraj "Ne jemljite zdravila Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete".

#### **Način uporabe**

##### **Peroralna uporaba**

Žvečljivo tableto morate prežvečiti, preden jo pogoltnete. Zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete lahko vzamete kadarkoli, s hrano ali brez nje.

Tableta se lahko deli na enaka odmerka.

#### **Trajanje zdravljenja**

Zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete je namenjeno dolgotrajnemu zdravljenju. Zdravnik vam bo povedal, kako dolgo morate jemati zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete (glejte tudi poglavje 2, "Opozorila in previdnostni ukrepi").

#### **Če ste vzeli večji odmerek zdravila Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete, kot bi smeli**

Nemudoma se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom, če sumite na prevelik odmerek in vzemite škatlo in preostale žvečljive tablete s sabo.

Prevelik odmerek zdravila Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete lahko povzroči simptome, kot so občutek slabosti (navzea), bruhanje, žeja ali prekomerna žeja, povečano izločanje urina, dehidracija ali zaprtje (mlečni alkalni sindrom, glejte tudi poglavje 4 Možni neželeni učinki).

**Če ste pozabili vzeti zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete**

Če ste pozabili vzeti zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete, ga vzemite takoj, ko se spomnite, razen če je že čas za vaš naslednji odmerek. V tem primeru vzemite samo naslednji odmerek ob običajnem času. Ne vzemite dvojnega odmerka, da bi nadomestili pozabljen odmerek.

**Če ste prenehali jemati zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete**

Če želite prekiniti ali predčasno prenehati zdravljenje, se posvetujte z zdravnikom.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

#### **4. Možni neželeni učinki**

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

**Prenehajte jemati zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete in se nemudoma posvetujte z zdravnikom, če opazite katerega koli od naslednjih resnih neželenih učinkov:**

*Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti)*

- hude alergijske reakcije: otekanje obraza, ustnic, jezika ali žrela z nenadnimi težavami pri dihanju in hudim izpuščajem.
- pogosta potreba po uriniranju, stalni glavoboli, trajajoča izguba teka, slabost ali bruhanje, nenavadna utrujenost ali slabotnost, hiperkalcemija, alkalozna in ledvična okvara (mlečni alkalni sindrom).

**Drugi poročani neželeni učinki so:**

*Občasni (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov)*

- visoke ravni kalcija v krvi (hiperkalcemija) ali urinu (hiperkalciurija).

*Redki (pojavi se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov)*

- občutek slabosti (navzea), driska, bolečine v trebuhu, zaprtje, vetrovi, napenjanje (napet trebuh).
- kožni izpuščaji, srbenje, koprivnica.

*Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti)*

- bruhanje.

Če imate okvaro ledvic, imate večje tveganje za povišane vrednosti fosfatov v krvi, povišano vrednost kalcija v ledvicah in ledvične kamne.

**Poročanje o neželenih učinkih**

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na: Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco, Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana, Tel: +386 (0)8 2000 500, Faks: +386 (0)8 2000 510, e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

## 5. Shranjevanje zdravila Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in na vsebniku tablet ali na laminirani aluminijasti/papirni foliji poleg oznake »EXP«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

### Za platenko:

Po prvem odprtju: Platenko s tabletami hranite tesno zaprto za zagotovitev zaščite pred vlago.

### Za dvojni trak: Za shranjevanje zdravila niso potrebni posebni pogoji shranjevanja.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

## 6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

### Kaj vsebuje zdravilo Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete

- Učinkovini sta kalcij in holekalciferol. Ena žvečljiva tableta vsebuje 1000 mg kalcija (v obliki kalcijevega karbonata) in 22 mikrogramov holekalciferola (vitamina D<sub>3</sub>, kar ustreza 880 i.e. koncentrata v obliki praška).
- Pomožne snovi so: izomalt (E953), ksilitol, sorbitol (E420), citronska kislina, brezvodna, natrijev dihidrogen citrat, magnezijev stearat, natrijev karmelozat, aroma pomaranče "CPB" in aroma pomaranče "CVT" (obe vsebujeta sorbitol (E420)), aspartam (E951), kalijev acesulfamat, natrijev askorbat, vseracemni alfa tokoferol, modificiran (koruzni) škrob, saharozo, trigliceridi, nasičeni, srednjeveržni in silicijev dioksid, koloidni) Aroma pomaranče »CPB« vsebuje tudi benzilalkohol, kot del naravnega/naravno identičnemu olju mandarine.

### Izgled zdravila Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete in vsebina pakiranja

Tablete so okrogle, bele z gladko površino in razdelilno zarezo.

Žvečljive tablete so na voljo v polipropilenskih vsebnikih s polietilenskim zamaškom s sušilnim sredstvom ali v dvojnih trakovih iz laminirane aluminijaste/papirne folije

Pakiranja:

Plastenke:

10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 100 (povezano pakiranje 5x20) žvečljivih tablet.

Dvojni trak: 10, 20, 28, 30, 40, 48, 56, 60, 60 (povezano pakiranje 2x30), 90, 90 (povezano pakiranje 3x30), 96, 100 (povezano pakiranje 5x20) in 120 žvečljivih tablet.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

### Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila

Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

### Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija

**Izdelovalca**

Hermes Arzneimittel GmbH, Georg-Kalb-Straße 5-8, 82049 Großhesselohe / München, Nemčija  
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Nemčija

**Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:**

Češka: Calcium / Vitamin D<sub>3</sub> Sandoz  
Nemčija: Calcium–Sandoz D Osteo intens 1000 mg / 880 I.E. Kautabletten  
Irska: Calciup D<sub>3</sub> Forte 1000 mg / 880 IU Chewable Tablets  
Poljska: Calcium Sandoz + Vitamin D<sub>3</sub>, 1000 mg + 880 IU, tabletki do rozcryzania i żucia  
Romunija: Calciu Sandoz Osteo 1000 mg/880 UI comprimate masticabile (chewable tablets)  
Slovenija: Kalcij/vitamin D<sub>3</sub> Lek 1000 mg/880 i.e. žvečljive tablete  
Združeno  
kraljestvo: Accrete D3 One a Day 1000 mg/880 IU Chewable Tablets

**Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 27.4.2020**