Navodilo za uporabo

Aksitinib Sandoz 1 mg filmsko obložene tablete
Aksitinib Sandoz 3 mg filmsko obložene tablete
Aksitinib Sandoz 5 mg filmsko obložene tablete
Aksitinib Sandoz 7 mg filmsko obložene tablete
aksitinib

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
– Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
– Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.
– Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
– Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katerekoli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo
1. Kaj je zdravilo Aksitinib Sandoz in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Aksitinib Sandoz
3. Kako jemati zdravilo Aksitinib Sandoz
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Aksitinib Sandoz
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Aksitinib Sandoz in za kaj ga uporabljamo

Aksitinib Sandoz je zdravilo, ki vsebuje učinkovino aksitinib. Aksitinib zmanjšuje oskrbo tumorja s krvjo in upočasnjuje razraščanje raka.

Zdravilo Aksitinib Sandoz se uporablja za zdravljenje odraslih bolnikov z napredovalim rakom ledvic (napredovali karcinom ledvičnih celic), potem ko z drugim zdravilom (imenovanim sunitinib ali citokin) ni več mogoče zaustaviti napredovanja bolezni.

Če imate kakršnakoli vprašanja o tem, kako to zdravilo deluje ali zakaj vam je bilo predpisano, se posvetujte z zdravnikom.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Aksitinib Sandoz

Ne jemljite zdravila Aksitinib Sandoz:
Če ste alergični na aksitinib ali katerokoli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6). Če menite, da bi lahko bili alergični na to zdravilo, se posvetujte z zdravnikom.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom jemanja zdravila Aksitinib Sandoz se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro
- **če imate visok krvni tlak.**

Zdravilo Aksitinib Sandoz lahko zviša vaš krvni tlak. Pomembno je, da se pred začetkom jemanja tega zdravila in v rednih časovnih presledkih med jemanjem pri vas preverja krvni tlak. Če imate visok krvni tlak (hipertenzijo), morda dobivate zdravila za zniževanje krvnega tlaka. Zdravnik se mora pred začetkom zdravljenja z zdravilom Aksitinib Sandoz in med zdravljenjem prepričati, da je vaš krvni tlak

pod nadzorom.

- **če imate motnje delovanja žleze ščitnice.**

Zdravilo Aksitinib Sandoz lahko povzroči motnje delovanja žleze ščitnice. Obvestite zdravnika, če se hitreje utrudite, vas običajno bolj zebe kot druge ljudi, ali če se vaš glas med jemanjem tega zdravila poglobi. Delovanje vaše žleze ščitnice je treba preveriti pred začetkom jemanja zdravila Aksitinib Sandoz in v rednih časovnih presledkih med jemanjem. Če vaša žleza ščitnica pred začetkom zdravljenja ali med zdravljenjem ne tvori dovolj ščitničnega hormona, morate jemati zdravila za nadomeščanje ščitničnega hormona.

- **Če ste pred kratkim imeli težave s krvnimi strdki v venah ali arterijah (vrsti krvnih žil), vključno z možgansko kapjo, srčnim infarktom, embolijo ali trombozo.**

Takoj se obrnite na nujno zdravniško pomoč in pokličite zdravnika, če se vam med zdravljenjem s tem zdravilom pojavijo simptomi, kot so bolečine ali pritisk v prsnem košu; bolečine v rokah, hrbtu, vratu ali čeljusti; kratka sapa; otrplost ali oslabelost na eni strani vašega telesa; težave z govorom; glavobol; spremembe vida ali omotica.

- **če imate težave s krvavitvami.**

Zdravilo Aksitinib Sandoz lahko zveča možnosti, da pri vas pride do krvavitev. Obvestite zdravnika, če med zdravljenjem s tem zdravilom pride do kakršnekoli krvavitve, izkašljevanja krvi ali krvavega izpljunka.

- **če imate ali ste imeli anevrizmo (razširitev in oslabitev stene krvne žile) ali raztrganino v steni krvne žile.**
- **če se vam med zdravljenjem s tem zdravilom pojavijo hude bolečine v želodcu (trebuhu) ali bolečine v želodcu, ki ne minejo.**

Zdravilo Aksitinib Sandoz lahko zveča tveganje za predrtje želodca ali črevesa ali za nastanek fistule (nenormalen, cevi podoben prehod iz ene normalne telesne votline do druge telesne votline ali kože). Obvestite zdravnika, če imate med zdravljenjem s tem zdravilom hude bolečine v trebuhu.

- **če je pri vas načrtovan kirurški poseg ali če imate nezaceljeno rano.**

Zdravnik mora zdravljenje z zdravilom Aksitinib Sandoz prekiniti vsaj 24 ur pred kirurškim posegom, ker lahko vpliva na celjenje rane. Potem ko se rana zadovoljivo zaceli, je treba ponovno začeti zdravljenje s tem zdravilom.

- **če se vam med zdravljenjem s tem zdravilom pojavijo simptomi, kot so glavobol, zmedenost, epileptični napadi (krči) ali spremembe vida z zvišanim krvnim tlakom ali brez njega.**

Takoj se obrnite na nujno zdravniško pomoč in pokličite zdravnika. V tem primeru lahko gre za redek nevrološki neželeni učinek, imenovan sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije.

- **če imate težave z jetri.**

Zdravnik mora pred začetkom zdravljenja z zdravilom Aksitinib Sandoz in med njim opraviti preiskave krvi, da preveri delovanje vaših jeter.

- **če se vam med zdravljenjem s tem zdravilom pojavijo simptomi, kot so čezmerna utrujenost, otekanje trebuha, nog ali gležnjev, kratka sapa ali izstopajoče žile na vratu.**

Zdravilo Aksitinib Sandoz lahko zveča tveganje za razvoj srčnega popuščanja. Med zdravljenjem z aksitinibom bo zdravnik redno spremljal znake ali simptome srčnega popuščanja.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Uporaba zdravila Aksitinib Sandoz pri ljudeh, mlajših od 18 let, ni priporočljiva. Pri otrocih in mladostnikih uporabe tega zdravila niso preučevali.

Druga zdravila in zdravilo Aksitinib Sandoz

Nekatera zdravila lahko vplivajo na delovanje zdravila Aksitinib Sandoz ali pa zdravilo Aksitinib Sandoz vpliva na njihovo delovanje. Obvestite zdravnika, farmacevta ali medicinsko sestro, če ste pred kratkim jemali, trenutno jemljete ali pa boste morda začeli jemati katerokoli drugo zdravilo, tudi če gre za zdravila brez recepta, vitamine in zdravila rastlinskega izvora. Zdravila, navedena v tem navodilu, morda niso edina, ki bi lahko medsebojno delovala z zdravilom Aksitinib Sandoz.

Naslednja zdravila lahko zvečajo tveganje za pojav neželenih učinkov zdravila Aksitinib Sandoz:

- ketokonazol ali itrakonazol, ki se uporabljata za zdravljenje glivičnih okužb;
- klaritromicin, eritromicin ali telitromicin, antibiotiki, ki se uporabljajo za zdravljenje bakterijskih

okužb;
- atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir ali sakvinavir, ki se uporabljajo za zdravljenje okužb s HIV/AIDS-a;
- nefazodon, ki se uporablja za zdravljenje depresije.

Naslednja zdravila lahko zmanjšajo učinkovitost zdravila Aksitinib Sandoz:
- rifampicin, rifabutin ali rifapentin, ki se uporabljajo za zdravljenje tuberkuloze (TB);
- deksametazon, steroidno zdravilo, ki se predpisuje za mnoga različna stanja, vključno s hudimi boleznimi;
- fenitoin, karbamazepin ali fenobarbital, antiepileptiki, ki se uporabljajo za zaustavitev epileptičnih napadov ali krčev;
- šentjanževka (*Hypericum perforatum*), zdravilo rastlinskega izvora, ki se uporablja za zdravljenje depresije.

Med zdravljenjem z zdravilom Aksitinib Sandoz **ne smete** jemati teh zdravil. Če jemljete katerokoli izmed njih, to povejte zdravniku, farmacevtu ali medicinski sestri. Zdravnik bo morda spremenil odmerek teh zdravil, spremenil odmerek zdravila Aksitinib Sandoz ali vam predpisal kakšno drugo zdravilo.

Zdravilo Aksitinib Sandoz lahko okrepi neželene učinke, povezane s teofilinom, ki se uporablja za zdravljenje astme ali drugih pljučnih bolezni.

Zdravilo Aksitinib Sandoz skupaj s hrano in pijačo
Tega zdravila ne jemljite skupaj z grenivkami ali grenivkinim sokom, ker to lahko zveča možnost za pojav neželenih učinkov.

Nosečnost in dojenje
- Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro, preden vzamete to zdravilo.
- Zdravilo Aksitinib Sandoz lahko škoduje nerojenemu otroku ali dojenemu otroku.
- Tega zdravila ne jemljite med nosečnostjo. Če ste noseči ali če bi lahko zanosili, se pred začetkom jemanja posvetujte z zdravnikom.
- Med jemanjem zdravila Aksitinib Sandoz in še en teden po zadnjem odmerku tega zdravila uporabljajte zanesljivo metodo kontracepcije, da preprečite nosečnost.
- Med zdravljenjem z zdravilom Aksitinib Sandoz ne smete dojiti. Če dojite, se mora zdravnik z vami pogovoriti glede prenehanja dojenja oziroma prenehanja zdravljenja z zdravilom Aksitinib Sandoz.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev
Če vas obide omotica in/ali ste med jemanjem zdravila Aksitinib Sandoz utrujeni, bodite pri vožnji ali upravljanju strojev še posebno previdni.

Zdravilo Aksitinib Sandoz vsebuje laktozo
Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom.

Zdravilo Aksitinib Sandoz vsebuje natrij
To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija na filmsko obloženo tableto, kar v bistvu pomeni »brez natrija«.

3. Kako jemati zdravilo Aksitinib Sandoz

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

Priporočeni odmerek je 5 mg dvakrat na dan. Zdravnik vam lahko odmerek zdravila pozneje zveča ali zmanjša, odvisno od tega, kako prenašate zdravljenje z zdravilom Aksitinib Sandoz.

Tablete pogoltnite cele, z nekaj vode, skupaj s hrano ali brez nje. Odmerke zdravila Aksitinib Sandoz jemljite v približno 12-urnih presledkih.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Aksitinib Sandoz, kot bi smeli
Če ste pomotoma vzeli preveč tablet ali odmerek, ki je večji od potrebnega, se nemudoma posvetujte z zdravnikom. Če je mogoče, zdravniku pokažite škatlo zdravila ali to navodilo za uporabo. Morda boste potrebovali zdravniško oskrbo.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Aksitinib Sandoz
Vzemite naslednji odmerek zdravila ob predvidenem času. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če bruhate med zdravljenjem z zdravilom Aksitinib Sandoz
Če bruhate, ne smete vzeti dodatnega odmerka. Naslednji predpisani odmerek vzemite ob običajnem času.

Če ste prenehali jemati zdravilo Aksitinib Sandoz
Če tega zdravila ne morete jemati tako, kot vam je predpisal zdravnik, ali imate občutek, da ga ne potrebujete več, se nemudoma posvetujte z zdravnikom.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi tega zdravila, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Nekateri neželeni učinki so lahko hudi. Nemudoma se posvetujte z zdravnikom, če se pri vas pojavi katerikoli izmed naslednjih hudih neželenih učinkov (glejte tudi poglavje 2, »Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Aksitinib Sandoz«):

- **Srčno popuščanje**. Obvestite zdravnika, če se pojavijo čezmerna utrujenost, otekanje trebuha, nog ali gležnjev, kratka sapa ali izstopajoče žile na vratu.

- **Krvni strdki v venah ali arterijah (vrsti krvnih žil), vključno z možgansko kapjo, srčnim infarktom, embolijo ali trombozo.** Takoj se obrnite na nujno zdravniško pomoč in pokličite zdravnika, če se vam med zdravljenjem s tem zdravilom pojavijo simptomi, kot so bolečine ali pritisk v prsnem košu; bolečine v rokah, hrbtu, vratu ali čeljusti; kratka sapa; otrplost ali oslabelost na eni strani vašega telesa; težave z govorom; glavobol; spremembe vida: ali omotica.

- **Krvavitev.** Nemudoma obvestite zdravnika, če se vam med zdravljenjem z zdravilom Aksitinib Sandoz pojavi katerikoli od naslednjih simptomov ali če imate hude težave, povezane s krvavitvami: črno, lepljivo blato, izkašljevanje krvi ali krvav izpljunek ali spremembe v duševnem stanju.

- **Predrtje želodca ali črevesa ali nastanek fistule (nenormalen, cevi podoben prehod iz ene normalne telesne votline do druge telesne votline ali kože**). Obvestite zdravnika, če imate hude bolečine v trebuhu.

- **Izrazito zvišanje krvnega tlaka (hipertenzivna kriza).** Obvestite zdravnika, če imate zelo visok krvni tlak, hud glavobol ali hude bolečine v prsnem košu.

- **Otekanje možganov, ki lahko izzveni (sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije).** Če se vam pojavijo simptomi, kot so glavobol, zmedenost, epileptični napadi (krči) ali spremembe vida z zvišanim krvnim tlakom ali brez njega, se takoj obrnite na nujno zdravniško pomoč in pokličite zdravnika.

Drugi neželeni učinki zdravila Aksitinib Sandoz so lahko:

Zelo pogosti: pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov
- visok krvni tlak ali zvišanje krvnega tlaka;
- driska, občutek slabosti (slabost s siljenjem na bruhanje ali bruhanje), bolečine v želodcu, slaba prebava, bolečine v ustih, jeziku ali grlu, zaprtje;
- kratka sapa, kašelj, hripavost;
- pomanjkanje energije, občutek šibkosti ali utrujenosti;
- premalo dejavna žleza ščitnica (to se lahko pokaže pri preiskavah krvi);
- rdečina in otekanje dlani ali podplatov (sindrom dlani-podplatov), kožni izpuščaj, suha koža;
- bolečine v sklepih, bolečine v dlaneh ali stopalih;
- izguba apetita;
- beljakovine v urinu (to se lahko pokaže pri preiskavah urina);
- zmanjšanje telesne mase;
- glavobol, motnje v zaznavanju okusa ali nezmožnost zaznavanja okusa.

Pogosti: pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov
- dehidracija (izguba telesnih tekočin);
- odpoved ledvic;
- napenjanje (vetrovi), hemoroidi, krvavitve iz dlesni, krvavitve iz danke, pekoč ali zbadajoč občutek v ustih;
- preveč dejavna žleza ščitnica (to se lahko pokaže pri preiskavah krvi);
- vnetje žrela ali nosne sluznice in draženje žrela;
- bolečine v mišicah;
- krvavitve iz nosu;
- srbeča koža, pordelost kože, izpadanje las in dlak;
- zvenenje v ušesih (tinitus);
- zmanjšanje števila rdečih krvnih celic (to se lahko pokaže pri preiskavah krvi);
- zmanjšanje števila krvnih ploščic (celice, ki sodelujejo pri strjevanju krvi) (to se lahko pokaže pri preiskavah krvi);
- prisotnost krvnih celic rdeče vrste v urinu (to se lahko pokaže pri preiskavah urina);
- spremembe koncentracije različnih snovi/encimov v krvi (to se lahko pokaže pri preiskavah krvi);
- zvečanje števila krvnih celic rdeče vrste (to se lahko pokaže pri preiskavah krvi):
- otekanje trebuha, nog ali gležnjev, izstopajoče žile na vratu, čezmerna utrujenost, kratka sapa (znaki srčnega popuščanja);
- fistula (nenormalen, cevi podoben prehod iz ene normalne telesne votline do druge telesne votline ali kože);
- omotica;
- vnetje žolčnika.

Občasni: pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov
- zmanjšanje števila krvnih celic bele vrste (to se lahko pokaže pri preiskavah krvi).

Neznana pogostnost: pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti
- razširitev in oslabitev stene krvne žile ali raztrganina v steni krvne žile (anevrizme in disekcije arterij).

Poročanje o neželenih učinkih
Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih

lahko poročate tudi neposredno na Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco, Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana, Tel: +386 (0) 8 2000 500, Faks: +386 (0) 8 2000 510, e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si.
S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Aksitinib Sandoz

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in na pretisnem omotu oziroma plastenki poleg oznake »EXP«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred vlago.

Ne uporabite pakiranja, ki je poškodovano ali kaže znake, da je že bilo odprto.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Aksitinib Sandoz

Učinkovina je aksitinib. Filmsko obložene tablete zdravila Aksitinib Sandoz so na voljo v različnih jakostih.
Aksitinib Sandoz 1 mg: ena tableta vsebuje 1 mg aksitiniba;
Aksitinib Sandoz 3 mg: ena tableta vsebuje 3 mg aksitiniba;
Aksitinib Sandoz 5 mg: ena tableta vsebuje 5 mg aksitiniba;
Aksitinib Sandoz 7 mg: ena tableta vsebuje 7 mg aksitiniba.

- Druge sestavine zdravila so mikrokristalna celuloza, laktoza monohidrat, premreženi natrijev karmelozat, magnezijev stearat, hipromeloza, titanov dioksid (E 171), rdeči železov oksid (E 172), triacetin.

Izgled zdravila Aksitinib Sandoz in vsebina pakiranja

Aksitinib Sandoz 1 mg filmsko obložene tablete so rdeče, okrogle, z vtisnjeno oznako »A7TI« na eni strani in »1« na drugi strani.

Aksitinib Sandoz 3 mg filmsko obložene tablete so rdeče, ovalne, z vtisnjeno oznako »A7TI« na eni strani in »3« na drugi strani.

Aksitinib Sandoz 5 mg filmsko obložene tablete so rdeče, ovalne, z vtisnjeno oznako »A7TI« na eni strani in »5« na drugi strani.

Aksitinib Sandoz 7 mg filmsko obložene tablete so rdeče, ovalne, z vtisnjeno oznako »A7TI« na eni strani in »7« na drugi strani.

<u>Aksitinib Sandoz 1 mg filmsko obložene tablete in Aksitinib Sandoz 5 mg filmsko obložene tablete</u>
Aksitinib Sandoz je na voljo v pretisnih omotih in perforiranih pretisnih omotih za enkraten odmerek. Eno pakiranje vsebuje 14, 28, 56, 56x1 ali 60 filmsko obloženih tablet.

Aksitinib Sandoz 3 mg filmsko obložene tablete in Aksitinib Sandoz 7 mg filmsko obložene tablete
Aksitinib Sandoz je na voljo v pretisnih omotih in perforiranih pretisnih omotih za enkraten odmerek. Eno pakiranje vsebuje 14, 28, 56 ali 56x1 filmsko obloženih tablet.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila
H/Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:
Sandoz farmacevtska družba d.d., Verovškova ulica 57, 1000 Ljubljana, Slovenija

Proizvajalci:
Synthon Hispania S.L., Calle De Castelló 1, Sant Boi De Llobregat, Barcelona 08830, Španija
Synthon B.V., Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Nizozemska
Salutas Pharma GmbH, Otto-Von-Guericke-Allee 1, Barleben, Saxony-Anhalt 39179, Nemčija

To zdravilo je v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora dovoljenje za promet pridobilo pod naslednjimi imeni:

Nizozemska	Axitinib Sandoz 1 mg, filmomhulde tabletten Axitinib Sandoz 3 mg, filmomhulde tabletten Axitinib Sandoz 5 mg, filmomhulde tabletten Axitinib Sandoz 7 mg, filmomhulde tabletten
Avstrija	Axitinib Sandoz 1 mg – Filmtabletten Axitinib Sandoz 3 mg – Filmtabletten Axitinib Sandoz 5 mg – Filmtabletten Axitinib Sandoz 7 mg – Filmtabletten
Bulgarija	Axitinib Sandoz 1 mg Film-coated tablet (Акситиниб Сандоз 1 mg филмирани таблетки) Axitinib Sandoz 5 mg Film-coated tablet (Акситиниб Сандоз 5 mg филмирани таблетки)
Ciper	Axitinib/Sandoz 1 mg film-coated tablets Axitinib/Sandoz 5 mg film-coated tablets
Estonia	Axitinib Sandoz
Finska	Axitinib Sandoz 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Axitinib Sandoz 3 mg kalvopäällysteiset tabletit Axitinib Sandoz 5 mg kalvopäällysteiset tabletit Axitinib Sandoz 7 mg kalvopäällysteiset tabletit
Francija	AXITINIB SANDOZ 1 mg, comprimé pelliculé AXITINIB SANDOZ 3 mg, comprimé pelliculé AXITINIB SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé AXITINIB SANDOZ 7 mg, comprimé pelliculé
Grčija	Axitinib/Sandoz
Italija	Axitinib Sandoz
Litva	Axitinib Sandoz 1 mg plėvele dengtos tabletės Axitinib Sandoz 5 mg plėvele dengtos tabletės
Latvija	Axitinib Sandoz 1 mg apvalkotās tabletes Axitinib Sandoz 5 mg apvalkotās tabletes
Madžarska	Axitinib Sandoz 1 mg filmtabletta

	Axitinib Sandoz 5 mg filmtabletta
Nemčija	Axitinib HEXAL 1 mg Filmtabletten Axitinib HEXAL 3 mg Filmtabletten Axitinib HEXAL 5 mg Filmtabletten Axitinib HEXAL 7 mg Filmtabletten
Norveška	Axitinib Sandoz
Slovenija	Aksitinib Sandoz 1 mg filmsko obložene tablete Aksitinib Sandoz 3 mg filmsko obložene tablete Aksitinib Sandoz 5 mg filmsko obložene tablete Aksitinib Sandoz 7 mg filmsko obložene tablete
Švedska	Axitinib Sandoz 1 mg filmdragerade tabletter Axitinib Sandoz 3 mg filmdragerade tabletter Axitinib Sandoz 5 mg filmdragerade tabletter Axitinib Sandoz 7 mg filmdragerade tabletter

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 12.11.2024.