

Navodilo za uporabo

Alvesco 80 mikrogramov/odmerek inhalacijska raztopina pod tlakom Alvesco 160 mikrogramov/odmerek inhalacijska raztopina pod tlakom ciklezonid

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Alvesco in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Alvesco
3. Kako uporabljati zdravilo Alvesco
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Alvesco
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Alvesco in za kaj ga uporabljamo

Kaj je zdravilo Alvesco:

Zdravilo Alvesco je bistro in brezbarvno aerosolno pršilo, ki ga vdihnete skozi usta v pljuča. Je preventivno zdravilo (kortikosteroid), ki ga morate uporabljati vsak dan. Zdravilo začne delovati šele, ko ga vdihnete v pljuča.

Za kaj se zdravilo Alvesco uporablja:

Zdravilo Alvesco se uporablja za zdravljenje kronične astme pri odraslih in mladostnikih (starih 12 let ali več).

Kako zdravilo Alvesco deluje

Zdravilo Alvesco vam bo z zmanjšanjem simptomov astme in z zmanjšanimi možnostmi napadov astme olajšalo dihanje. Zdravilo začne učinkovati šele po določenem času, zato ga morate uporabljati vsak dan, tudi kadar se dobro počutite.

To zdravilo ni primerno za uporabo pri akutnem napadu zasoplosti. Za hitro olajšanje simptomov napada uporabite le inhalator za ublažitev simptomov.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Alvesco

Ne uporabljajte zdravila Alvesco

če ste alergični na ciklezonid ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Alvesco se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Alvesco

Pred začetkom zdravljenja s tem zdravilom povejte zdravniku, če:

- ste se kdaj zdravili oziroma se zdravite za pljučno tuberkulozo (TBC), glivičnimi, virusnimi ali bakterijskimi okužbami.

Če niste prepričani, se posvetujte z zdravnikom. Pomembno se je prepričati, če je Alvesco primerno zdravilo za vas.

Med zdravljenjem z zdravilom Alvesco **takoj** obvestite zdravnika, če:

- dihanje postane težko in če se simptomi, kot so kašelj, zasoplost, sopenje, stiskanje v prsih, povečan hrup (hropenje), ali drugi simptomi zoženja dihalnih poti poslabšajo. (Uporabiti morate inhalator za lajšanje simptomov, ki po navadi hitro izboljša stanje.)
- se ponoči zbujate zaradi simptomov.
- vam inhalator za lajšanje simptomov astme ne pomaga.

Zdravnik se bo odločil o nadaljnjem zdravljenju.

Obvestite svojega zdravnika, če se pojavijo zamegljen vid ali druge motnje vida.

Posebne skupine bolnikov

Pri bolnikih s hudo astmo obstaja nevarnost akutnih napadov astme. Pri teh bolnikih bo zdravnik opravil redne, temeljite preglede zaradi astme, vključno s preiskavo pljučne funkcije.

Bolniki, ki že jemljejo kortikosteroide v obliki tablet:

Zdravilo Alvesco lahko nadomesti vaše tablete ali zmanjša število tablet, ki jih morate vzeti. Natančno upoštevajte zdravnikova navodila.

- To se bo pričelo približno en teden po tem, ko začnete uporabljati zdravilo Alvesco.
- Število tablet, ki jih jemljete, se bo dalj časa previdno zmanjševalo.
- V tem času se boste morda včasih počutili slabo.
- Kljub temu je pomembno, da nadaljujete z inhaliranjem zdravila Alvesco in počasi zmanjšujete število tablet.
- Če se pojavijo resni simptomi, kot so navzea (siljenje na bruhanje), bruhanje, driska ali zvišana telesna temperatura, pokličite zdravnika.
- Pri tem postopku se včasih lahko pokažejo manjše alergije, kot je rinitis (vnetje nosne sluznice) ali ekcem (srbeča, pordela koža).
- Če ste tablete nadomestili z inhalatorjem, bo nekaj časa prisotno tveganje za zmanjšanje delovanja nadledvične žleze, ki je povezano s kortikosteroidi v obliki tablet, ki jih jemljete. Prav tako se lahko še nekaj časa pojavljajo tudi simptomi zmanjšane delovanja nadledvične žleze (npr. omotica, omedlevica, siljenje na bruhanje, izguba apetita, spreminjanje razpoloženja, zmanjšanje poraščenosti, nezmožnost obvladovanja stresa, šibkost, glavoboli, težave s spominom, alergije, pretirana želja po hrani in motnje ravni sladkorja v krvi).
- Morda boste morali obiskati specialista, ki bo določil stopnjo zmanjšanja delovanja nadledvične žleze.
- Zdravnik bo redno nadzoroval delovanje nadledvične žleze.
- V času večjega stresa, na primer ob kirurškem posegu, ko se poslabšajo napadi astme, boste morda morali jemati dodatne kortikosteroide v obliki tablet. **Če boste jemali kortikosteroide, morate imeti pri sebi opozorilno kartico o jemanju steroidov.**

Bolniki z motnjami v delovanju jeter ali ledvic

Odmerka ciklezonida ni potrebno prilagoditi, če imate težave z jetri ali z ledvicami. Če imate hudo bolezen jeter, vas bo zdravnik pregledal bolj pozorno zaradi možnih neželenih učinkov, ki so lahko posledica motnje normalnega nastajanja steroidov.

Otroci, mlajši od 12 let:

Uporaba tega zdravila ni priporočljiva pri otrocih, mlajših od **12 let** zaradi pomanjkanja podatkov o njegovih morebitnih učinkih.

Druga zdravila in zdravilo Alvesco

Pred uporabo zdravila Alvesco obvestite zdravnika, če se trenutno zdravite zaradi kakršnekoli glivične ali virusne okužbe z zdravili, ki vsebujejo:

- ketokonazol,
- itrakonazol,
- ritonavir,
- kobicistat,
- nelfinavir.

Ta zdravila lahko okrepijo učinek zdravila Alvesco, zato možnosti pojava neželenih učinkov ni mogoče povsem izključiti, in zdravnik vas bo morda želel skrbno spremljati, če jemljeta ta zdravila (vključno z nekaterimi zdravili za HIV: ritonavirjem, kobicistatom).

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Zdravilo Alvesco skupaj s hrano in pijačo

Ni interakcij med zdravilom Alvesco in hrano ter pijačo.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

- Ker ni dovolj informacij o učinkih zdravila Alvesco pri nosečnicah, vam bo zdravnik pojasnil tveganja in koristi uporabe zdravila Alvesco.
- Ciklezonid (učinkovina zdravila Alvesco) se lahko uporablja med nosečnostjo le, če morebitne koristi za mater odtehtajo morebitno tveganje za nerojenega otroka. Če se zdravnik odloči, da lahko z uporabo zdravila Alvesco nadaljujete, boste uporabljali najmanjši možni odmerek ciklezonida, ki še zadostuje za nadzor astme.
- Pri otrocih mater, ki med nosečnostjo jemljejo kortikosteroide, bo zdravnik skrbno nadziral delovanje nadledvične žleze.
- Če želite zdravilo Alvesco jemati med dojenjem, se posvetujte z zdravnikom.
- Ni znano, ali inhalacijski ciklezonid prehaja v materino mleko pri človeku.
- Predpisovanje zdravila Alvesco pri ženskah, ki dojijo, pride v poštev le, če pričakovana korist za mater odtehta morebitno tveganje za otroka.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Alvesco in njegove sestavine nimajo vpliva ali imajo zanemarljiv vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Zdravilo Alvesco vsebuje etanol

To zdravilo vsebuje 4,7 mg alkohola (etanola) v enem odmerku. Količina v odmerku zdravila ustreza manj kot 1 ml piva ali vina. Majhna količina alkohola v tem zdravilu ne bo imela opaznih učinkov.

3. Kako uporabljati zdravilo Alvesco

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

- Če ste pravkar začeli uporabljati to zdravilo namesto kortikosteroidov v obliki tablet ali tablete še vedno jemljete, glejte poglavje 2, Bolniki, ki že jemljejo kortikosteroide v obliki tablet.

Koliko zdravila Alvesco moram vzeti vsak dan?

Zdravnik se bo z vami pogovoril o tem, kolikšen bo vaš dnevni odmerek zdravila. Odvisen je od vaših osebnih potreb.

- Priporočeni odmerek zdravila Alvesco je 160 mikrogramov enkrat na dan, kar pri večini bolnikov vodi do obvladovanja astme.
- Pri nekaterih bolnikih je lahko zmanjšanje odmerka na 80 mikrogramov enkrat na dan ustrezno za vzdrževanje učinkovitega nadzora astme.

- Povečan odmerek zdravila Alvesco lahko postane nujen za kratko časovno obdobje pri bolnikih s hudim poslabšanjem simptomov astme. Lahko prejmejo do 640 mikrogramov na dan, razdeljeno na 320 mikrogramov dvakrat na dan, vendar podatkov, ki bi potrjevali dodaten terapevtski učinek uporabe višjih odmerkov po 3 mesecih, ni na voljo.

Zdravnik vam po potrebi lahko predpiše tudi kortikosteroide v obliki tablet in/ali, v primeru okužbe, antibiotik.

- Zdravnik bo odmerek prilagodil do najmanjšega odmerka, ki je potreben, da bo astma nadzorovana.
- Simptomi (sopenje, stiskanje v prsnem košu in kašelj) bi se morali v 24 urah opazno izboljšati.

Kdaj moram uporabljati inhalator Alvesco?

V večini primerov, bodisi zjutraj ali zvečer – kot en ali dva vpiha enkrat na dan. Zelo natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Pomembno je, da zdravilo Alvesco uporabljate redno vsak dan, tudi če se počutite bolje.

Če ugotovite, da morate inhalator za lajšanje simptomov uporabiti več kot 2–3-krat na teden, morate o tem obvestiti zdravnika, ki bo preveril njegovo delovanje.

Kako uporabljam inhalator Alvesco?

Pomembno je, da vam zdravnik, medicinska sestra ali farmacevt pokaže, kako se inhalator Alvesco pravilno uporablja. S pravilnim načinom uporabe zagotovite, da dobivate ustrezno količino zdravila v pljuča. Navodila za uporabo naj vam služijo kot opomnik.

Vse dokler ne boste prepričani, da inhalator Alvesco uporabljate pravilno, boste prvih nekajkrat verjetno želeli vaditi pred ogledalom. Zagotoviti morate, da vam zdravilo ne uhaja skozi vrhnji del ali skozi stranska dela ust.

Če je inhalator nov ali ga niste uporabljali en teden ali več, ga **morate** pred uporabo preizkusiti. Odstranite pokrovček ustnika in **trikrat** pritisnite na vsebnik znotraj inhalatorja, tako da razpršite **tri** vpihe v zrak, stran od vas.

Pred uporabo inhalatorja Alvesco **ni** treba pretresti. Zdravilo je že pripravljeno v obliki raztopine, tako da dobite pri vsakem vpihu ustrezen odmerek.

Med inhaliranjem lahko sedite ali stojite.

Natančno upoštevajte ta navodila in si pri uporabi pomagajte s slikami.



1. Odstranite pokrovček ustnika in preverite, ali sta notranjost in zunanost ustnika čisti in suhi.



2. Inhalator držite obrnjen navzgor (z dnom vsebnika na vrhu), kazalec naj bo na dnu vsebnika, palec pa pod ustnikom.
3. **Izdihnite**, kolikor lahko. Ne izdihnite skozi inhalator.



4. Namestite ustnik v usta in ga **tesno** objemite z ustnicami.
5. Takoj, ko pričnete z vdihom skozi usta, s kazalcem pritisnite zgornji del inhalatorja navzdol, tako da sprožite vpih zdravila, medtem pa enakomerno in globoko vdihujte. Prosimo bodite pozorni, da vam odmerek zdravila medtem ne uhaja skozi vrhnji, spodnji ali skozi stranska dela ust.



6. Zadržite dih, vzemite inhalator iz ust in odstranite prst z njegovega zgornjega dela. Dih zadržujte še približno deset sekund ali dokler zadrževanje diha ne postane neprijetno. Počasi izdihnite skozi usta. Ne izdihnite skozi inhalator.

Pomembno je, da postopek od 3. do 6. točke opravite brez naglice.



7. Če vam je predpisano, da morate uporabiti še dodaten odmerek, **počakajte** približno pol minute in nato **ponovite** postopek od 3. do 6. točke.
8. Po uporabi vedno namestite pokrovček ustnika, da preprečite vhod prahu. Trdno namestite pokrovček, da se zaskoči.



9. Iz higienskih razlogov:
 - notranjost in zunanost ustnika tedensko očistite s **suho** krpico.
 - s suho, zloženo krpico obrišite sprednji del odprtine, skozi katero izstopa zdravilo.
 - **ne** uporabljajte vode ali drugih tekočin.

Uporaba pravilne tehnike zagotovi pljučem ustrezno količino zdravila Alvesco ob vsaki uporabi inhalatorja. Zdravnik bo redno preverjal vašo tehniko inhaliranja, da bi zagotovil kar najbolj učinkovito zdravljenje.

Ko se vsebnik popolnoma izprazni, ne boste začutili niti slišali potisnega plina ob sprožitvi.

Če se po uporabi inhalatorja Alvesco pojavi sopenje ali začutite stiskanje v prsnem košu:

- **prenehajte z vpihovanjem;**
- **uporabite inhalator za lajšanje simptomov, ki vam bo pomagal pri dihanju;**
- **takoj poiščite zdravniško pomoč.**

Če imate težave z uporabo inhalatorja, vam bo zdravnik morda priporočil uporabo nastavka. Nastavek, ki ustreza inhalatorju Alvesco, se imenuje AeroChamber Plus™. Če uporabljate nastavek AeroChamber Plus™, upoštevajte priložena navodila. Zdravnik ali farmacevt vam bo svetoval, kako se uporablja nastavek.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Alvesco, kot bi smeli

Pomembno je, da uporabljate odmerek tako, kot vam je svetoval zdravnik. Odmerka ne smete povečati ali zmanjšati brez predhodnega posveta z zdravnikom.

Če ste uporabili prevelik odmerek zdravila Alvesco, posebno zdravljenje ni potrebno, kljub temu pa morate o tem obvestiti zdravnika. Če uporaba velikih odmerkov traja daljši čas, določene stopnje

zmanjšanja delovanja nadledvične žleze ni mogoče izključiti in morda bo potrebno nadzorovanje delovanja nadledvične žleze.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Alvesco

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Alvesco, naslednji odmerek preprosto uporabite ob običajnem času. Ne uporabite dvojnega števila vpihov, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če ste prenehali uporabljati zdravilo Alvesco

Četudi se počutite bolje, inhalatorja Alvesco ne smete prenehati uporabljati.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če prenehate uporabljati to zdravilo, morate o tem takoj obvestiti zdravnika.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Če opazite katerega koli od sledečih resnih neželenih učinkov, prenehajte uporabljati to zdravilo in se takoj pogovorite z zdravnikom:

- resne alergijske reakcije, kot so otekanje ustnic, jezika in žrela (pojavijo se lahko pri manj kot 1 od 1.000 bolnikov).
- alergijske reakcije: kožni izpuščaji, rdečica, srbečica ali modrice kot koprivnica in urtikarija (pojavijo se lahko pri manj kot 1 od 100 bolnikov).
- kašelj ali piskanje, ki se poslabša kmalu po inhalaciji (pojavijo se lahko pri manj kot 1 od 100 bolnikov).

Drugi neželeni učinki, ki se lahko pojavijo pri uporabi zdravila Alvesco, so po navadi blagi. V večini primerov se zdravljenje lahko nadaljuje. Neželeni učinki, ki se lahko pojavijo, so:

Občasni neželeni učinki (pojavijo se lahko pri manj kot 1 od 100 bolnikov):

- hripavost.
- pekoč občutek, vnetje, draženje ust ali žrela.
- bele obloge na ustni sluznici (glivična okužba).
- glavobol.
- neprijeten okus.
- suha usta ali žrelo.
- siljenje na bruhanje ali bruhanje.

Redki neželeni učinki (pojavijo se lahko pri manj kot 1 od 1.000 bolnikov):

- občutek bitja srca (palpitacije).
- neugodje in bolečina v trebuhu.
- visok krvni tlak.

Neželeni učinki neznane pogostnosti:

- motnje spanja, depresija ali občutek zaskrbljenosti, nemir, živčnost, prekomerna razburjenost ali razdražljivost. Ti učinki so verjetnejši pri otrocih.
- zamegljen vid

Zdravilo Alvesco lahko vpliva na normalno nastajanje kortikosteroidov v telesu. To se običajno pojavi pri bolnikih, ki dalj časa jemljejo visoke odmerke. Med temi učinki so lahko:

- upočasnitev rasti pri mladostnikih,
- tanjšanje kosti,
- morebitna zameglitev leče v očesu (katarakta), ki povzroči zamegljen vid.
- izguba vida zaradi nenormalno visokega tlaka v očesu (glavkom).

- lunast obraz, povečanje telesne mase v zgornjem delu telesa in tanjšanje rok in nog (Cushingoidne značilnosti ali Cushingov sindrom).

Pri mladostnikih, ki se zdravijo daljši čas, mora zdravnik redno preverjati telesno višino. Če se rast upočasni, bo zdravnik prilagodil zdravljenje na najnižji možni odmerek, ki še zagotavlja učinkovit nadzor astme.

Kortikosteroidi v obliki tablet lahko povzročijo več neželenih učinkov kot kortikosteroidi v obliki inhalatorja kot je Alvesco. Če ste jemali steroide v obliki tablet pred uporabo zdravila Alvesco ali med njo, lahko tveganje za pojav neželenih učinkov traja še nekaj časa. Zdravnik vam bo z rednimi pregledi zagotovil ustrezen odmerek zdravila Alvesco. Ob rednih pregledih se bodo morebitni neželeni učinki odkrili že v začetni fazi in tako se bo zmanjšala možnost za njihovo poslabšanje.

Zapomnite si:

Če kateri koli neželeni učinek postane resen ali če opazite kateri koli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite zdravnika ali farmacevta.

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks: +386 (0)8 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Alvesco

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Inhalatorja ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki in škatli poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Vsebnik vsebuje tekočino pod tlakom. Ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C.

Vsebnika ne smete preluknjati, kakorkoli drugače poškodovati ali sežgati, tudi če je prazen.

Kot pri večini zdravil za inhaliranje, ki so v vsebnikih pod tlakom, je lahko zdravilni učinek zdravila manjši, če je vsebnik mrzel. Vendar inhalator zdravila Alvesco dovaja enako stopnjo odmerka pri temperaturi v razponu od minus 10 °C do plus 40 °C.

Če se zdravnik odloči prekiniti zdravljenje ali če se inhalator izprazni, ga vrnite v lekarno, kjer ga bodo varno odstranili. To je pomembno, ker lahko sledi zdravila ostanejo v vsebniku, tudi če je videti prazen.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Alvesco

- **Učinkovina** je ciklezonid. Pri vsaki sprožitvi se sproži vpih (odmerek, ki se dovaja skozi ustnik), ki vsebuje 80 ali 160 mikrogramov ciklezonida.
- **Pomožni snovi** sta brezvodni etanol in potisni plin (HFA-134a, norfluran).
- To zdravilo vsebuje fluorirane toplogredne pline.

Alvesco 80 mikrogramov/odmerek, 30 odmerkov - En inhalator vsebuje 4.32 g HFA-134a, kar ustreza 0.006 tone ekvivalenta CO₂ (potencial globalnega segrevanja (GWP) = 1430).

Alvesco 80 mikrogramov/odmerek, 60 odmerkov - En inhalator vsebuje 5.60 g HFA-134a, kar ustreza 0.008 tone ekvivalenta CO₂ (potencial globalnega segrevanja (GWP) = 1430).

Alvesco 80 mikrogramov/odmerek, 120 odmerkov - En inhalator vsebuje 8.82 g HFA-134a, kar ustreza 0.013 tone ekvivalenta CO₂ (potencial globalnega segrevanja (GWP) = 1430).

Alvesco 160 mikrogramov/odmerek, 30 odmerkov - En inhalator vsebuje 4.31 g HFA-134a, kar ustreza 0.006 tone ekvivalenta CO₂ (potencial globalnega segrevanja (GWP) = 1430).

Alvesco 160 mikrogramov/odmerek, 60 odmerkov - En inhalator vsebuje 5.59 g HFA-134a, kar ustreza 0.008 tone ekvivalenta CO₂ (potencial globalnega segrevanja (GWP) = 1430).

Alvesco 160 mikrogramov/odmerek, 120 odmerkov - En inhalator vsebuje 8.80 g HFA-134a, kar ustreza 0.013 tone ekvivalenta CO₂ (potencial globalnega segrevanja (GWP) = 1430).

Izgled zdravila Alvesco in vsebina pakiranja

Zdravilo Alvesco je bistra, brezbarvna tekočina v aluminijastem vsebniku pod tlakom, ki skozi ustnik dovaja natančno odmerjen odmerek ciklezonida v obliki pršila.

Velikosti pakiranj:

Inhalator s **30** odmerki.

Inhalator s **60** odmerki.

Inhalator s **120** odmerki.

Inhalatorji vseh jakosti vsebujejo dovolj zdravila za 30, 60 ali 120 vpihov. Glede na dnevno število vpihov, ki vam jih je zdravnik priporočil, vsebuje:

- inhalator s 30 odmerki dovolj zdravila za dva do štiri tedne.
- inhalator s 60 odmerki dovolj zdravila za en do dva meseca.
- inhalator s 120 odmerki dovolj zdravila za dva do štiri mesece.

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način izdaje zdravila Alvesco

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Covis Pharma Europe B.V.

Gustav Mahlerplein 2

1082 MA Amsterdam

Nizozemska

Proizvajalci

Covis Pharma Europe B.V.

Gustav Mahlerplein 2

1082 MA Amsterdam

Nizozemska

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Avstrija	Alvesco 160<80> Mikrogramm – Dosieraerosol
Bolgarija	Alvesco 160<80> micrograms pressurised inhalation, solution
Ciper	Alvesco 160<80> micrograms, μικρογραμμάρια, διάλυμα για εισπνοή υπό πίεση
Hrvaška	Alvesco 160<80> mikrograma stlačeni inhalat, otopina
Češka Republika	Alvesco 160 mikrogramů/dávka roztok k inhalaci v tlakovém obalu
Danska	Alvesco 160<80> mikrogram/dosis inhalationsspray, opløsning
Finska	Alvesco 160<80> / mikrog/ annos inhalaatiosumute, liuos
Francija	Alvesco 160<80> microgrammes/dose, solution pour inhalation en flacon pressurisé
Nemčija	Alvesco 160<80> Mikrogramm, Druckgasinhalation, Lösung
Grčija	Alvesco 160<80> μικρογραμμάρια, διάλυμα για εισπνοή υπό πίεση
Madžarska	Alvesco 160<80> mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat
Irska	Alvesco 160<80> micrograms pressurised inhalation solution
Italija	Alvesco 160<80> mcg soluzione pressurizzata per inalazione
Latvija	Alvesco 160<80> mikrogrami aerosols inhalācijām, zem spiediena, šķīdums
Nizozemska	Alvesco 160<80> Inhalator, aërosol, oplossing 160, 80 microgram/dosis
Norveška	Alvesco 160<80> mikrogram/dose inhalasjonsaerosol, oppløsning
Poljska	Alvesco 160<80> 160, 80 µg/dawkę inhalacyjną; aerozol inhalacyjny, roztwór
Romunija	Alvesco 160<80> Inhaler, 160, 80 micrograme/doză, solutie de inhalat presurizată
Slovaška	Alvesco 160<80> Inhalátor inhalačný roztok v tlakovom obale
Slovenija	Alvesco 160<80> mikrogramov/odmerek inhalacijska raztopina pod tlakom
Španija	Alvesco 160 microgramos/ inhalación solución para inhalación en envase a presión
Švedska	Alvesco 160<80> microgram/dos inhalationsspray, lösning
Združeno kraljestvo (Severna Irska)	Alvesco 160<80> Inhaler

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 19. 3. 2026.