

NAVODILO ZA UPORABO

NAVODILO ZA UPORABO

Detmed 2 mg/g dermalno pršilo, raztopina
benzalkonijev klorid

SAMO ZA ZUNANJO UPORABO!

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Detmed 2 mg/g dermalno pršilo

Zdravilo vsebuje 2 mg/g benzalkonijevega klorida kot zdravilno učinkovino in propilenglikol, ki lahko povzroči draženje kože.

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu pa morate zdravilo Detmed 2 mg/g dermalno pršilo uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali se ne izboljšajo v 5 dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Detmed 2 mg/g dermalno pršilo in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Detmed 2 mg/g dermalno pršilo
3. Kako uporabljati zdravilo Detmed 2 mg/g dermalno pršilo
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Detmed 2 mg/g dermalno pršilo
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO DETMED 2 mg/g DERMALNO PRŠILO IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Detmed uporabljamo za čiščenje manjših svežih ran in odstranjevanje pogostih bakterij, ki so povezane z okužbo manjših ran. Zdravilo ni namenjeno za izboljšanje celjenja ran in ga ne smete uporabljati v ta namen.

Zdravila ne smete uporabljati na obsežnih ali hudih ranah. Zdravilo je namenjeno le za občasno in kratkotrajno uporabo na manjših površinah. Uporabiti ga smete le enkrat v 24 urah.

Zdravilo je pripravljeno za uporabo. Pred uporabo ga ni treba redčiti.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO DETMED 2 mg/g DERMALNO PRŠILO

Ne uporabljajte zdravila Detmed

- pri otrocih, mlajših od 1 leta.
- če ste alergični (preobčutljivi) na benzalkonijev klorid ali katerikoli sestavino zdravila Detmed.
- Zdravila ne smete uporabljati neprekinjeno. Zdravila ne smete uporabljati pogosteje kot enkrat na 24 ur.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Detmed

- Zdravila ne smete uporabljati okrog oči, ušes, spolovil ali v ustih. Če pride zdravilo v stik z očmi, prizadeto oko sperite z velikimi količinami hladne vode.
- Ne vdihujte. Samo za zunanjo uporabo.
- Zdravila ne smete uporabljati na obsežnih poškodbah, ki obsegajo več kot 5 % telesne površine (5 % telesne površine približno ustreza manjšim ranam na obeh kolenih in komolcih).

Uporaba drugih zdravil

Zdravila Detmed ni priporočljivo uporabljati skupaj z drugimi podobnimi zdravili, saj študij o učinkih sočasne uporabe takšnih zdravil niso izvedli.

Nosečnost in dojenje

Škodljivih vplivov zaradi uporabe zdravila med nosečnostjo in dojenjem ni pričakovati, saj je absorpcija zdravila preko kože minimalna.

Ker bi lahko otrok med dojenjem zdravilo zaužil, uporabe zdravila v predelu dojk med dojenjem ne priporočamo.

O uporabi zdravila med nosečnostjo ali dojenjem se posvetujte s farmacevtom ali z zdravnikom.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Detmed nima vpliva na sposobnost vožnje ali upravljanja s stroji.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO DETMED 2 mg/g DERMALNO PRŠILO

Pri uporabi zdravila Detmed natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Samo za zunanjo uporabo!

Pri prvi uporabi ali če zdravila niste uporabljali daljši čas, morate zdravilo najprej razpršiti na krpico ali papirnato brisačo. Le tako boste na rano lahko razpršili celoten odmerek pršila.

Odrasli in otroci, starejši od 6 let: Razpršite celoten odmerek (1 do 2 razpršitvi) enkrat na vsako rano in počakajte pet minut. Odvečno tekočino po potrebi obrišite s čisto tkanino ali kosmom vate.

Otroci, stari od 1 leta do 6 let: Če ste kakorkoli zaskrbljeni, se pred uporabo zdravila posvetujte s farmacevtom ali z zdravnikom. Zdravilo razpršite enkrat (1 razpršitev) na vsako rano (**zdravilo lahko naenkrat nanesete na največ 4 rane**) in počakajte pet minut. Odvečno tekočino po potrebi obrišite s čisto tkanino ali kosmom vate.

Zdravilo pršite z razdalje od 4 do 15 cm. Zdravila ne smete vdihniti.

Milo lahko deaktivira pršilo, zato ga pri čiščenju rane ne smete uporabljati sočasno s pršilom.

Če se rana zopet odpre, lahko pršilo ponovno uporabite. Vendar pa zdravila ne smete uporabljati neprekinjeno. **Zdravilo lahko uporabite le enkrat v 24 urah. Zdravilo lahko uporabljate največ 3 do 5 dni.**

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila ali ste zaradi poškodbe kakorkoli zaskrbljeni, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Detmed neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Zelo redki neželeni učinki (pri manj kot 1 od 10.000 oseb, ki so uporabile pršilo) o katerih so poročali pri lokalnem čiščenju manjših ran so: srbenje kože, kožni izpuščaj, draženje kože, pekoč občutek, oteklina in sprememba barve ali rdečina kože. Na področju kože se po uporabi zdravila lahko pojavi reakcija, kot je luščenje kože. V primeru pojava takšne reakcije zdravilo neahajte uporabljati in se posvetujte s farmacevtom ali z zdravnikom. Če imate ekcem, se lahko stanje po uporabi tega zdravila poslabša. Poročali so tudi o izpadanju las ali dlak.

Če katerikoli neželeni učinek ne mine ali postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA DETMED 2 mg/g DERMALNO PRŠILO

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Detmed ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake EXP. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Detmed 2 mg/g dermalno pršilo

- Zdravilna učinkovina je benzalkonijev klorid, 2 mg/g.
- Pomožne snovi so propilenglikol, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat dodekahidrat, blaga aroma borovca, dinatrijev edetat dihidrat in prečiščena voda.

Izgled zdravila Detmed in vsebina pakiranja

Zdravilo Detmed je bistra in brezbarvna raztopina z blago aromo borovca. Zdravilo je pripravljeno za uporabo. Na voljo je v plastenki z zaporko z mehanskim pršilnikom, ki vsebuje 10 ml ali 100 ml pršila.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila Detmed

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Reckitt Benckiser (UK) Ltd,
103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3UH,

Velika Britanija

Odgovoren za trženje v Sloveniji

PharmaSwiss d.o.o.

Izdelovalec

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Dansom Lane Hull

HU8 7DS

Velika Britanija

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Bolgarija:	Dettol Med Wound Spray 0.20 % w/w Cutaneous Spray Solution
Ciper:	Dettol Med Wound Spray 0.20 % w/w
Češka:	Dettol 0.20% antiseptický sprej
Estonija:	Dettol Med
Grčija:	Dettox Wound Spray 0.20% w/v
Madžarska:	Dettol Med külsőleges oldatos spray
Irska:	Benzalkonium Chloride Reckitt Benckiser 0.20%w/w Cutaneous Spray solution
Italija:	Dettolmed 0.2% w/w Spray Cutaneo Soluzione (Benzalconio Cloruro)
Latvija:	Dettol Med 0,20 % uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums
Litva:	Dettol Med 0,20 % odos purškalas, tirpalas
Nizozemska:	Dettol Med Benzalkoniumchloride 2 mg/g huidspray,oplossing voor cutaan gebruik
Poljska:	Dettol Med do przemywania ran
Portugalska:	Detolpro, 2 mg/g solução para pulverização cutânea
Romunija	DettolMed 0,2% spray cutanat, soluție
Slovaška:	Dettolmed 0,20%w/w Antiseptický sprej
Slovenija:	Detmed 2 mg/g dermalno pršilo, raztopina
Španija:	DettolMed 2 mg/ml solución para pulverización cutánea

Navodilo je bilo odobreno

29. 10. 2015