

NAVODILO ZA UPORABO

Enalapril/hidroklorotiazid Teva 20 mg/12,5 mg tablete

enalapriljev maleat/hidroklorotiazid

Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

NAVODILO VSEBUJE:

1. Kaj je zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva
3. Kako jemati zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Enalapril/hidroklorotiazid Teva
6. Dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva in za kaj ga uporabljamo

- Enalapril spada v skupino zdravil, imenovanih zaviralci angiotenzin konvertirajočega encima (zaviralci ACE), in niža krvni tlak s širjenjem krvnih žil.
- Hidroklorotiazid spada v skupino zdravil, imenovanih diuretiki (tablete za odvajanje vode), in znižuje krvni tlak tako, da poveča izločanje urina.
- Zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva vsebuje kombinacijo enalapрила in hidroklorotiazida in se uporablja za zdravljenje visokega krvnega tlaka takrat, ko zdravljenje z zgolj enalaprilom ni dovolj učinkovito.

Zdravnik vam lahko predpiše zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva tablete namesto posameznih tablet enakih odmerkov enalapрила in hidroklorotiazida. Ta fiksno določena kombinacija odmerka ni primerna za začetno zdravljenje.

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva

NE jemljite zdravila Enalapril/hidroklorotiazid Teva:

- če ste alergični (preobčutljivi) na enalapril, hidroklorotiazid ali katerikoli drugo sestavino zdravila,

- če ste alergični (preobčutljivi) na druge zaviralce ACE, npr. ramipril ali sulfonamidne derivate (predvsem antibiotike, npr. sulfametoksazol),
- če ste že imeli težave zaradi otekanja okončin, obraza, ustnic, vratu, ust ali jezika (angioedem) pri zdravljenju z drugimi zdravili, ki spadajo v skupino zdravil, imenovanih zaviralci ACE (zaviralci angiotenzin konvertirajočega encima), kot je ramipril,
- če ste že imeli težave zaradi otekanja okončin, obraza, ustnic, grla, ust ali jezika (angioedem) zaradi kakršnihkoli drugih vzrokov,
- če je kateri od vaših krvnih sorodnikov že imel težave zaradi otekanja okončin, obraza, ustnic, grla, ust ali jezika (angioedem),
- če imate hude težave z ledvicami,
- če ne morete odvajati seča,
- če imate hude težave z jetri ali nevrološko motnjo, ki je posledica hudih težav z jetri (hepatična encefalopatija),
- če ste noseči več kot tri mesece (priporočamo vam tudi, da zdravila Enalapril/hidroklorotiazid Teva ne uporabljate v zgodnji nosečnosti – glejte poglavje Nosečnost in dojenje).

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Enalapril/hidroklorotiazid Teva

Preden pričnete jemati zdravilo povejte zdravniku, če:

- imate zoženje arterij (arterioskleroza), možganskožilne težave, kot je možganska kap ali prehodni ishemični napad (TIA – »mala možganska kap«),
- imate popuščanje srca,
- imate nizek krvni tlak, ste na dieti z omejevanjem soli ali jemljete diuretike (tablete za odvajanje vode),
- imate nenormalno raven vode in mineralov v telesu (neravnovesje tekočine/elektrolitov),
- imate obolenje srčne mišice (hipertrofična kardiomiopatija), zoženje glavne arterije, po kateri odteka kri iz srca, aorte (aortna stenoza), ali druge oblike srčnih težav, pri katerih je moten iztok krvi iz srca,
- se zdravite z LDL-aferezo (odstranjevanje holesterola iz krvi z uporabo naprave),
- se zdravite z desenzibilizacijsko terapijo za nekatere strupe žuželk, kot so piki čebel in os,
- imate sladkorno bolezen,
- imate protin, visoke ravni sečne kisline v krvi ali pa se zdravite z alopurinolom,
- morate prejeti anestetik,
- ste nedavno preboleli dolgotrajno, močno bruhanje in/ali hudo drisko,
- boste testirani za delovanje obščitnice,
- imate ali ste imeli težave z jetri ali ledvicami, ali če imate zožene arterije do ledvic (stenoza ledvične arterije), ali če imate samo eno delujočo ledvico ali se zdravite s hemodializo,
- imate sistemsko vezivno-tkivno bolezen, kot je sistemski eritematozni lupus (SLE) ali sklerodermija, ki je lahko povezana s kožnimi izpuščaji, bolečinami v sklepih in vročino,
- imate težave zaradi alergij ali astme,

- jemljete litij, ki se uporablja za zdravljenje nekaterih psihiatričnih bolezni.

Zdravniku morate povedati če ste noseči ali mislite, da ste noseči. Jemanje zdravila Enalapril/hidroklorotiazid Teva v zgodnjem obdobju nosečnosti se ne priporoča, po tretjem mesecu nosečnosti pa lahko resno škoduje vašemu otroku (glejte poglavje Nosečnost in dojenje)

Zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva se ponavadi ne predpisuje, če velja naslednje, zato se pogovorite z zdravnikom, preden pričnete jemati to zdravilo:

- če so vam pred kratkim presadili ledvico,
- če imate visoke vrednosti kalija v krvi.

Upoštevajte tudi poglavje »Jemanje drugih zdravil« v nadaljevanju.

Posvetujte se s svojim zdravnikom, če ste športnik, ki bi moral opraviti preverjanje jemanja nedovoljenih poživil (doping), saj zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva vsebuje zdravilno učinkovino, ki lahko povzroči pozitiven rezultat pri preverjanju jemanja nedovoljenih poživil.

Starejši ali podhranjeni bolniki morajo biti pri jemanju zdravila Enalapril/hidroklorotiazid Teva še posebno previdni.

Zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva je lahko manj učinkovito pri bolnikih črne rase.

To zdravilo se ne priporoča za zdravljenje otrok.

Ko jemljete zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva:

Če se pri vas pojavi kateri od sledečih simptomov, takoj obvestite svojega zdravnika:

- če po prvem odmerku občutite omotico. Nekateri ljudje se odzovejo na prvi odmerek ali na povečanje odmerka z omotico, šibkostjo, rahlo omedlevico in slabostjo,
- nenadno otekanje ustnic, obraza in vratu, možno tudi dlani in stopal, zasoplost ali hripavost. To stanje se imenuje angioedem. Lahko se pojavi kadarkoli med zdravljenjem. Zaviralci ACE povzročajo večjo pogostost angioedema pri bolnikih črne rase kot pri bolnikih drugih ras,
- povišano temperaturo, boleče žrelo ali razjede v ustih (to so lahko simptomi vnetja, ki ga povzroči zmanjšanje števila belih krvnih celic),
- porumenelost kože in beločnic (zlatenica), kar je lahko znak bolezni jeter,
- suh kašelj, ki je dolgotrajen. O kašlju so poročali pri uporabi zaviralcev ACE, vendar je lahko to tudi znak druge bolezni zgornjih dihal.

Jemanje drugih zdravil

- kalijevi dodatki ali nadomestki soli s kalijem,
- diuretiki (tablete za odvajanje vode), ki se uporabljajo za zdravljenje visokega krvnega tlaka, vključno z diuretiki, ki varčujejo s kalijem, npr. spironolakton, triamteren ali amilorid,
- druga zdravila za zdravljenje visokega krvnega tlaka,
- anestetiki in zdravila za zdravljenje duševnih motenj in depresije, zdravila za zdravljenje nekaterih psihoz, triciklični antidepresivi ali sedativi,
- litij (zdravilo za zdravljenje duševnih motenj),
- nesteroidna protivnetna zdravila lahko preprečijo dober nadzor krvnega tlaka in lahko povišajo raven kalija v krvi,
- zlate injekcije (natrijev aurotiomat) za zdravljenje revmatoidnega artritis,
- zdravila, kot so efedrin, ki se uporablja pri kašlju in prehladu, ali noradrenalin in adrenalin, ki se uporabljata za zdravljenje nizkega krvnega tlaka, šoka, odpovedi srca, astme ali alergij,
- zdravila za zniževanje ravni sladkorja, kot so insulin ali peroralni antidiabetiki,
- holestiraminska smola in holestipol sta zdravili za zniževanje vrednosti lipidov v krvi,
- kortikosteroidi, protivnetne, hormonom podobne učinkovine,
- kortikotropin (ACTH) se uporablja predvsem za testiranje, ali nadledvične žleze delujejo pravilno,
- mišični relaksanti (*npr.* turbokurarinijev klorid, zdravila za sprostitvev mišic, ki se uporabljajo pri operacijah),
- zdravila za zdravljenje raka, kot sta ciklofosfamid ali metotreksat,
- srčni glikozidi (na primer digoksin, zdravila za okrepitev srca),
- zdravila, ki povzročijo kot stranski učinek nenormalnosti pri prevajanju dražljajev v srcu, kot so zdravila za odpravljanje motenj srčnega ritma (*npr.* kinidin, prokainamid, amiodaron, sotalol).

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta, zeliščne ali naravne izdelke.

Jemanje zdravila Enalapril/hidroklorotiazid Teva skupaj s hrano in pijačo

Zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva lahko jemljete neodvisno od obrokov.

Pitje alkohola skupaj z zdravilom lahko poveča učinek znižanja krvnega tlaka (in med drugim lahko povzroči omotico pri vstajanju).

Nosečnost in dojenje

Nosečnost

Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči, ali če obstaja verjetnost, da boste zanosili. Zdravnik vam bo praviloma svetoval jemanje drugega zdravila namesto zdravila Enalapril/hidroklorotiazid Teva, še preden zanosite ali takoj, ko ugotovite, da ste noseči. Jemanje zdravila Enalapril/hidroklorotiazid Teva v zgodnjem obdobju nosečnosti se ne

priporoča, po tretjem mesecu nosečnosti pa se ne sme jemati, ker bi lahko resno škodilo otroku.

Dojenje

Zdravniku morate povedati, če dojite ali če nameravate dojiti. Zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva se odsvetuje materam, ki dojijo.

Obe učinkovini, enalapril in hidroklorotiazid, se izločata v materino mleko. Hidroklorotiazid lahko tudi zmanjša količino mleka in povzroči druge neželene učinke.

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva lahko povzroči omotico in utrujenost. Če se pri vas pojavi katerikoli od teh učinkov, ne vozite avtomobila in ne uporabljajte strojev (glejte tudi poglavje 4 »Možni neželeni učinki«).

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Enalapril/hidroklorotiazid Teva

Bolniki, ki so preobčutljivi za laktozo, morajo vedeti, da tablete Enalapril/hidroklorotiazid Teva vsebujejo majhne količine laktoze. Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujete z njim.

3. Kako jemati zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva

Pri jemanju zdravila Enalapril/hidroklorotiazid Teva natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Odrasli

Običajni odmerek je ena tableta enkrat na dan.

Starejši bolniki

Vaš zdravnik lahko previdno prilagodi odmerek enalapрила in hidroklorotiazida.

Težave z ledvicami

Vaš zdravnik bo previdno prilagodil odmerek enalapрила in hidroklorotiazida.

Način jemanja

Tablete morate zaužiti z vodo. Zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva se lahko jemlje z obrokom ali na tešče.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Enalapril/hidroklorotiazid Teva, kot bi smeli

Če vi (ali kdorkoli drug) zaužijete veliko tablet skupaj ali če menite, da je otrok zaužil tableto, takoj poiščite zdravniško pomoč. Prevelik odmerek lahko povzroči nizek krvni tlak, zelo hiter ali zelo počasen srčni utrip, palpitacije (občutek nenavadno hitrega

utripanja ali nepravilnega utripanja srca), šok, pospešeno dihanje, kašelj, občutek slabosti in bruhanje, krče, omotico, občutek zaspanosti in zmedenosti ali pretirano zaskrbljenost, povečano izločanje urina ali nezmožnost uriniranja. Vzemite to navodilo, vse preostale tablete in škatlico s seboj v bolnišnico ali k zdravniku, da bodo vedeli, katere tablete ste zaužili.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnjo tableto; naslednji odmerek vzemite ob običajnem času. Če imate dodatna vprašanja o uporabi tega zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Če ste prenehali jemati zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva

Zdravljenje hipertenzije je dolgotrajno in o prekinitvi zdravljenja se morate posvetovati z zdravnikom. Prekinitev ali prenehanje zdravljenja lahko povzroči dvig vašega krvnega tlaka.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Pogostost neželenih učinkov je opredeljena tako:

Zelo pogosti	pojavi se pri več kot 1 od 10 bolnikov
Pogosti	pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov
Občasni	pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 1000 bolnikov
Redki	pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov
Zelo redki	pojavi se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov
Neznana pogostost	pogostosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

Če se pojavijo sledeči učinki, prenehajte jemati zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva in nemudoma obvestite zdravnika ali se oglasite na najbližjem oddelku nujne zdravniške pomoči:

- huda alergijska reakcija, imenovana angioedem (izpuščaj, srbečica, otekanje okončin, obraza, ustnic, ust ali grla, ki lahko povzročijo težave pri požiranju in dihanju).
To je resen in pogost neželeni učinek. Možno je, da boste potrebovali nujno zdravniško pomoč ali da boste morali ostati v bolnišnici;
- zlatenica (porumenitev kože in očne beločnice).
To je potencialno resen, vendar redek neželeni učinek in je znak vnetja jeter. Možno je, da boste potrebovali nujno zdravniško pomoč ali da boste morali ostati v bolnišnici.

Zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva pogosto povzroča nizek krvni tlak, ki je lahko povezan z občutkom omotice in šibkosti. Pri nekaterih bolnikih se to lahko zgodi po prvem odmerku ali po povečanju odmerka. Če opazite te simptome, se nemudoma posvetujte s svojim zdravnikom.

Zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva lahko povzroči zmanjšanje števila belih krvničk in vaša odpornost na okužbe se lahko zmanjša. Če opazite okužbo s simptomi, kot so vročina in resno poslabšanje splošnega stanja ali vročino s simptomi lokalne okužbe, kot so boleče grlo/žrelo/usta, ali težave pri uriniranju, se nemudoma posvetujte s svojim zdravnikom. Opravi bo pregled krvi, da bi ugotovil možno zmanjšanje števila belih krvničk (agranulocitoza). Pomembno je, da svojemu zdravniku poveste, da jemljete to zdravilo.

Suh kašelj, ki je lahko dolgotrajen, se pojavlja zelo pogosto pri uporabi zdravila Enalapril/hidroklorotiazid Teva in drugih zaviralcev ACE, vendar je to lahko tudi znak druge bolezni zgornjih dihal. Posvetujte se s svojim zdravnikom, če opazite ta simptom.

Poročali so tudi o pojavu naslednjih neželenih učinkov:

Zelo pogosti

- zamegljen vid
- omotica
- kašelj
- slabost
- zaspanost

Pogosti

- glavobol, depresija, nizek krvni tlak
- omedlevica, bolečine v prsih, neenakomeren srčni utrip, angina pectoris, zelo pospešeno bitje srca (tahikardija)
- srčni napad ali prehodni možganskožilni napad (»mala možganska kap«) (predvsem pri bolnikih, ki trpijo zaradi nizkega krvnega tlaka)
- zadihanost
- driska, bolečina v trebuhu, moteno okušanje, spremenjeno okušanje, zastajanje tekočine (edem)
- izpuščaji, preobčutljivost/angionevrotski edem: poročali so o angionevrotskem edemu obraza, okončin, ustnic, jezika, glasilk in/ali grla
- utrujenost
- mišični krči
- visoke ravni kalija v krvi, ki lahko povzročijo neenakomeren srčni utrip; povišanje vrednosti kreatinina v krvi, nizke ravni kalija v krvi, visoke ravni holesterola, povišane ravni trigliceridov, povišane ravni sečne kisline v krvi

Občasni

- upad števila rdečih krvničk, kar lahko povzroči blede kožo in oslabelost ali zadihanost (anemija)

- hipoglikemija (nizka vrednost krvnega sladkorja) (glejte poglavje 2 »Na kaj morate biti posebej pozorni pri jemanju zdravila Enalapril/hidroklorotiazid Teva«)
- zmedenost, zaspanost, nespečnost, živčnost, mravljinčenje ali otopelost, vrtoglavica
- nizek krvni tlak, ki je povezan s spremembami položaja telesa (kot je občutek omotice ali šibkosti, ko vstanete iz ležečega položaja), palpitacije (občutek hitrega ali precej močnega ali nepravilnega utripanja srca), srčni infarkt ali možganska kap (pri bolnikih z velikim tveganjem)
- izcedek iz nosu, boleče žrelo, hripavost, težave pri dihanju, sopenje
- zapora črevesja, vnetje trebušne slinavke, ki povzroča močno bolečino v trebuhu in hrbtu (pankreatitis), bruhanje, prebavne težave, zaprtost, izguba apetita, razdražen želodec, suha usta, peptična razjeda, vetrovi, protin
- potenje, srbečica, koprivnica, izpadanje las
- težave z ledvicami, beljakovine v urinu
- bolečine v sklepih
- impotenca, zmanjšan libido
- mišični krči, vročinski oblivi, zvonjenje v ušesih, slabo počutje, povišana telesna temperatura,
- nizke ravni magnezija v krvi (hipomagneziemija)
- nizke ravni natrija v krvi, kar lahko povzroči utrujenost in zmedenost, trzanje mišic, epileptične napade ali komo, lahko privede tudi do dehidracije in nizkega krvnega tlaka, ki povzroča omotico ob vstajanju; povišanje ravni sečnine v krvi

Redki

- zmanjšanje števila belih krvnih celic, kar poveča verjetnost za okužbo, zmanjšanje števila drugih krvnih celic, spremembe v sestavi krvi, slaba produkcija kostnega mozga, obolenje bezgavk, avtoimunske bolezni, pri katerih telo napade lastna tkiva in organe
- nenavadne sanje, motnje spanja
- Raynaudov sindrom, bolezen krvnih žil, ki lahko povzroči mravljinčenje v prstih na rokah in nogah, ki najprej pobledijo, potem postanejo modrikasti in nato pordijo,
- težave s pljuči, vključno s pljučnico, vnetje nosne sluznice, ki povzroča izcedek iz nosu (rinitis)
- razjede v ustih, vnetje jezika
- težave z jetri
- kožni izpuščaj, močna mehurjavost, pordelost kože, Stevens-Johnsonov sindrom (pojav mehurjev na koži, v ustih, na očeh in spolovilih), Lyellov sindrom (izgled kože, kot da je opečena in se lupi), pemfigus (bolezen, ki povzroča mehurje in razjede, ki se ponavadi pričnejo v ustih, koprivnica, izpadanje las in srbečica), občutljivost kože za svetlobo, kožne bolezni z rdečimi luskavimi lisami po nosu in licah (eritematozni lupus) – pri bolnikih z že obstoječo boleznijo se ta lahko poslabša, hude alergijske reakcije. Včasih težave s kožo spremljajo povišana telesna temperatura, hudo vnetje, vnetje krvnih žil, bolečine v mišicah in/ali sklepih, spremembe v sestavi krvi in povečana sedimentacija (krvni test za ugotavljanje vnetja)
- zmanjšana produkcija urina, vnetje ledvic (intersticijski nefritis)

- povečanje prsi, tudi pri moških
- povečanje števila encimov in odpadnih produktov, ki jih proizvajajo jetra, povišanje ravni sladkorja v krvi
- šibkost mišic, včasih zaradi nizke ravni kalija

Zelo redki

- otekanje črevesja
- povišane ravni kalcija v krvi

Neznana pogostost

- sindrom neustreznega izločanja antidiuretskega hormona (SIADH): povišana raven krvnega sladkorja, maščob ali sečne kisline, glukoza v urinu; nizke ravni kalija v krvi, kar lahko povzroči mišično oslabelost, trzanje ali nepravilno utripanje srca; visoke ravni kalcija v krvi, ki lahko povzročajo trebušne bolečine, občutek slabosti in bruhanje, zaprtost, izgubo apetita, prekomerno žejo, prekomerno uriniranje, utrujenost, šibkost in izgubo telesne mase

Če katerikoli od neželenih učinkov postane resen ali če opazite neželeni učinek, ki ni opisan v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. Shranjevanje zdravila Enalapril/hidroklorotiazid Teva

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Enalapril/hidroklorotiazid Teva ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in nalepki. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva

- Zdravilni učinkovini sta enalapriljev maleat in hidroklorotiazid.
- Ena tableta vsebuje 20 mg enalapriljevega maleata in 12,5 mg hidroklorotiazida.
- Pomožne snovi so laktoza monohidrat, koruzni škrob, predgelirani koruzni škrob, natrijev hidrogenkarbonat, magnezijev stearat.

Izgled zdravila Enalapril/hidroklorotiazid Teva in vsebina pakiranja

Zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva 20/12,5 mg tablete so bele, okrogle, rahlo zaobljene tablete, z oznakama »EL« in »20« ter razdelilno zarezo na eni strani in gladko površino na drugi strani. Tableta se lahko deli na enaki polovici.

Zdravilo Enalapril/hidroklorotiazid Teva 20/12,5 mg tablete so na voljo v velikosti pakiranj po 14, 20, 28, 28 (4 x 7), 30, 49, 49 (49 x 1), 50, 56, 60, 90, 98, 98 (14 x 7) in 100 tablet. Bolnišnično pakiranje po 50 in 300 tablet.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim izdaje zdravila

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Teva Pharma B.V.,
Computerweg 10,
3542 DR Utrecht
Nizozemska

Izdelovalci

TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex,
BN22 9AG,
Velika Britanija

Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, Postbus 552,
2003 RN Haarlem,
Nizozemska

TEVA Santé
Rue Bellocier, 89107 Sens
Francija

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13, 4042 Debrecen
Madžarska

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

AT: Enalapril/HCT-TEVA 20 mg/12,5 mg Tabletten

DE: Enalapril/HCT-TEVA® 20 mg/12,5 mg Tabletten
DK: Enalapril Hydrochlorthiazid Teva
EE: Enalapril/HCTZ-Teva
ES: Enalapril/HCTZ TEVA 20/12,5 mg Comprimidos EFG
FI: Enalapril Hydrochlorthiazid Teva
FR : Enalapril Hydrochlorothiazide TEVA® 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable
HU : Enalapril-HCTZ-Teva 20 mg/12,5 mg tabletta
IE: Enalapril Maleate Hydrochlorothiazide 20 mg/12.5 mg Tablets
IT: Enalapril Idroclorotiazide Teva 20 mg/12,5 mg compresse
NL: Enalaprilmaleaat/HCT 20/12,5 mg Teva, tabletten
NO: Enalapril Comp Teva
PL : Enateva HCT
PT: Enalapril + Hidroclorotiazida Teva
SE: Enalapril Comp Teva
SI : Enalapril/hidroklorotiazid TEVA 20 mg/12,5 mg tablete
SK: Tevanap 20 mg/12,5 mg

Navodilo je bilo odobreno

08. 04. 2013