

NAVODILO ZA UPORABO

Navodilo za uporabo

Treprostinil Tillomed Pharma 1 mg/ml raztopina za infundiranje

Treprostinil Tillomed Pharma 2,5 mg/ml raztopina za infundiranje

Treprostinil Tillomed Pharma 5 mg/ml raztopina za infundiranje

Treprostinil Tillomed Pharma 10 mg/ml raztopina za infundiranje

treprostinil

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma
3. Kako uporabljati zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Treprostinil Tillomed Pharma
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma in za kaj ga uporabljamo

Kaj je zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma

Učinkovina v zdravilu Treprostinil Tillomed Pharma je treprostinil.

Treprostinil sodi v skupino zdravil, ki delujejo podobno kot naravni prostaciklini. Prostaciklini so hormonom podobne snovi, ki zmanjšujejo krvni tlak tako, da sproščajo krvne žile, ki se razširijo in tako omogočijo lažji pretok krvi. Prostaciklini lahko vplivajo tudi na preprečevanje strjevanja krvi.

Za kaj se uporablja zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma

Zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma se uporablja za zdravljenje idiopatske ali dedne pljučne arterijske hipertenzije (PAH) pri bolnikih z zmernimi simptomi. Pljučna arterijska hipertenzija je stanje, pri katerem je krvni tlak v žilah med srcem in pljuči previsok, kar povzroči kratko sapo, omotičnost, utrujenost, omedlevico, palpitacije ali nenormalni srčni utrip, suh kašelj, bolečine v prsih in otekle gležnje ali noge.

Zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma se na začetku daje v obliki neprekinjene subkutane (podkožne) infuzije. Nekateri bolniki tega načina dajanja morda ne bodo prenašali zaradi bolečine in otekline na mestu dajanja. Vaš zdravnik se bo odločil, ali lahko zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma namesto tega dobite v obliki neprekinjene intravenske infuzije neposredno v veno, pri čemer vam bodo vstavil centralni venski kateter, ki je priključen na zunanjo črpalko. Zdravnik bo določil, katera možnost je najboljša za vas.

Kako deluje zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma

Zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma zniža krvni tlak v pljučni arteriji tako, da izboljša krvni pretok in zmanjša prekomerno delovanje srca. Izboljšan krvni pretok izboljša oskrbo telesa s kisikom in zmanjša napor srca, ki zato bolj učinkovito deluje. Treprostinil izboljšuje simptome, povezane s PAH, in zmožnost za telesno vadbo pri bolnikih, ki so pri svojih aktivnostih omejeni.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma

Ne uporabljajte zdravila Treprostinil Tillomed Pharma

- če ste alergični (preobčutljivi) na treprostinil ali katero koli sestavino tega zdravila, navedeno v poglavju 6
- če imate diagnozo bolezni imenovano “pljučna venskookluzivna bolezen“. To je bolezen, pri kateri krvne žile, ki prenašajo kri skozi vaša pljuča, otečejo in se zamašijo, kar se odraža na višjemu tlaku v krvnih žilah med srcem in pljuči.
- če imate hudo jetrno obolenje
- če imate težave s srcem, kot na primer:
 - miokardni infarkt (srčna kap) v preteklih šestih mesecih
 - hude spremembe srčnega utripa
 - hudo koronarno srčno bolezen ali nestabilno angino pectoris
 - diagnosticirano srčno napako, kot je na primer okvarjena srčna zaklopka, ki povzroča oslABLjeno delovanje srca
 - katerakoli bolezen srca, ki se ne zdravi ali ne opazuje pozorno
- če obstaja pri vas posebno veliko tveganje za krvavitve, na primer zaradi aktivnih želodčnih razjed, poškodb ali drugih krvavitev
- če vas je v zadnjih 3 mesecih zadela možganska kap ali ste imeli kakšno drugo stanje, ki prekine oskrbo možganov s kisikom.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Treprostinil Tillomed Pharma se posvetujte z zdravnikom:

- če imate kakršnokoli jetrno obolenje
- če imate ledvično obolenje
- če so vam povedali, da ste čezmerno debeli (indeks telesne mase večji kot 30 kg/m²)
- če imate okužbo z virusom HIV
- če imate visok krvni tlak v jetrnih venah (portalna hipertenzija)
- če imate prirojeno okvaro srca, ki vpliva na pretok krvi skozi njega

Med zdravljenjem z zdravilom Treprostinil Tillomed Pharma se posvetujte z zdravnikom:

- če se vaš krvni tlak zmanjša (hipotenzija)
- če se pojavi hitro poslabšanje težav z dihanjem ali trdovraten kašelj (to je lahko povezano z zamažitvijo pljuč, astmo ali drugo boleznijo), **se takoj posvetujte s svojim zdravnikom**

- če pretirano krvavite, saj lahko treprostinil, ker preprečuje strjevanje krvi, zveča tveganje
- če dobite povišano telesno temperaturo med prejemanjem treprostinila v obliki intravenske infuzije ali če mesto intravenske infuzije pordi, postane oteklo in/ali boleče na dotik, saj je lahko to znak okužbe

Druga zdravila in zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma

Obvestite zdravnika, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Obvestite svojega zdravnika, če uporabljate:

- zdravila za uravnavanje **visokega krvnega tlaka** (antihipertenzivi ali drugi vazodilatatorji)
- zdravila, ki se uporabljajo za povečanje izločanja **urina** (diuretiki), vključno s furosemidom
- zdravila, ki preprečujejo **strjevanje krvi** (antikoagulant), kot so varfarin, heparin ali zdravila na bazi dušikovega oksida
- vsa nesteroidna protivnetna zdravila (**NSAID**) (npr. acetilsalicilna kislina, ibuprofen)
- zdravila, ki lahko povečajo ali zmanjšajo učinek zdravila Treprostinil Tillomed Pharma (npr. gemfibrozil, rifampicin, trimetoprim, deferasiroks, fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, šentjanževka), ker vam bo zdravnik morda moral prilagoditi odmere zdravila Treprostinil Tillomed Pharma.

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom, preden vzamete to zdravilo.

Uporaba treprostinila ni priporočljiva, če ste noseči, nameravate zanositi ali mislite, da ste morda noseči, razen če zdravnik presodi, da je jemanje bistvenega pomena. Varnosti tega zdravila za uporabo pri nosečnicah niso ugotavljali.

Uporaba treprostinila ni priporočljiva med dojenjem, razen če zdravnik presodi, da je jemanje bistvenega pomena. Če vam je bilo predpisano zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma, vam svetujemo, da prenehate dojit, ker ni znano, ali zdravilo prehaja v materino mleko.

Med zdravljenjem s treprostinilom je močno priporočljiva kontracepcija.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma lahko povzroči nizek krvni tlak z omotičnostjo ali omedlevico. Če se vam to zgodi, ne vozite avta in ne upravljajte s stroji ter vprašajte svojega zdravnika za nasvet.

Zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma vsebuje natrij

Zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma 1 mg/ml raztopina za infundiranje

To zdravilo vsebuje 74,16 mg natrija (glavna sestavina kuhinjske/namizne soli) v eni 20-ml viali. To je enako 3,71 % priporočenega največjega dnevnega vnosa natrija za odrasle osebe.

Zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma 2,5 mg/ml raztopina za infundiranje

To zdravilo vsebuje 75,08 mg natrija (glavna sestavina kuhinjske/namizne soli) v eni 20-ml viali. To je enako 3,75 % priporočenega največjega dnevnega vnosa natrija za odrasle osebe.

Zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma 5 mg/ml raztopina za infundiranje

To zdravilo vsebuje 78,16 mg natrija (glavna sestavina kuhinjske/namizne soli) v eni 20-ml viali. To je enako 3,91 % priporočenega največjega dnevnega vnosa natrija za odrasle osebe.

Zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma 10 mg/ml raztopina za infundiranje

To zdravilo vsebuje 75 mg natrija (glavna sestavina kuhinjske/namizne soli) v eni 20-ml viali. To je enako 3,75 % priporočenega največjega dnevnega vnosa natrija za odrasle osebe.

3. Kako uporabljati zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom.

Zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma se daje v obliki neprekinjene infuzije bodisi:

- subkutano (pod kožo) preko majhne cevke (kanile), ki se nahaja v trebuhu ali v stegnu;
- ali,
- intravensko preko cevke (katetra), ki se običajno nahaja v vašem vratu, prsih ali dimljah.

V obeh primerih treprostinil skozi cevko potiska prenosna črpalka, ki je nameščena zunaj telesa (zunanja).

Preden zapustite bolnišnico ali kliniko, vam bo zdravnik povedal, kako pripraviti treprostinil in s kakšno hitrostjo naj vam črpalka dovaja treprostinil.

Izpiranje infuzijskega voda, dokler je priključen, lahko povzroči nenamerno preveliko odmerjanje.

Prejeli boste tudi navodila o pravilni uporabi črpalke in kaj narediti, če ta preneha delovati. Navodila morajo vsebovati tudi navedbo, na koga se morate v nujnem primeru obrniti.

Zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma se redči le pri neprekinjenem intravenskem infundiranju:

Za intravensko infuzijo z uporabo zunanje prenosne črpalke: raztopino treprostinila morate redčiti bodisi s sterilno vodo za injekcije ali z 9 mg/ml (0,9 %) raztopino natrijevega klorida za injiciranje (ki vam jo da zdravnik).

Odrasli bolniki

Zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma je na voljo kot 1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml ali 10 mg/ml raztopina za infundiranje. Vaš zdravnik bo določil hitrost infundiranja in odmerek, primeren za vaše stanje.

Bolniki s prekomerno telesno maso

Če imate prekomerno telesno maso (≥ 30 % nad idealno telesno maso), bo zdravnik določil začetne in nadaljevalne odmerke na podlagi vaše idealne telesne mase. Glejte tudi poglavje 2 „Opozorila in previdnostni ukrepi“.

Starejši

Vaš zdravnik bo določil hitrost infuzije in odmerek, primeren za vaše stanje.

Otroci in mladostniki

Za otroke in mladostnike je na voljo le malo podatkov.

Prilagoditev odmerka

Hitrost infundiranja se lahko zmanjša ali zveča na individualni podlagi, vendar **le pod zdravniškim nadzorom**.

Cilj prilagoditve hitrosti infuzije je ugotoviti učinkovito vzdrževalno hitrost, pri kateri se simptomi pljučne arterijske hipertenzije izboljšajo, medtem ko ostajajo neželeni učinki čim manjši.

Če se simptomi okrepijo, če morate povsem mirovati ali če ste priklenjeni na posteljo ali stol, ali če pomeni vsaka fizična aktivnost nelagodje in se simptomi pojavijo med mirovanjem, ne zvečujte svojega odmerka brez zdravniškega nasveta. Treprostinil morda več ne zadošča za zdravljenje vaše bolezni, zato bo morda potrebno drugo zdravljenje.

Kako se lahko med zdravljenjem z intravenskim dajanjem zdravila Treprostinil Tillomed Pharma prepreči okužbo krvi?

Kot pri vsakem dolgotrajnem intravenskem zdravljenju obstaja tudi tukaj tveganje za okužbo krvi. Vaš zdravnik vas bo poučil, kako jo lahko preprečite.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Treprostinil Tillomed Pharma, kot bi smeli

Ob nenamernem prevelikem odmerku treprostinila lahko občutite slabost, bruhanje, drisko, nizek krvni tlak (omotičnost, občutek prazne glave ali omedlevico), obilvanje vročice in/ali glavobol.

Če postane katerikoli od teh učinkov resen, se morate takoj posvetovati s svojim zdravnikom ali bolnišnico. Vaš zdravnik lahko infundiranje zmanjša ali prekine, dokler simptomi ne izginejo. Zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma raztopina za infundiranje se nato ponovno uvede z odmerkom, ki vam ga priporoči zdravnik.

Če ste prenehali uporabljati zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma

Zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma uporabljajte natančno po navodilih zdravnika ali specialista v bolnišnici. Ne prenehajte uporabljati treprostinila, razen če vam tako naroči vaš zdravnik.

Nenadna prekinitev ali nenadno zmanjšanje odmerka treprostinila lahko povzroči ponovno pljučno arterijsko hipertenzijo z možnostjo hitrega in resnega poslabšanja vaše bolezni.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Zelo pogosti neželeni učinki (pojavi se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov)

- razširitev krvnih žil s pordelostjo kože

- bolečina ali občutljivost okoli mesta infundiranja
- razbarvanje kože ali modrice okoli mesta infundiranja
- glavoboli
- kožni izpuščaj
- občutek siljenja na bruhanje (navzea)
- driska
- bolečine v čeljusti

Pogosti neželeni učinki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov)

- omotica
- bruhanje
- omotičnost ali omedlevica zaradi nizkega krvnega tlaka
- srbenje ali pordelost kože
- oteklost stopal, gležnjev, nog ali zadrževanje tekočine
- epizode krvavitve, kot so krvavitve iz nosu, izkašljevanje krvi, kri v urinu, krvavitev dlesni, kri v blatu
- bolečina v sklepih (artralgija)
- bolečina v mišicah (mialgija)
- bolečina v nogah in/ali v rokah

Drugi možni neželeni učinki

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti)

- okužbe na mestu infundiranja
- absces na mestu infundiranja
- zmanjšano število trombocitov v krvi (trombocitopenija)
- krvavitev na mestu infundiranja
- bolečine v kosteh
- kožni izpuščaj z razbarvanjem ali s kožnimi izboklinami
- vnetje podkožnega tkiva (celulitis)
- preveliko črpanje krvi iz srca, kar povzroči kratko sapo, utrujenost, otekanje nog in trebuha zaradi nabiranja tekočine, trdovraten kašelj

Z intravenskim načinom dajanja so povezani dodatni neželeni učinki

- vnetje ven (tromboflebitis)
- bakterijska okužba krvi (bakteriemija)* (glejte poglavje 3)
- septicemija (huda bakterijska okužba krvi)

* poročali so o življenjsko nevarnih ali smrtnih primerih bakterijske okužbe krvnega obtoka

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks: +386 (0)8 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Treprostinil Tillomed Pharma

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

To zdravilo ne zahteva posebnih pogojev shranjevanja.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in viali. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Ne uporabljajte zdravila Treprostinil Tillomed Pharma, če opazite poškodbe na viali, spremembo barve ali druge znake kvarjenja.

Vialo treprostinila je treba uporabiti ali zavreči v 30 dneh po prvem odprtju.

Med neprekinjeno subkutano infuzijo morate enkratni vsebnik (injekcijsko brizgo) nerazredčenega zdravila Treprostinil Tillomed Pharma porabiti v 72 urah.

Med neprekinjenim intravenskim infundiranjem z zunanjimi prenosnimi črpalkami je treba posamezen vsebnik (brizga) z razredčenim treprostinilom uporabiti v 24 urah.

Vso preostalo razredčeno raztopino je treba zavreči.

Za navodila glede uporabe glejte poglavje 3 „Kako uporabljati zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma“.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma

Učinkovina je treprostinil, v koncentracijah 1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml ali 10 mg/ml.

Druge sestavine zdravila Treprostinil Tillomed Pharma so: natrijev klorid, metakrezol, natrijev citrat, natrijev hidroksid, koncentrirana klorovodikova kislina, voda za injekcije.

Izgled zdravila Treprostinil Tillomed Pharma in vsebina pakiranja

Zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma 1 mg/ml raztopina za infundiranje

Prozorna brezbarvna do rahlo rumena raztopina, praktično brez vidnih delcev, napolnjena v 20 ml prozorno stekleno vialo zaprto s temno sivim 20 mm gumijastim bromobutilnim zamaškom ter zatesnjena z rumeno matirano 20 mm *flip-off* snemljivo zaporko. Na zamašku so štirimi enakomerne, na 90° razporejene oznake in obroček na sredini.

Zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma 2,5 mg/ml raztopina za infundiranje

Prozorna brezbarvna do rahlo rumena raztopina, praktično brez vidnih delcev, napolnjena v 20 ml prozorno stekleno vialo zaprto s temno sivim 20 mm gumijastim bromobutilnim zamaškom ter zatesnjena z modro matirano 20 mm *flip-off* snemljivo zaporko. Na zamašku so štirimi enakomerne, na 90° razporejene, oznake in obroček na sredini.

Zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma 5 mg/ml raztopina za infundiranje

Prozorna brezbarvna do rahlo rumena raztopina, praktično brez vidnih delcev, napolnjena v 20 ml prozorno stekleno vialo zaprto s temno sivim 20 mm gumijastim bromobutilnim zamaškom ter zatesnjena z zeleno matirano 20 mm *flip-off* snemljivo zaporko. Na zamašku so štirimi enakomerne, na 90° razporejene, oznake in obroček na sredini.

Zdravilo Treprostinil Tillomed Pharma 10 mg/ml raztopina za infundiranje

Prozorna brezbarvna do rahlo rumena raztopina, praktično brez vidnih delcev, napolnjena v 20 ml prozorno stekleno vialo zaprto s temno sivim 20 mm gumijastim bromobutilnim zamaškom ter zatesnjena z rdečo matirano 20 mm *flip-off* snemljivo zaporko. Na zamašku so štirimi enakomerne, na 90° razporejene, oznake in obroček na sredini.

Viale so pakirane v zunanji ovojnini.

Velikost pakiranja: 1 viala/pakiranje

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Treprostinil Tillomed Pharma

H/Rp -Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec**Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom****Tillomed Pharma GmbH**

Mittelstraße 5/5a
12529 Schönefeld
Nemčija

Proizvajalec^[1]

Tillomed Malta Limited,
Malta Life Sciences Park,
LS2.01.06 Industrial Estate,
San Gwann, SGN 3000, Malta

SGS Pharma Magyarorszag Kft.
Derkovits Gyula Utca 53,
Budapest XIX, 1193,
Madžarska

[1]Pri zdravilu na trgu bo navedeno samo mesto dejanskega sproščanja zdravila.

Zdravilo je v državah članicah EGP in na Severnem Irskem pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Avstrija	Treprostinil Tillomed 1 mg / ml, 2,5 mg / ml, 5 mg / ml und 10 mg / ml Infusionslösung
Hrvaška	Treprostinil Tillomed 1 mg / ml otopine za infuziju Treprostinil Tillomed 2,5 mg / ml otopine za infuziju Treprostinil Tillomed 5 mg / ml otopine za infuziju Treprostinil Tillomed 10 mg / ml otopine za infuziju
Češka republika	Treprostinil Tillomed
Finska	Treprostinil Tillomed 1 mg / ml, 2,5 mg / ml, 5 mg / ml ja 10 mg / ml infuusioneste
Francija	TREPROSTINIL TILLOMED 1 mg/ml, solution pour perfusion TREPROSTINIL TILLOMED 2,5 mg/ml, solution pour perfusion TREPROSTINIL TILLOMED 5 mg/ml, solution pour perfusion TREPROSTINIL TILLOMED 10 mg/ml, solution pour perfusion
Nemčija	Treprostinil Tillomed 1 mg / ml, 2,5 mg / ml, 5 mg / ml und 10 mg / ml Infusionslösung
Madžarska	Treprostinil Tillomed 1 mg / ml, 2,5 mg / ml, 5 mg / ml és 10 mg / ml infúziós oldat
Italija	Treprostinil Tillomed
Litva	Treprostinil Tillomed 1mg / ml, 2,5mg / ml, 5mg / ml ir 10mg / ml infuzinis tirpalas
Norveška	Treprostinil Tillomed
Poljska	Treprostinil Tillomed
Portugalska	Treprostinil Tillomed
Slovaška	Treprostinil Tillomed 1 mg / ml, 2,5 mg / ml, 5 mg / ml a 10 mg / ml infúzny roztok
Slovenija	Treprostinil Tillomed Pharma 1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml in 10 mg/ml raztopina za infundiranje
Švedska	Treprostinil Tillomed 1mg / ml, 2,5mg / ml, 5mg / ml och 10mg / ml infusionsvätska, lösning

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 25. 4. 2025.