Navodilo za uporabo

Ropivakainijev klorid Kabi 7,5 mg/ml raztopina za injiciranje
Ropivakainijev klorid Kabi 10 mg/ml raztopina za injiciranje
ropivakainijev klorid

Preden vam dajo to zdravilo, natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, medicinsko sestro ali drugim zdravstvenim delavcem.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, medicinsko sestro ali drugim zdravstvenim delavcem. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Polni imeni zdravil, ki sta opisani v tem navodilu za uporabo, sta:
Ropivakainijev klorid Kabi 7,5 mg/ml raztopina za injiciranje
Ropivakainijev klorid Kabi 10 mg/ml raztopina za injiciranje
V tem navodilu za uporabo imata skupno ime Ropivakainijev klorid Kabi.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste dobili zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi
3. Kako uporabljati zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Ropivakainijev klorid Kabi
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi in za kaj ga uporabljamo

- Zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi vsebuje učinkovino imenovano ropivakainijev klorid.
- Spada v skupino zdravil, imenovanih lokalni anestetiki.

Zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi 7,5 mg/ml raztopina za injiciranje se uporablja
pri odraslih in otrocih, starejših od 12 let, za omrtvičenje (anesteziranje) delov telesa. Uporablja se za preprečevanje ali lajšanje bolečin. Uporabi se lahko za:
- omrtvičenje delov telesa med operacijami, vključno s porodom s carskim rezom,
- ublažitev bolečin med porodom, po operaciji ali po nezgodi.

Zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi 10 mg/ml raztopina za injiciranje se uporablja
pri odraslih in otrocih, starejših od 12 let, za omrtvičenje (anesteziranje) delov telesa med operacijo.

2. Kaj morate vedeti, preden boste dobili zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi

Zdravila Ropivakainijev klorid Kabi ne smete dobiti
- Če ste **alergični** (preobčutljivi) **na ropivakainijev klorid** ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- Če ste alergični na kateri koli drug lokalni anestetik istega razreda (kot sta lidokain ali bupivakain).
- Če so vam povedali, da imate **zmanjšan volumen krvi** (hipovolemija).
- **V žilo** za omrtvičenje določenega predela telesa,
- **ali v maternični vrat** za olajšanje bolečin med porodom.

JAZMP-IB/046-08.11.2024

Če niste prepričani, ali se karkoli izmed naštetega nanaša na vas, povejte zdravniku, preden vam dajo zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi.

Opozorila in previdnostni ukrepi
Za preprečitev takojšnjih toksičnih učinkov je treba posebej paziti, da **ne pride do injiciranja** zdravila Ropivakainijev klorid Kabi **neposredno v žilo**. Zdravila se ne sme injicirati v vnete predele.

Povejte zdravniku, medicinski sestri ali drugemu zdravstvenemu delavcu preden boste prejeli zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi:
- če ste v **slabem splošnem stanju** zaradi starosti ali drugih dejavnikov,
- če imate **težave s srcem** (delna ali popolna motnja prevodnega sistema srca),
- če imate napredovale **težave z jetri,**
- če imate hude **težave z ledvicami**.

Povejte zdravniku, če imate katero koli od teh težav, ker vam bo morda moral prilagoditi odmerek zdravila Ropivakainijev klorid Kabi.

Povejte zdravniku, medicinski sestri ali drugemu zdravstvenemu delavcu preden boste prejeli zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi:
- če imate **akutno porfirijo** (težave s kopičenjem rdečega krvnega pigmenta; včasih se zaradi tega pojavijo nevrološki simptomi).

Povejte zdravniku, če imate vi ali kdo v vaši družini porfirijo, kajti zdravnik bo morda v tem primeru moral za vas uporabiti drug anestetik.

Pred začetkom jemanja zdravila obvestite zdravnika o kakršnih koli boleznih ali zdravstvenih stanjih, ki jih imate.

Otroci
Zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi 7,5 mg/ml in 10 mg/ml raztopina za injiciranje
Pri otrocih, starih 12 let ali manj, so primernejše druge jakosti (2 mg/ml, 5 mg/ml).

Druga zdravila in zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi
Obvestite zdravnika ali zdravstveno osebje, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo. To je pomembno, ker lahko zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi vpliva na način delovanja določenih zdravil in ker lahko nekatera zdravila učinkujejo na zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi.

Še zlasti je pomembno, da zdravnika obvestite, če jemljete katero koli izmed naslednjih zdravil:
- **druge lokalne anestetike,**
- **močna zdravila proti bolečinam,** kot sta morfin ali kodein,
- **zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje motenj srčnega ritma** (aritmija), kot sta lidokain in meksiletin.

Zdravnik mora vedeti, če jemljete ta zdravila, da lahko določi pravo odmerjanje zdravila Ropivakainijev klorid Kabi, ki ga potrebujete.

Zdravnika obvestite tudi, če jemljete katero koli izmed naslednjih zdravil:
- **zdravila za zdravljenje depresije** (kot je fluvoksamin),
- **antibiotike** za zdravljenje okužb, ki jih povzročajo bakterije (kot je enoksacin).

To je pomembno, ker telo potrebuje dlje časa za odstranitev zdravila Ropivakainijev klorid Kabi, če jemljete našteta zdravila. Če jemljete katero koli izmed naštetih zdravil, se je potrebno izogniti dolgotrajni uporabi zdravila Ropivakainijev klorid Kabi.

Nosečnost in dojenje
Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom, preden vam dajo to zdravilo.
Ni znano, ali ropivakain vpliva na nosečnost ali prehaja v materino mleko.

Če ste noseči ali dojite, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katero koli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev
Zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi vam lahko povzroči zaspanost in vam upočasni reakcije. Potem ko dobite zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi, do naslednjega dne ne smete voziti ali upravljati z orodji in stroji.

Zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi vsebuje natrijev klorid
Zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi 7,5 mg/ml raztopina za injiciranje
To zdravilo vsebuje največ 2,99 mg natrija (glavne sestavine kuhinjske soli) na ml. To je enako 0,15 % priporočenega največjega dnevnega vnosa natrija s hrano za odrasle osebe.
Zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi 10 mg/ml raztopina za injiciranje
To zdravilo vsebuje največ 2,8 mg natrija (glavne sestavine kuhinjske soli) na ml. To je enako 0,14 % priporočenega največjega dnevnega vnosa natrija s hrano za odrasle osebe.

3. Kako uporabljati zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi

Zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi vam bo dal zdravnik. Odmerek, ki vam ga bo dal, je odvisen od vrste lajšanja bolečine, ki ga potrebujete. Odvisen je tudi od velikosti telesa, starosti in telesne pripravljenosti.

Zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi vam bo zdravnik dal v obliki injekcije. Del telesa, v katerega vam bo dal zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi, je odvisen od razloga, zaradi katerega vam bo zdravilo dano. Zdravnik vam bo zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi dal v enega izmed naslednjih delov telesa:
- del telesa, ki ga je potrebno omrtviti.
- v bližino dela telesa, ki ga je potrebno omrtviti.
- na mesto, ki ni v bližini dela telesa, ki ga je potrebno omrtviti. V tem primeru lahko dobite epiduralno injekcijo (v področje okrog hrbtenjače).

Kadar je zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi uporabljeno na enega izmed naštetih načinov, prepreči živcem prenos sporočil o bolečini do možganov. Na mestu, kjer bo zdravilo uporabljeno, bo odpravilo občutek bolečine, vročine ali mraza, ne pa nujno občutkov, kot sta pritisk ali dotik.

Zdravnik bo vedel, kako vam pravilno dati to zdravilo.

Odmerjanje
Uporabljeni odmerek bo odvisen od tega, za kaj je zdravilo uporabljeno, in tudi od vašega zdravstvenega stanja, starosti in telesne mase.

Trajanje zdravljenja
Dajanje ropivakaina za **anestezijo** pred nekaterimi operacijami običajno traja **od 2 do 10 ur**, za **lajšanje bolečin** med operacijo ali po njej pa **do 72 ur**.

Če ste dobili večji odmerek zdravila Ropivakainijev klorid Kabi, kot bi smeli
Pri resnih neželenih učinkih, ki so posledica prevelikih odmerkov zdravila Ropivakainijev klorid Kabi, je potrebno posebno zdravljenje. Zdravnik, ki vas zdravi, je usposobljen za reševanje takšnih primerov. Prvi znak, ki jih povzroči prevelik odmerek zdravila Ropivakainijev klorid Kabi, so po navadi naslednji:
- težave s sluhom in vidom,

- omrtvelost ustnic, jezika in okolice ust,
- omotica ali vrtoglavost,
- mravljinčenje,
- motnje govora, za katere je značilna slaba artikulacija (dizartrija),
- togost mišic, trzanje mišic, napadi krčev (konvulzije),
- nizek krvni tlak,
- počasno ali neredno bitje srca.

Po teh simptomih se lahko pojavi zastoj srca, zastoj dihanja ali hudi napadi krčev.

Za zmanjšanje tveganja za resne neželene učinke, bo zdravnik nemudoma prekinil dajanje zdravila Ropivakainijev klorid Kabi takoj, ko se ti znaki pojavijo. To pomeni, če se vam kaj od tega zgodi ali se vam zdi, da ste dobili preveč zdravila Ropivakainijev klorid Kabi, **morate to nemudoma povedati zdravniku ali zdravstvenemu osebju.**

Hujši neželeni učinki prevelikega odmerjanja zdravila Ropivakainijev klorid Kabi vključujejo težave z govorom, trzanje mišic, tresenje (tremor), drgetanje, napadi krčev (epileptični napadi) in izgubo zavesti.

Če opazite katerega od zgoraj navedenih simptomov, morate to povedati zdravniku ali zdravstvenemu osebju.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Pomembni neželeni učinki, na katere je treba biti pozoren:
Nenadne, **življenjsko ogrožajoče alergijske reakcije** (npr. anafilaksija, vključno z anafilaktičnim šokom) so redke, pojavijo se pri 1 do 10 od 10.000 bolnikov. Med možnimi simptomi so:
- nenadno nastal izpuščaj,
- srbeč ali bulast izpuščaj (koprivnica),
- oteklost obraza, ustnic, jezika ali drugih delov telesa,
- kratka sapa, piskajoče dihanje ali težko dihanje,
- občutek izgube zavesti.

Če se vam zdi, da vam zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi povzroča alergijsko reakcijo, morate to nemudoma povedati zdravniku ali zdravstvenemu osebju.

Drugi možni neželeni učinki:

Zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov)
- nizek krvni tlak (hipotenzija). Zaradi njega se vam lahko pojavita omotica ali vrtoglavost.
- siljenje na bruhanje (navzea)

Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov)
- mravljinčenje (parestezije)
- omotica
- glavobol
- počasen ali hiter srčni utrip (bradikardija, tahikardija)
- visok krvni tlak (hipertenzija)
- bruhanje
- težave z odvajanjem urina (retenca urina)
- povišana telesna temperatura (vročina) ali drgetanje (mrzlica)
- togost (rigor)
- bolečine v hrbtu

Občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov)
- tesnobnost
- zmanjšana občutljivost ali občutek na koži
- omedlevica
- težko dihanje
- nizka telesna temperatura (hipotermija)
- Nekateri simptomi se lahko pojavijo, če je zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi pomotoma injicirano v žilo ali če dobite preveč zdravila Ropivakainijev klorid Kabi (glejte tudi poglavje 3, Če ste dobili večji odmerek zdravila Ropivakainijev klorid Kabi, kot bi smeli, zgoraj). Med takšne spadajo napadi krčev (epileptični napadi), omotica ali vrtoglavost, omrtvelost ustnic in okolice ust, omrtvelost jezika, težave s sluhom, težave z vidom, težave z govorom, trdost mišic in tresenje.

Redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov)
- srčni napad (zastoj srca)
- neenakomerno bitje srca (motnje srčnega ritma)

Neznana (pogostnosti ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov)
- Hornerjev sindrom

Drugi možni neželeni učinki so:
- omrtvelost zaradi draženja živca, ki ga povzroči igla ali injekcija. To po navadi ne traja dolgo.
- nehoteni gibi mišic (diskinezija)

Med neželenimi učinki, opisanimi med uporabo drugih lokalnih anestetikov, ki se lahko pojavijo tudi med uporabo zdravila Ropivakainijev klorid Kabi, so:
- Okvara živcev. V redkih primerih (pojavijo se pri 1 do 10 od 10.000 bolnikov) lahko to povzroči trajne težave.
- Če je preveč zdravila Ropivakainijev klorid Kabi danega v hrbtenjačno (spinalno) tekočino, se lahko pojavi omrtvičenost (anesteziranost) celega telesa.
- Epiduralno injiciranje (injiciranje v prostor okoli hrbtenjačnih živcev) lahko povzroči motnjo živčne poti od možganov do glave in vratu, zlasti pri nosečnicah, kar lahko včasih povzroči stanje, imenovano Hornerjev sindrom. Za to stanje je značilno zmanjšanje velikosti zenice, povešenje zgornje veke in nezmožnost potenja. Po prekinitvi zdravljenja bo to izginilo samo od sebe.

Otroci
Pri otrocih so neželeni učinki enaki kot pri odraslih. Izjemi sta nizek krvni tlak in bruhanje: nizek krvni tlak se pri otrocih pojavi manj pogosto (pojavijo se pri 1 do 10 od 100 otrok), bruhanje pa pogosteje (pojavijo se pri več kot 1 od 10 otrok).

Poročanje o neželenih učinkih
Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco, Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si. S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Ropivakainijev klorid Kabi

Za shranjevanja zdravila niso potrebna posebna navodila.

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na pretisnem omotu, ampuli ali kartonski škatli. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Ne uporabljajte tega zdravila, če v raztopini za injiciranje opazite oborino (precipitat).

Za shranjevanje zdravila Ropivakainijev klorid Kabi bo poskrbel zdravnik oz. bodo za to poskrbeli v bolnišnici in oni so odgovorni za kakovost zdravila, če se zdravilo odpre, a se ga ne uporabi takoj. Odgovorni so tudi za pravilno odstranjevanje neuporabljenega zdravila Ropivakainijev klorid Kabi.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi
- Učinkovina je ropivakainijev klorid 7,5 mg/ml oz. 10 mg/ml.
  Ena 10 ml polipropilenska ampula vsebuje 75 mg oz. 100 mg ropivakainijevega klorida.
  Ena 20 ml polipropilenska ampula vsebuje 150 mg oz. 200 mg ropivakainijevega klorida.
- Pomožne snovi so natrijev klorid, klorovodikova kislina (za uravnavanje pH), natrijev hidroksid (za uravnavanje pH) in voda za injekcije.

Izgled zdravila Ropivakainijev klorid Kabi in vsebina pakiranja
Zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi raztopina za injiciranje je bistra, brezbarvna raztopina za injiciranje.
Zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi 7,5 mg/ml oz. 10 mg/ml raztopina za injiciranje je na voljo v 10 ml in 20 ml prozornih polipropilenskih ampulah.

Velikosti pakiranj:
1, 5, 10 ampul v pretisnem omotu

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Ropivakainijev klorid Kabi
ZZ – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
D-61346 Bad Homburg v.d.H.
Nemčija

Proizvajalec
HP Halden Pharma AS
Svinesundsveien 80
1788 Halden
Norveška

Zdravilo je v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora in Združenem kraljestvu (Severnem Irskem) pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Ropivakainijev klorid Kabi 7,5 mg/ml raztopina za injiciranje

Država članica	Ime zdravila
Avstrija	Ropivacainhydrochlorid Kabi 7,5 mg/ml Injektionslösung
Nizozemska	Ropivacaïne Fresenius Kabi 7,5 mg/ml oplossing voor injectie
Belgija	Ropivacaïne Fresenius Kabi 7,5 mg/ml oplossing voor injectie/solution injectable/ Injektionslösung
Bolgarija	Ropivacain Kabi 7,5 mg/ml, инжекционен разтвор
Ciper	Ropivacaine Kabi 7,5 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα
Nemčija	Ropivacainhydrochlorid Kabi 7,5 mg/ml Injektionslösung
Danska	Ropivacaine Fresenius Kabi, injektionsvaeske, opløsning,7.5 mg/ml
Estonija	Ropivacaine Kabi
Grčija	Ropivacaine Kabi 7,5 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα
Španija	Ropivacaina Kabi 7,5 mg/ml solución inyectable
Finska	Ropivacain Fresenius Kabi 7,5 mg/ml injektioneste, liuos
Francija	Ropivacaïne Kabi 7,5 mg/ml, solution injectable
Irska	Ropivacaine 7.5 mg/ml solution for injection
Italija	Ropivacaina Kabi
Latvija	Ropivacaine Kabi 7,5 mg/ml šķīdums injekcijām
Litva	Ropivacaine hydrochloride Kabi 7,5 mg/ml injekcinis tirpalas
Luksemburg	Ropivacaïne Fresenius Kabi 7,5 mg/ml Injektionslösung
Malta	Ropivacaine Kabi 7,5 mg/ml
Madžarska	Ropivacaine Fresenius Kabi 7,5 mg/ml oldatos injekció
Norveška	Ropivacain Fresenius Kabi 7,5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning
Poljska	Ropivacaine Kabi
Portugalska	Ropivacaína Kabi
Švedska	Ropivacain Fresenius Kabi 7,5 mg/ml, injektionsvätska, lösning
Slovenija	Ropivakainijev klorid Kabi 7,5 mg/ml raztopina za injiciranje
Združeno kraljestvo (Severna Irska)	Ropivacaine 7.5 mg/ml solution for injection

Ropivakainijev klorid Kabi 10 mg/ml raztopina za injiciranje

Država članica	Ime zdravila
Avstrija	Ropivacainhydrochlorid Kabi 10 mg/ml Injektionslösung
Nizozemska	Ropivacaïne Fresenius Kabi 10 mg/ml oplossing voor injectie
Belgija	Ropivacaïne Fresenius Kabi 10 mg/ml oplossing voor injectie/solution injectable/ Injektionslösung
Ciper	Ropivacaine Kabi 10 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα
Nemčija	Ropivacainhydrochlorid Kabi 10 mg/ml Injektionslösung
Danska	Ropivacaine Fresenius Kabi, injektionsvaeske, opløsning,10 mg/ml
Estonija	Ropivacaine Kabi
Grčija	Ropivacaine Kabi 10 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα
Španija	Ropivacaina Kabi 10 mg/ml solución inyectable
Finska	Ropivacain Fresenius Kabi 10 mg/ml injektioneste, liuos
Francija	Ropivacaïne Kabi 10 mg/ml, solution injectable
Italija	Ropivacaina Kabi
Latvija	Ropivacaine Kabi 10 mg/ml šķīdums injekcijām
Litva	Ropivacaine hydrochloride Kabi 10 mg/ml injekcinis tirpalas
Luksemburg	Ropivacaïne Fresenius Kabi 10 mg/ml Injektionslösung
Malta	Ropivacaine Kabi 10 mg/ml
Madžarska	Ropivacaine Fresenius Kabi 10 mg/ml oldatos injekció
Norveška	Ropivacain Fresenius Kabi 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning
Poljska	Ropivacaine Kabi
Portugalska	Ropivacaína Kabi

Romunija	Ropivacaina Kabi 10 mg/ml soluţie injectabilă
Švedska	Ropivacain Fresenius Kabi 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning
Slovenija	Ropivakainijev klorid Kabi 10 mg/ml raztopina za injiciranje
Združeno kraljestvo (Severna Irska)	Ropivacaine 10 mg/ml solution for injection

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 8. 11. 2024.

Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju:

Ravnanje

Zdravilo Ropivakainijev klorid Kabi sme dati samo zdravnik, ki ima izkušnje z regionalno anestezijo, oz. se sme to zdravilo uporabljati samo pod njegovim nadzorom (glejte poglavje 3).

Rok uporabnosti po odprtju

Zdravilo uporabite takoj.

Zdravila Ropivakainijev klorid Kabi so namenjena samo za enkratno uporabo. Neuporabljeno raztopino zavrzite.

Zdravilo je treba pred uporabo vizualno pregledati. Raztopino se sme uporabiti le, če je bistra, skoraj brez delcev in če je vsebnik nepoškodovan.

Intaktnega vsebnika se ne sme ponovno avtoklavirati.

Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.
V alkalnih raztopinah se lahko pojavi precipitacija, kajti ropivakain je pri pH > 6,0 slabo topen.

Odstranjevanje

Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.