

Navodilo za uporabo

Nutriflex Omega plus 38/120 emulzija za infundiranje

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Nutriflex Omega plus 38/120 in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste prejeli zdravilo Nutriflex Omega plus 38/120
3. Kako uporabljati zdravilo Nutriflex Omega plus 38/120
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Nutriflex Omega plus 38/120
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Nutriflex Omega plus 38/120 in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Nutriflex Omega plus 38/120 vsebuje tekočine in snovi, imenovane aminokisline, elektroliti in maščobne kisline, ki so bistvene za rast ali okrevanje telesa. Vsebuje tudi kalorije v obliki ogljikovih hidratov in maščob.

Zdravilo Nutriflex Omega plus 38/120 je indicirano pri odraslih.

Zdravilo Nutriflex Omega plus 38/120 boste prejeli, ko ne boste mogli normalno uživati hrane. Primerov, ko se lahko to zgodi, je veliko, na primer, ko okrevate po operaciji, ob poškodbah, opeklinah ali ko ne morete absorbirati hrane iz želodca in črevesja.

2. Kaj morate vedeti, preden boste prejeli zdravilo Nutriflex Omega plus 38/120

Zdravila Nutriflex Omega plus 38/120 ne boste prejeli

- če ste alergični na katero koli zdravilno učinkovino, jajca, arašide, sojo, ribe ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- zdravila ne smejo prejemati novorojenčki, dojenčki in malčki, mlajši od dveh let.

Zdravila Nutriflex Omega plus 38/120 ne boste prejeli, če imate:

- življenjsko ogrožajoče težave s krvnim obtokom, kot so tiste, ki se lahko pojavijo v stanju kolapsa ali šoka,
- srčni napad ali možgansko kap,
- hudo okvarjeno delovanje strjevanja krvi, nevarnost za krvavitev (huda koagulopatija, slabšajoča se hemoragična diateza),
- zamašitev krvnih žil zaradi krvnih strdkov ali maščobe (embolija),
- hudo jetrno popuščanje,

- okvaro pretoka žolča (intrahepatična holestaza),
- hudo ledvično popuščanje brez možnosti za dializo,
- motnje sestave soli v telesu,
- primanjkljaj tekočine ali povečana količina vode v telesu,
- vodo v pljučih (pljučni edem),
- hudo srčno popuščanje,
- nekatere presnovne motnje, kot so
 - preveč lipidov (maščob) v krvi,
 - prirojene napake v presnovi aminokislin,
 - neobičajno visoke koncentracije sladkorja v krvi, ki jih je mogoče nadzirati z več kot 6 enotami insulina na uro,
 - nenormalnosti v presnovi, ki se lahko pojavijo po operacijah ali poškodbah,
 - koma neznanega izvora,
 - nezadostna oskrba tkiva s kisikom,
 - neobičajno visoke koncentracije kisline v krvi.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Nutriflex Omega plus 38/120 se posvetujte z zdravnikom.

Zdravnika obvestite, če:

- imate težave s srcem, jetri ali ledvicami,
- imate določene vrste motenj v presnovi, kot so sladkorna bolezen, neobičajne vrednosti maščob v krvi in motnje v sestavi telesnih tekočin in soli ali kislinsko-baznem ravnovesju.

Zaradi odkrivanja zgodnjih znakov alergijskih reakcij (kot so zvišana telesna temperatura, drgetanje, izpuščaj ali kratka sapa) vas bodo ob prejemu tega zdravila skrbno spremljali.

Nadaljnje nadzorovanje in preiskave, na primer različne preiskave vzorcev krvi, bodo zagotovile, da bo vaše telo pravilno predelovalo vnesena hranila.

Zdravstveno osebje vam bo lahko z ustreznimi ukrepi zagotovilo, da bodo potrebe vašega telesa po tekočini in elektrolitih zadovoljene. Poleg zdravila Nutriflex Omega plus 38/120 lahko prejmete dodatna hranila (živila), ki bodo zadovoljila vse vaše zahteve.

Otroci

Varnost in učinkovitost pri otrocih, starejših od dveh let, še nista bili dokazani. Podatkov ni na voljo.

Zdravila se ne sme dajati novorojenčkom, dojenčkom in malčkom, mlajšim od dveh let.

Druga zdravila in zdravilo Nutriflex Omega plus 38/120

Obvestite zdravnika, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Zdravilo Nutriflex Omega plus 38/120 lahko medsebojno deluje z nekaterimi drugimi zdravili. Povejte zdravniku, če uporabljate ali prejimate katero od naslednjih zdravil:

- insulin,
- heparin,
- zdravila za preprečevanje neželenega strjevanja krvi, kot so varfarin ali drugi kumarinski derivati,
- zdravila za hitrejše izločanje urina (diuretiki),

- zdravila za zdravljenje visokega krvnega tlaka ali težav s srcem (zaviralci ACE in antagonisti receptorjev angiotenzina-II),
- zdravila, ki se uporabljajo pri presaditvah organov, kot sta ciklosporin in takrolimus,
- zdravila za zdravljenje vnetja (kortikosteroidi),
- hormonski pripravki, ki vplivajo na tekočinsko ravnovesje (adrenokortikotropni hormon [ACTH]).

Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom, preden boste prejeli to zdravilo.

Če ste noseči, boste prejeli to zdravilo le, če zdravnik oceni, da je to nujno potrebno za vaše okrevanje. O uporabi zdravila Nutriflex Omega plus 38/120 pri nosečnicah ni podatkov.

Materam, ki dobivajo parenteralno prehrano, se dojenje odsvetuje.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

To zdravilo se običajno daje nepokretnim bolnikom, npr. v bolnišnici ali kliniki, kar izključuje verjetnost, da bodo vozili ali upravljali s stroji. Vendar samo zdravilo ne vpliva na sposobnost vožnje ali uporabo strojev.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

3. Kako uporabljati zdravilo Nutriflex Omega plus 38/120

To zdravilo se daje v obliki intravenske infuzije (po kapljicah), to je, skozi majhno cevko, neposredno v žilo. Zdravilo se daje samo skozi eno od velikih (centralnih) ven.

Priporočeno trajanje infundiranja za vrečo s parenteralno prehrano je največ 24 ur.

Vaš zdravnik se bo odločil, koliko zdravila potrebujete in kako dolgo bo trajalo zdravljenje s tem zdravilom.

Uporaba pri otrocih

Varnost in učinkovitost pri otrocih, starejših od dveh let, še nista bili dokazani. Podatkov ni na voljo.

Zdravila se ne sme dajati novorojenčkom, dojenčkom in malčkom, mlajšim od dveh let.

Če ste prejeli večji odmerek zdravila Nutriflex Omega plus 38/120, kot bi smeli

Če ste prejeli prevelik odmerek tega zdravila, se lahko pojavi tako imenovani sindrom preobremenitve z naslednjimi simptomi:

- povečana količina tekočine v telesu in motnje v stanju elektrolitov,
- voda v pljučih (pljučni edem),
- izgube aminokislin z urinom in motnje v ravnovesju aminokislin,
- bruhanje, občutek slabosti,
- drgetanje,
- visoka koncentracija sladkorja v krvi,
- glukoza v urinu,
- primanjkljaj tekočine,
- koncentracija krvi, veliko višja od običajne (hiperosmolalnost),
- motnje ali izguba zavesti zaradi izjemno visoke koncentracije sladkorja v krvi,

- povečanje jeter (hepatomegalija) z zlatenico (ikterusom) ali brez nje,
- povečanje vranice (splenomegalija),
- nalaganje maščobe na notranjih organih,
- nenormalne vrednosti testov delovanja jeter,
- zmanjšanje števila rdečih krvnih celic (anemija),
- zmanjšanje števila belih krvnih celic (levkopenija),
- zmanjšanje števila trombocitov (trombocitopenija),
- povečanje števila nezrelih rdečih krvnih celic (retikulocitoza),
- razpad krvnih celic (hemoliza),
- krvavitev ali nagnjenost h krvavitvam,
- motnje v strjevanju krvi (na kar kažejo spremembe v času krvavitve, času koagulacije, protrombinskem času itd.),
- zvišana telesna temperatura,
- visoke vrednosti maščob v krvi,
- izguba zavesti.

Če se pojavi kateri od teh simptomov, je treba infundiranje takoj ustaviti.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Naslednji neželeni učinki so lahko resni. Če se pojavi kateri od naslednjih neželenih učinkov, o tem takoj obvestite zdravnika, ki vam bo nehal dajati to zdravilo:

Redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- alergijske reakcije, na primer kožne reakcije, kratka sapa, otekanje ustnic, ust in žrela, težave z dihanjem.

Drugi neželeni učinki vključujejo:

Občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- slabost, bruhanje, izguba apetita.

Redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- večje nagnjenje k strjevanju krvi,
- modrikasto obarvana koža,
- kratka sapa,
- glavobol,
- vročinski oblivi,
- pordelost kože (eritem),
- znojenje,
- mrzlica,
- občutek hladu,
- visoka telesna temperatura,
- zaspanost,
- bolečine v prsnem košu, hrbtu, kosteh ali ledvenem delu,
- znižanje ali zvišanje krvnega tlaka.

Zelo redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

- neobičajno visoke vrednosti maščob ali sladkorja v krvi,

- velike vrednosti kislih snovi v krvi,
- preveč maščob lahko povzroči sindrom preobremenitve z maščobami, za več informacij o tem glejte besedilo pod naslovom „Če ste prejeli večji odmerek zdravila Nutriflex Omega plus 38/120, kot bi smeli“ v 3. poglavju. Simptomi običajno izginejo ob prekinitvi infundiranja.

Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- zmanjšanje števila belih krvnih celic (levkopenija),
- zmanjšanje števila trombocitov (trombocitopenija),
- okvara pretoka žolča (holestaza).

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali medicinsko sestro. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika

Center za zastrupitve

Zaloška cesta 2

SI-1000 Ljubljana

Faks: + 386 (0)1 434 76 46

e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si.

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Nutriflex Omega plus 38/120

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Ne zamrzujte. Nenamerno zamrznjeno vrečo zavržite.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na nalepki. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Vrečo shranjujte v zaščitnem ovoju za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Nutriflex Omega plus 38/120

Zdravilne učinkovine v mešanici, pripravljeni za uporabo, so:

<i>iz zgornjega prekata (raztopina glukoze)</i>	v 1000 ml	v 1250 ml	v 1875 ml	v 2500 ml
glukoza monohidrat,	132,0 g	165,0 g	247,5 g	330,0 g
ekvivalentno brezvodni glukozi	120,0 g	150,0 g	225,0 g	300,0 g
natrijev dihidrogenfosfat dihidrat	1,872 g	2,340 g	3,510 g	4,680 g
cinkov acetat dihidrat	5,264 mg	6,580 mg	9,870 mg	13,16 mg

<i>iz vmesnega prekata (maščobna emulzija)</i>	v 1000 ml	v 1250 ml	v 1875 ml	v 2500 ml
srednjeveržni nasičeni trigliceridi	20,00 g	25,00 g	37,50 g	50,00 g
rafinirano sojino olje	16,00 g	20,00 g	30,00 g	40,00 g
trigliceridi omega-3-kislin	4,000 g	5,000 g	7,500 g	10,00g

iz spodnjega prekata (raztopina aminokislin)	v 1000 ml	v 1250 ml	v 1875 ml	v 2500 ml
izolevcin	2,256 g	2,820 g	4,230 g	5,640 g
levcin	3,008 g	3,760 g	5,640 g	7,520 g
lizinijev klorid	2,728 g	3,410 g	5,115 g	6,820 g
ekvivalentno lizinu	2,184 g	2,729 g	4,094 g	5,459 g
metionin	1,880 g	2,350 g	3,525 g	4,700 g
fenilalanin	3,368 g	4,210 g	6,315 g	8,420 g
treonin	1,744 g	2,180 g	3,270 g	4,360 g
triptofan	0,544 g	0,680 g	1,020 g	1,360 g
valin	2,496 g	3,120 g	4,680 g	6,240 g
arginin	2,592 g	3,240 g	4,860 g	6,480 g
histidinijev klorid monohidrat	1,624 g	2,030 g	3,045 g	4,060 g
ekvivalentno histidinu	1,202 g	1,503 g	2,254 g	3,005 g
alanin	4,656 g	5,820 g	8,730 g	11,64 g
asparaginska kislina	1,440 g	1,800 g	2,700 g	3,600 g
glutaminska kislina	3,368 g	4,210 g	6,315 g	8,420 g
glicin	1,584 g	1,980 g	2,970 g	3,960 g
prolin	3,264 g	4,080 g	6,120 g	8,160 g
serin	2,880 g	3,600 g	5,400 g	7,200 g
natrijev hidroksid	0,781 g	0,976 g	1,464 g	1,952 g
natrijev klorid	0,402 g	0,503 g	0,755 g	1,006 g
natrijev acetat trihidrat	0,222 g	0,277 g	0,416 g	0,554 g
kalijev acetat	2,747 g	3,434 g	5,151 g	6,868 g
magnezijev acetat tetrahidrat	0,686 g	0,858 g	1,287 g	1,716 g
kalcijev klorid dihidrat	0,470 g	0,588 g	0,882 g	1,176 g

	v 1000 ml	v 1250 ml	v 1875 ml	v 2500 ml
vsebnost aminokislin [g]	38	48	72	96
vsebnost dušika [g]	5,4	6,8	10,2	13,7
vsebnost ogljikovih hidratov [g]	120	150	225	300
vsebnost maščob [g]	40	50	75	100

Elektroliti [mmol]	v 1000 ml	v 1250 ml	v 1875 ml	v 2500 ml
natrij	40	50	75	100
kalij	28	35	52,5	70
magnezij	3,2	4,0	6,0	8,0
kalcij	3,2	4,0	6,0	8,0
cink	0,024	0,03	0,045	0,06
klorid	36	45	67,5	90
acetat	36	45	67,5	90
fosfat	12	15	22,5	30

	v 1000 ml	v 1250 ml	v 1875 ml	v 2500 ml
energija v obliki maščob [kJ (kcal)]	1590 (380)	1990 (475)	2985 (715)	3980 (950)
energija v obliki ogljikovih hidratov [kJ (kcal)]	2010 (480)	2510 (600)	3765 (900)	5020 (1200)
energija v obliki aminokislin [kJ (kcal)]	635 (150)	800 (190)	1200 (285)	1600 (380)
energija, ki ni iz beljakovin [kJ (kcal)]	3600 (860)	4500 (1075)	6750 (1615)	9000 (2155)
celokupna energija [kJ (kcal)]	4235 (1010)	5300 (1265)	7950 (1900)	10600 (2530)

osmolalnost [mOsm/kg]	1540
teoretična osmolarnost [mOsm/l]	1215
pH	5,0–6,0


Druge sestavine zdravila so citronska kislina monohidrat (za uravnavanje pH), jajčni lecitin, glicerol, natrijev oleat, vseracemni- α -tokoferol, natrijev hidroksid (za uravnavanje pH) in voda za injekcije.

Izgled zdravila Nutriflex Omega plus 38/120 in vsebina pakiranja

Za uporabo pripravljeno zdravilo je emulzija za infundiranje, ki se daje skozi majhno cevko v veno.

Zdravilo Nutriflex Omega plus 38/120 je na voljo v fleksibilni večprekatni vreči, ki vsebuje:

- 1250 ml (500 ml raztopine aminokislin + 250 ml maščobne emulzije + 500 ml raztopine glukoze)
- 1875 ml (750 ml raztopine aminokislin + 375 ml maščobne emulzije + 750 ml raztopine glukoze)
- 2500 ml (1000 ml raztopine aminokislin + 500 ml maščobne emulzije + 1000 ml raztopine glukoze)



Slika A

Slika B

Slika A: Večprekatna vreča je pakirana v zaščitni ovoj. Med vrečo in zaščitnim ovojem sta vstavljeni absorbent kisika in indikator kisika; vrečica z absorbentom kisika je narejena iz inertnega materiala in vsebuje železov hidroksid.

Slika B: Zgornji prekat vsebuje raztopino glukoze, vmesni prekat maščobno emulzijo, spodnji prekat pa raztopino aminokislin.

Raztopini glukoze in aminokislin sta bistri in brezbarvni do rahlo rumenkasti. Maščobna emulzija je mlečno bela.

Zgornji prekat in vmesni prekat se lahko povežeta s spodnjim prekatom z odprtjem vmesnih šivov (razplastni šivi).

V škatlah, ki vsebujejo pet vreč, so vsebniki različnih velikosti.

Velikosti pakiranja: 5 x 1250 ml, 5 x 1875 ml in 5 x 2500 ml

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

Način in režim predpisovanja in izdaje zdravila Nutriflex Omega plus 38/120

H – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Nemčija

tel.: +49-5661-71-0

faks: +49-5661-71-4567

Zdravilo je v državah članicah EGP pridobilo dovoljenje za promet z naslednjimi imeni:

Avstrija	NuTRIflex Omega plus novo
Belgija	Nutriflex Omega plus 38 g/l AA 120 g/l G, émulsion pour perfusion / emulsie voor infusie / Emulsion zur Infusion
Bolgarija	Nutriflex Omega 38/120 плюс инфузионна емулсия
Ciper	Nutriflex Omega 38/120 plus γαλάκτωμα για έγχυση
Česka Republika	Nutriflex Omega plus 38/120
Nemčija	NuTRIflex Omega plus novo
Danska	Omegaflex plus
Estonija	Nutriflex Omega 38/120
Grčija	Nutriflex Omega 38/120 plus γαλάκτωμα για έγχυση
Španija	Nutriflex Omega 38/120 plus Emulsión para perfusión
Finska	Nutriflex Omega 38/120/40
Francija	Mednutriflex Omega E, émulsion pour perfusion
Hrvaška	Nutriflex Omega 38/120 plus emulzija infuziju
Irska	Omeflex plus emulsion for infusion
Italija	Omegaflex AA38/G120
Litva	Nutriflex Omega 38/120
Luksemburg	NuTRIflex Omega plus novo
Latvija	Nutriflex Omega 38/120 plus emulsija infūzijām
Nizozemska	Nutriflex Omega 38/120 plus, emulsie voor infusie
Norveška	Omegaflex plus
Poljska	Omegaflex plus
Portugalska	Nutriflex Omega 38/120 plus emulsão para perfusão
Romunija	Omegaflex plus emulsie perfuzabilă
Švedska	Nutriflex Omega 38/120/40
Slovenija	Nutriflex Omega plus 38/120 emulzija za infundiranje
Slovaška	Nutriflex Omega plus 38/120

Združeno kraljestvo Omeflex plus emulsion for infusion

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 13.06.2016.

Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju:

Ni posebnih zahtev za odstranjevanje.

Parenteralno hrano je treba pred uporabo pregledati s prostim očesom zaradi možnega poškodovanja, obarvanja in nestabilnosti emulzije.

Poškodovanih vreč ne uporabljajte; zaščitni ovoj in primarna vreča ne smeta biti poškodovana. Uporabljajte le, če je vmesni šiv med prekaty nepoškodovan, če sta raztopini aminokislin in glukoze bistri in brezbarvni do rahlo rumenkasti in če je emulzija homogena, mlečno bela tekočina. Ne uporabljajte, če sta raztopini obarvani ali vsebujeta delce. Emulzije ne uporabljajte, če vidite znake ločevanja faz (oljne kapljice, oljna plast).


Preden odprete zaščitni ovoj, preverite barvo indikatorja kisika (glejte sliko A). Ne uporabljajte, če je indikator kisika rožnat. Uporabite le, če je indikator kisika rumen.

Priprava mešane emulzije

Strogo upoštevajte načela aseptičnega rokovanja z zdravilom.

Odpiranje: zaščitni ovoj strgajte, začnite pri zarezah (sl. 1). Z vreče odstranite zaščitni ovoj. Zavrzite zaščitni ovoj, indikator kisika in absorbent kisika.

S prostim očesom pregledjte, ali primarna vreča pušča. Vreče, ki puščajo, zavrzite, saj sterilnost ni zagotovljena.



Za zaporedno odpiranje in mešanje prekatov vrečo z obema rokama zvijajte, začeni tako, da odprete vmesni šiv, ki ločuje zgornji prekat (glukozo) in spodnji prekat (aminokislino) (sl. 2a). Nato še naprej pritiskajte tako, da se odpre vmesni šiv, ki ločuje vmesni prekat (maščobe) in spodnji prekat (sl. 2b).

Dodajanje aditivov


Ko odstranite aluminijasti pečat (sl. 3), lahko dodate združljive aditive skozi priključek za zdravila (sl. 4).

Zdravilo Nutriflex Omega plus 38/120 lahko mešate z naslednjimi aditivi:

N(2)-L-alanil-L-glutamin

voda za injekcije

kalcijski glukonat 10 %
natrijev klorid 20 %
kalijev klorid 14,9 %
magnezijev sulfat 50 %
kalijev dihidrogenfosfat 1M
zdravilo Tracutil (elementi v sledovih)




Vsebino vreče temeljito premešajte (sl. 5) in mešanico preglejte s prostim očesom (sl. 6). Ne sme biti znakov ločevanja faz emulzije.

Mešanica je mlečno bela homogena emulzija olja v vodi.

Priprava za infundiranje

Emulzijo je treba pred infundiranjem vedno ogreti na sobno temperaturo.

S priključka za infundiranje odstranite aluminijasto folijo (sl. 7) in priključite infuzijski sistem (sl. 8). Uporabite infuzijski sistem brez prezračevanja ali zaprite prezračevanje, če uporabljate sistem s prezračevanjem. Vrečo obesite na infuzijsko stojalo (sl. 9) in izvedite infundiranje s standardno tehniko.



Samo za enkratno uporabo. Vsebnik in neuporabljene ostanke je treba po uporabi zavreči.

Delno uporabljenih vsebnikov ne priključite ponovno.

Če se uporabijo filtri, morajo le-ti prepuščati maščobe (velikost por $\geq 1,2 \mu\text{m}$).

Rok uporabnosti po odstranitvi zaščitnega ovoja in premešanju vsebin vreče

Po premešanju vsebin prekatov morate končno emulzijo uporabiti takoj.

Rok uporabnosti po primešanju združljivih aditivov

Z mikrobiološkega vidika je treba zdravilo po primešanju aditivov uporabiti takoj. Za čas in pogoje shranjevanja pred uporabo zdravila, ki ni bilo uporabljeno takoj po primešanju aditivov, je odgovoren uporabnik.

Po prvem odprtju (preboden vhod za infundiranje)

Emulzijo je treba uporabiti takoj po odprtju vsebnika.

Zdravila Nutriflex Omega plus 38/120 ne smete mešati z drugimi zdravili, za katera združljivost ni bila dokumentirana.

Zdravila Nutriflex Omega plus 38/120 zaradi tveganja psevdoaglutinacije ne smemo uporabljati v istem infuzijskem sistemu skupaj s krvjo.